

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
頭頸部癌(C00)	AADC-0001	S-1(CG)	用法	a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的)
			用量	朝食後および夕食後の1日2回 体表面積 1.25㎡未満 40mg/回 1.25から1.5㎡未満 50mg/回 1.5㎡以上 60mg/回
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、
頭頸部癌(C00)	AADC-0091	tri-weekly DTX	DTX	60mg/㎡ day1
			3週ごと	
			副作用:	脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害
頭頸部癌(C00)	AADC-0008	DCF療法	CDDP 80 mg/㎡	day1
			TXT 70mg/㎡	day1
			5Fu 800 mg/㎡	day1からday5
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、発熱、
頭頸部癌(C00)	AADC-0182	Cetuximab + FP	セツキシマブ	初回400 mg/㎡、2回目以降250 mg/㎡ 毎週点滴静注
			CDDP	100 mg/㎡ day1 3週に1回
			5Fu	1000 mg/㎡/day day1~day4 3週に1回
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛 ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、低マグネシウム血症、間質性肺炎、 掻痒感、infusion reaction、食欲不振、疲労感、心不全、血栓塞栓症
頭頸部癌(C00)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ	240mg/body 2週間隔
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
頭頸部癌(C00)	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ	480mg/body 4週間隔
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
頭頸部癌(C00)	AADC-0235	Pembrolizumab	ペムブロリズマブ	1回200mg 3週間隔
			副作用:	骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
頭頸部癌(C00)	AADC-0268	Pembrolizumab(6週間)	ペムブロリズマブ	1回400mg 6週間隔
			副作用:	骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
食道癌(C15)	AADC-0007	CDDP+5-FU療法(FP)	CDDP 10 mg/body day1からday5
			5Fu 500 mg/m <sup>2</sup> day1からday5
食道癌(C15)	AADC-0008	DCF療法	副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛
			CDDP 80 mg/m <sup>2</sup> day1
			TXT 70mg/m <sup>2</sup> day1
			5Fu 800 mg/m <sup>2</sup> day1からday5
食道癌(C15)	AADC-0105	FP+IMRT療法	副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛、食欲不振、全身倦怠感、発熱、
			5-FU 500 mg/body day1からday5
			CDDP 5 mg/body day1からday5
			トモセラピー 2Gy/body day1からday5
食道癌(C15)	AADC-0164	DTX	day6,7は休薬 6週連続 (到達目標60Gy)
			副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛
			DTX 70mg/m <sup>2</sup> day1
			3週ごと
食道癌(C15)	AADC-0184	IMRT+FP	副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害
			CDDP 70 mg/m <sup>2</sup> day1
			5Fu 700 mg/m <sup>2</sup> day1からday5
			IMRT 50Gy 25分割
食道癌(C15)	AADC-0185	FP	副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛
			化学療法は4週毎に繰り返す
			CDDP 80 mg/m <sup>2</sup> day1
			5Fu 800 mg/m <sup>2</sup> day1からday5
食道癌(C15)	AADC-0227	PTX(6投2休)	4週毎
			副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛
			PTX 100 mg/m <sup>2</sup> day1.8.15.22.29.36 少なくとも2週休薬
			副作用: 脱毛、発疹、爪の障害、感覚減退、味覚異常、浮動性めまい、疲労、浮腫、発熱、悪心、嘔吐、下痢、便秘、食欲不振、口内炎、筋痛、関節痛、骨髄抑制、末梢神経障害、間質性肺炎
食道癌(C15)	AADC-0233	Nedaplatin + 5-FU	副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、腎機能障害、口内炎、脱毛、肝機能異常、色素沈着、ショック、アナフィラキシー、電解質異常、間質性肺炎
			Nedaplatin 90 mg/m <sup>2</sup> day1
			5Fu 800 mg/m <sup>2</sup> /day day1からday5
			4週毎
食道癌(C15)	AADC-0014	mFOLFOX6療法	L-OHP 85mg/m <sup>2</sup> day1
			5-FU (bolus) 400mg/m <sup>2</sup> day1
			5-FU (infusion) 2400mg/m <sup>2</sup> 46~48hr
			l-LV 200mg/m <sup>2</sup> day1
			2週ごと
			副作用: 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢、発熱

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメ名称	用法等
食道癌(C15) がん/化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発 術前治療でpCRでなかったStage II / IIIの術後補助	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 (術後補助の場合投与は1年間) 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
食道癌(C15) がん/化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発 術前治療でpCRでなかったStage II / IIIの術後補助	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 (術後補助の場合投与は1年間) 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
食道癌(C15)	AADC-0298	Pembrolizumab+5-FU+CDDP	ペムブロリズマブ 1回200mg day1 CDDP 80 mg/m <sup>2</sup> day1 5FU 800 mg/m <sup>2</sup> day1からday5 3週毎 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎 インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感 肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 下垂体機能障害、1型糖尿病 肺炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
食道癌(C15) 切除可能、局所進行食道扁平上皮癌(cT1N1-3M0,cT2-3N0-3M0) 年齢20歳以上75歳以下mECOG PS 0-1	AADC-0300	DCF療法(術前)	CDDP 70 mg/m <sup>2</sup> day1 DTX 70mg/m <sup>2</sup> day1 5Fu 750 mg/m <sup>2</sup> day1からday5 3週毎に3回施行 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、発熱、
食道癌(C15)	AADC-0309	Nivolumab+ipilimumab	Nivolumab 240mg/body 2週間隔 Ipilimumab 1mg/kg 6週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核
食道癌(C15)	AADC-0310	Nivolumab+FP	ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 CDDP 80 mg/m <sup>2</sup> day1 5Fu 800 mg/m <sup>2</sup> day1からday5 4週毎 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎 インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感 肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 下垂体機能障害、1型糖尿病 肺炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
胃癌(C16)	AADC-0001	S-1(CG)	用法 a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的) 用量 朝食後および夕食後の1日2回 体表面積 1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			1.25から1.5㎡未満 50mg/回 1.5㎡以上 60mg/回
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、
胃癌(C16)	AADC-0002	S-1+CDDP療法	TS-1 3週投与2週休薬 TS-1開始8日目にCDDP60 mg/㎡ 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、
胃癌(C16)	AADC-0003	PTX	a. 70 mg/㎡を1週に1回 3回投与 1週休薬 b. 80 mg/㎡を2週に1回 もしくは 3週に1回 副作用: 脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害 筋肉痛、関節痛、悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常
胃癌(C16)	AADC-0006	CPT-11+ CDDP療法(IP)	CDDP 80 mg/㎡ day1 CPT-11 70 mg/㎡ day1,15 4週毎 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、全身倦怠感 末梢神経障害、脱毛
胃癌(C16)	AADC-0014	mFOLFOX6療法	L-OHP 85mg/㎡ day1 5-FU (bolus) 400mg/㎡ day1 5-FU (infusion) 2400mg/㎡ 46~48hr l-LV 200mg/㎡ day1 2週ごと 副作用: 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢 発熱
胃癌(C16)	AADC-0085	CPT-11	CPT-11 150 mg/㎡ 2週に1回 副作用: 下痢、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、骨髄抑制、肝機能障害
胃癌(C16)	AADC-0101	外来 CPT-11+CDDP療法(IP)	CDDP 30 mg/㎡ day1,15 CPT-11 60 mg/㎡ day1,15 4週毎 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、全身倦怠感 末梢神経障害、脱毛
胃癌(C16)	AADC-0122	S-1+DTX療法	TS-1 2週投与1週休薬 朝食後および夕食後の1日2回 80 mg/㎡/day DTX 40 mg/㎡ day1 3週毎 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、色素沈着、神経障害、脱毛 浮腫、悪心・嘔吐、流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、
胃癌(C16)	AADC-0134	XELOX療法	カペシタビン 1日2回 14日間内服7日間休薬 体表面積 1.36㎡未満 1200mg/回 1.36以上1.66㎡未満 1500mg/回 1.66以上1.96㎡未満 1800mg/回 1.96㎡以上 2100mg/回

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			L-OHP 130mg/m <sup>2</sup> day1 3週ごと 副作用: 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着
胃癌(C16)	AADC-0150	tri-weekly Abraxane	アブラキササン 1回 260mg/m <sup>2</sup> 3週毎 副作用: 脱毛、疲労、筋痛、末梢神経障害、骨髄抑制、下痢、悪心嘔吐
胃癌(C16)	AADC-0153	tri weekly Trastuzumab + XP療法	トラスツズマブ 8mg/kg day1 (2回目からは6mg/kg) CDDP 80 mg/m <sup>2</sup> day1 カペシタビン 1日2回1回1000mg/m <sup>2</sup> day1夕からday15朝まで内服その後7日間休薬 3週毎 副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制、下痢、口内炎、色素沈着 手足症候群、血中ビリルビン増加、腎機能障害、脱毛、末梢神経障害
胃癌(C16)	AADC-0154	DCS療法	TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 80 mg/m <sup>2</sup> /day day1夕からday15朝まで内服その後14日間休薬 DTX 35 mg/m <sup>2</sup> day1, day15 CDDP 35 mg/m <sup>2</sup> day1, day15 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、色素沈着、神経障害、脱毛 浮腫、悪心・嘔吐、腎機能障害、下痢
胃癌(C16)	AADC-0179	DTX	DTX 75mg/m <sup>2</sup> day1 3週ごと 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害、間質性肺炎
胃癌(C16)	AADC-0213	SOX	L-OHP 130mg/m <sup>2</sup> day1 3週ごと TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14 3週ごと 体表面積 1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回 1.25から1.5m <sup>2</sup> 未満 50mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発熱 末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック
胃癌(C16) 一次治療が無効の治癒切除不能胃癌	AADC-0219	RAM療法	RAM 8mg/kg day1 2週ごと 副作用: 腹痛、高血圧、下痢、 動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害 インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血 骨髄抑制、低カリウム血症、低ナトリウム血症
胃癌(C16) 一次治療が無効の治癒切除不能胃癌	AADC-0220	PTX+RAM療法	RAM 8mg/kg day1 2週ごと PTX 70mg/m <sup>2</sup> day1, 8 2週ごと 副作用: 腹痛、高血圧、下痢、疲労、無力症、末梢性浮腫 口内炎、肝機能障害、呼吸困難、蛋白尿、発疹、皮膚乾燥 動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害 インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血 骨髄抑制、低アルブミン血症、低ナトリウム血症、ざ瘡様皮膚炎 眼瞼浮腫、顔面浮腫、鼻出血
胃癌(C16)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
胃癌(C16)	AADC-0253	Weekly nab-PTX	nab-PTX 100mg/m <sup>2</sup> 週1回投与 3週連続投与1週休業 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感、脱毛、末梢神経障害、発疹、下痢
胃癌(C16)	AADC-0206	Trifluridine	トリフルリジン 1回35mg/m <sup>2</sup> を1日2回 5日間連続経口投与した後2日間休業し、これを2回繰り返した後 14日間休む 1コース28日間 副作用: 骨髄抑制、悪心、食欲減退、疲労、下痢、嘔吐、口内炎、感染症、間質性肺炎
胃癌(C16)	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症、大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害、腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
胃癌(C16) HER2陽性切除不能進行再発	AADC-0273	Trastuzumab Deruxtecan	Trastuzumab Deruxtec 6.4mg/kg day1 3週ごと 副作用: 間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション、骨髄抑制、脱毛、疲労、悪心・嘔吐、下痢、便秘、口内炎
胃癌(C16)	AADC-0295	Nivolumab+CAPOX	ニボルマブ 360mg/body day1 3週ごと カベシタピン 1日2回 14日間内服7日間休業 体表面積 1.36m <sup>2</sup> 未満 1200mg/回 1.36以上1.66m <sup>2</sup> 未満 1500mg/回 1.66以上1.96m <sup>2</sup> 未満 1800mg/回 1.96m <sup>2</sup> 以上 2100mg/回 L-OHP 130mg/m <sup>2</sup> day1 3週ごと 副作用: 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加、口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着、発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症、大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害、腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
胃癌(C16)	AADC-0296	Nivolumab+SOX	ニボルマブ 360mg/body day1 3週ごと L-OHP 130mg/m <sup>2</sup> day1 3週ごと TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14 3週ごと 体表面積 1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回 1.25から1.5m <sup>2</sup> 未満 50mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹、末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック、発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症、大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害、腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
胃癌(C16)	AADC-0297	Nivolumab+mFOLFOX6	ニボルマブ 240mg/body day1 L-OHP 85mg/m <sup>2</sup> day1 5-FU (bolus) 400mg/m <sup>2</sup> day1 5-FU (infusion) 2400mg/m <sup>2</sup> 46～48hr l-LV 200mg/m <sup>2</sup> day1 2週ごと 副作用: 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
胃癌(C16)	AADC-0353	Pembrolizumab+CAPOX	ペムブロリズマブ 200mg/body day1 3週ごと カペシタビン 1日2回 14日間内服7日間休薬 体表面積 1.36㎡未満 1200mg/回 1.36以上1.66㎡未満 1500mg/回 1.66以上1.96㎡未満 1800mg/回 1.96㎡以上 2100mg/回 L-OHP 130mg/㎡ day1 3週ごと 副作用: 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着 発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
胃癌(C16)	AADC-0354	Zolbetuximab+CAPOX	ゾルベツキシマブ 初回 800mg/㎡(2回目以降は600mg) 3週ごと カペシタビン 1日2回 14日間内服7日間休薬 体表面積 1.36㎡未満 1200mg/回 1.36以上1.66㎡未満 1500mg/回 1.66以上1.96㎡未満 1800mg/回 1.96㎡以上 2100mg/回 L-OHP 130mg/㎡ day1 3週ごと 副作用: 重度の悪心・嘔吐、過敏症、インフュージョンリアクション 手足症候群、骨髄抑制、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着
胃癌(C16)	AADC-0355	Zolbetuximab+mFOLFOX6	ゾルベツキシマブ 初回 800mg/㎡(2回目以降は600mg) 3週ごと L-OHP 85mg/㎡ day1 5-FU (bolus) 400mg/㎡ day1 5-FU (infusion) 2400mg/㎡ 46~48hr l-LV 200mg/㎡ day1 2週ごと 副作用: 重度の悪心・嘔吐、過敏症、インフュージョンリアクション 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、倦怠感、下痢 発熱、高血圧
GIST(C16~C17)	AADC-0009	Glivec	イマチニブ1日1回400mgを食後に投与 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、浮腫、発疹、倦怠感、電解質異常 肝機能障害、血中アルブミン減少
GIST(C16~C17)	AADC-0112	Sutent	スニチニブ1日1回50mg 4週間連続投与2週間休薬 副作用: 骨髄抑制、皮膚変色、手足症候群、食欲不振、肝機能異常、疲労感 味覚異常、口内炎、下痢、悪心、歯肉炎、代謝異常、浮腫、発熱、高血圧
GIST(C16~C17)	AADC-0316	Pimipitespib	ピミテスピブ 1日1回 160mg 空腹時 5日間連続経口投与後2日間休薬 副作用: 下痢、食欲不振、倦怠感、悪心、血清クレアチニン上昇 腎機能低下、夜盲症、貧血
大腸癌(C18)	AADC-0001	S-1(CG)	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			用法 a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的)
			用量 朝食後および夕食後の1日2回 体表面積 1.25㎡未満 40mg/回 1.25から1.5㎡未満 50mg/回 1.5㎡以上 60mg/回
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
大腸癌(C18)	AADC-0010	UFT(UFTE)	用法・用量 1日量としてテガフル300-600mgを1日2-3回に分割投与
大腸癌(C18)	AADC-0011	UFT(UFT-E)/LV療法	副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
			UFT-E 300mg/㎡/日 1日3回に分けて LV 75mg/日 1日3回に分けて 食間に服用 4週投与 1週休薬
			副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
大腸癌(C18)	AADC-0014	mFOLFOX6療法	L-OHP 85mg/㎡ day1 5-FU (bolus) 400mg/㎡ day1 5-FU (infusion) 2400mg/㎡ 46~48hr l-LV 200mg/㎡ day1
			2週ごと
			副作用: 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢発熱
大腸癌(C18)	AADC-0084	FOLFIRI療法	5-FU (bolus) 400mg/㎡ day1 5-FU (infusion) 2400mg/㎡ 46~48hr l-LV 200mg/㎡ day1 CPT-11 150mg/㎡ day1
			2週ごと
			副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛
大腸癌(C18)	AADC-0092	Bevacizumab based mFOLFOX6療法	ベバシズマブ 1回5mg/kgまたは10mg/kg day1 L-OHP 85mg/㎡ day1 5-FU (bolus) 400mg/㎡ day1 5-FU (infusion) 2400mg/㎡ 46~48hr l-LV 200mg/㎡ day1
			2週ごと
			副作用: 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢発熱、消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症
大腸癌(C18)	AADC-0093	Bevacizumab based FOLFIRI療法	ベバシズマブ 1回5mg/kgまたは10mg/kg day1 5-FU (bolus) 400mg/㎡ day1 5-FU (infusion) 2400mg/㎡ 46~48hr l-LV 200mg/㎡ day1 CPT-11 150mg/㎡ day1
			2週ごと
			副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛、発熱 消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
大腸癌 (C18)	AADC-0099	5-FU/LV療法	高血圧性クレーゼ
			5-FU (bolus) 400mg/m <sup>2</sup> day1
			5-FU (infusion) 2400mg/m <sup>2</sup> 46~48hr
			1-LV 200mg/m <sup>2</sup> day1
			2週ごと
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、口内炎、手足症候群、脱毛 全身倦怠感、肝機能障害、下痢
大腸癌 (C18)	AADC-0102	Xeloda	カペシタビン 1日2回 2週連続投与 1週休薬
			体表面積 1.33m <sup>2</sup> 未満 1500mg/回
			1.33から1.57m <sup>2</sup> 未満 1800mg/回
			1.57から1.81m <sup>2</sup> 未満 2100mg/回
			1.81m <sup>2</sup> 以上 2400mg/回
			副作用: 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎
大腸癌 (C18)	AADC-0107	Bevacizumab based 5-FU/LV療法	ベバシズマブ 1回5mg/kgまたは10mg/kg day1
			5-FU (bolus) 400mg/m <sup>2</sup> day1
			5-FU (infusion) 2400mg/m <sup>2</sup> 46~48hr
			1-LV 200mg/m <sup>2</sup> day1
			2週ごと
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、口内炎、手足症候群、脱毛 全身倦怠感、肝機能障害、下痢、高血圧性クレーゼ 消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症
大腸癌 (C18)	AADC-0108	UFT/LV+IMRT療法	UFT 300mg/m <sup>2</sup> /日 1日3回に分けて
			LV 75mg/日 1日3回に分けて 食間に服用
			トモセラピー実施日 day1~5
			トモセラピー 2Gy/day (day1~5まで行い、day6,7は中止)
			4週連続投与(到達目標40Gy)
			副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
大腸癌 (C18)	AADC-0109	Cetuximab + FOLFIRI 療法	セツキシマブ 初回 400mg/m <sup>2</sup> (2回目以降は250mg/m <sup>2</sup> ) day1 週1回
			CPT-11 150mg/m <sup>2</sup> (75歳以上は120mg/m <sup>2</sup> ) day1 2週ごと
			1-LV 200mg/m <sup>2</sup> day1 2週ごと
			5-FU (bolus) 400mg/m <sup>2</sup> day1 2週ごと
			5-FU (infusion) 2400mg/m <sup>2</sup> 46~48hr 2週ごと
			副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛、発熱 ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction
大腸癌 (C18)	AADC-0110	Cetuximab + CPT-11 療法	セツキシマブ 初回 400mg/m <sup>2</sup> (2回目以降は250mg/m <sup>2</sup> ) day1 週1回
			CPT-11 150mg/m <sup>2</sup> (75歳以上は120mg/m <sup>2</sup> ) day1 2週ごと
			副作用: ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、食欲不振、下痢、悪心・嘔吐
			脱毛、疲労感、骨髄抑制
大腸癌 (C18)	AADC-0115	Cetuximab	セツキシマブ 初回 400mg/m <sup>2</sup> (2回目以降は250mg/m <sup>2</sup> ) day1
			週1回
			副作用: ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、下痢
大腸癌 (C18)	AADC-0134	XELOX 療法	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			カペシタビン 1日2回 14日間内服7日間休薬 体表面積 1.36㎡未満 1200mg/回 1.36以上1.66㎡未満 1500mg/回 1.66以上1.96㎡未満 1800mg/回 1.96㎡以上 2100mg/回
			L-OHP 130mg/㎡ day1 3週ごと 副作用: 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着
大腸癌(C18)	AADC-0135	Bevacizumab based XELOX 療法	
			ベバシズマブ 7.5mg/kg day1 3週ごと カペシタビン 1日2回 14日間内服7日間休薬 体表面積 1.36㎡未満 1200mg/回 1.36以上1.66㎡未満 1500mg/回 1.66以上1.96㎡未満 1800mg/回 1.96㎡以上 2100mg/回
			L-OHP 130mg/㎡ day1 3週ごと 副作用: 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着 消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症 高血圧性クレーゼ
大腸癌(C18)	AADC-0136	IRIS(大腸)	
			CPT-11 125 mg/㎡ 2週ごと TS-1 80~120mg/body 2週投与2週休薬 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹、脱毛
大腸癌(C18)	AADC-0140	Bevacizumab based XELODA 療法	
			ベバシズマブ 7.5mg/kg day1 3週ごと カペシタビン 1日2回 14日間内服7日間休薬 体表面積 1.36㎡未満 1200mg/回 1.36以上1.66㎡未満 1500mg/回 1.66以上1.96㎡未満 1800mg/回 1.96㎡以上 2100mg/回
			副作用: 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着 消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症 高血圧性クレーゼ
大腸癌(C18)	AADC-0146	Panitumumab	
			パニツムマブ 6mg/kg 点滴静注 2週毎 副作用: infusion reaction、ざ瘡、皮膚乾燥、発疹、掻痒、爪周炎、低マグネシウム血症 疲労、口内炎、食欲不振、下痢、間質性肺疾患
大腸癌(C18)	AADC-0147	Panitumumab based FORFIRI療法	
			パニツムマブ 6mg/kg 点滴静注 5-FU (bolus) 400mg/㎡ day1 5-FU (infusion) 2400mg/㎡ 46~48hr l-LV 200mg/㎡ day1 CPT-11 150mg/㎡ (76才以上は120mg/㎡) day1 2週毎 副作用: infusion reaction、ざ瘡、皮膚乾燥、発疹、掻痒、爪周炎、低マグネシウム血症 疲労、口内炎、食欲不振、下痢、間質性肺疾患、悪心・嘔吐、骨髄抑制 肝機能障害、脱毛
大腸癌(C18)	AADC-0148	Panitumumab based FOLFOX療法	
			パニツムマブ 6mg/kg 点滴静注 L-OHP 85mg/㎡ day1 5-FU (bolus) 400mg/㎡ day1

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			5-FU (infusion) 2400mg/m <sup>2</sup> 46~48hr l-LV 200mg/m <sup>2</sup> day1 2週毎
			副作用: infusion reaction、ざ瘡、皮膚乾燥、発疹、掻痒、爪周炎、低マグネシウム血症 疲労、口内炎、食欲不振、下痢、間質性肺疾患、発熱 末梢神経障害、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐、倦怠感、
大腸癌(C18)	AADC-0168	Cetuximab based mFOLFOX6 療法	セツキシマブ 初回 400mg/m <sup>2</sup> (2回目以降は250mg/m <sup>2</sup> ) day1 週1回 L-OHP 85mg/m <sup>2</sup> day1 2週ごと 5-FU (bolus) 400mg/m <sup>2</sup> day1 2週ごと 5-FU (infusion) 2400mg/m <sup>2</sup> 46~48hr 2週ごと l-LV 200mg/m <sup>2</sup> day1 2週ごと
			副作用: ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、食欲不振、下痢、悪心・嘔吐、発熱 脱毛、疲労感、骨髄抑制、末梢神経障害、注射部位反応、
大腸癌(C18) 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	AADC-0191	Regorafenib	レゴラフェニブ 1日1回160mgを3週間連日経口投与、その後1週間休薬 これを繰り返す 副作用: 手足症候群、TEN、Stevens-Johnson症候群、多形紅斑 肝機能障害、出血、血栓塞栓症、高血圧、高血圧クリーゼ、可逆性後白質脳症 消化管穿孔、下痢、食欲不振、口内炎、悪心・嘔吐、頻脈、発声障害、骨髄抑制 脱毛、掻痒、多汗症
大腸癌(C18) 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	AADC-0192	BV/SOX	ベバシズマブ 5mg/kg day1 3週ごと L-OHP 130mg/m <sup>2</sup> day1 3週ごと TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1~day14 3週ごと 体表面積 1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回 1.25から1.5m <sup>2</sup> 未満 50mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック、消化管穿孔 創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クリーゼ 可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、間質性肺炎 肝機能障害、脱毛、
大腸癌(C18)	AADC-0206	Trifluridine	トリフルリジン 1回35mg/m <sup>2</sup> を1日2回 5日間連続経口投与した後2日間休薬し、これを2回繰り返した後 14日間休む 1コース28日間
			副作用: 骨髄抑制、悪心、食欲減退、疲労、下痢、嘔吐、口内炎、感染症、間質性肺炎
大腸癌(C18)	AADC-0213	SOX	L-OHP 130mg/m <sup>2</sup> day1 3週ごと TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1~day14 3週ごと 体表面積 1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回 1.25から1.5m <sup>2</sup> 未満 50mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック
大腸癌(C18)	AADC-0214	Panitumumab+5-FU/LV	パニツムマブ 6mg/kg day1 5-FU (bolus) 400mg/m <sup>2</sup> day1 5-FU (infusion) 2400mg/m <sup>2</sup> 46~48hr l-LV 200mg/m <sup>2</sup> day1

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			2週毎 副作用: Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、低マグネシウム血症、口内炎 ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎 骨髄抑制、感染症、肝機能障害、手足症候群
大腸癌(C18)	AADC-0215	Cetuximab+5-FU/LV	セツキシマブ 初回 400mg/m <sup>2</sup> (2回目以降は250mg/m <sup>2</sup> ) day1 週1回 5-FU(bolus) 400mg/m <sup>2</sup> day1 2週ごと 5-FU(infusion) 2400mg/m <sup>2</sup> 46~48hr 2週ごと l-LV 200mg/m <sup>2</sup> day1 2週ごと 副作用: Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、心不全、血栓塞栓症、口内炎 ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎 骨髄抑制、感染症、肝機能障害、手足症候群、低マグネシウム血症 末梢神経障害
大腸癌(C18)	AADC-0216	Panitumumab+CPT-11	パニツムマブ 6mg/kg 点滴静注 CPT-11 150mg/m <sup>2</sup> (76才以上は120mg/m <sup>2</sup> ) day1 2週毎 副作用: Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、低マグネシウム血症、口内炎 ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎 骨髄抑制、腸管穿孔、消化管出血、腸閉塞、末梢神経障害、脱毛 腎機能障害、血栓塞栓症
大腸癌(C18)	AADC-0223	bevacizumab+XELIRI	ベバシズマブ 7.5mg/kg day1 CPT-11 200mg/m <sup>2</sup> day1 XELODA 1600mg/m <sup>2</sup> /日 day1~14 3週毎 副作用: infusion reaction、消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、高血圧性脳症 可逆性後白質脳症候群、ネフローゼ症候群、骨髄抑制、感染症 うっ血性心不全、間質性肺炎、神経障害、食欲減退、悪心、口内炎 脱毛、下痢、手足症候群、腎障害、色素沈着
大腸癌(C18)	AADC-0228	Bevacizumab + FOLFOXIRI	ベバシズマブ 5mg/kg day1 5-FU(infusion) 3200mg/m <sup>2</sup> 46hr l-LV 200mg/m <sup>2</sup> day1 L-OHP 85mg/m <sup>2</sup> day1 CPT-11 165mg/m <sup>2</sup> day1 2週毎 副作用: 骨髄抑制、下痢、悪心、嘔吐、口内炎、無力症、末梢神経障害 高血圧、静脈血栓塞栓症、アナフィラキシー反応、間質性肺炎 腸管穿孔、創傷治癒遅延、白質脳症
大腸癌(C18)	AADC-0229	Capecitabine + IMRT	カペシタピン 1日2回 週5日 体表面積 1.31m <sup>2</sup> 未満 900mg/回 1.31以上1.64m <sup>2</sup> 未満 1200mg/回 1.64以上 1500mg/回 トモセラピー 2Gy/day day1-5実施、day6-7中止 最大50Gy (2Gy×25回 5週間) 副作用: 骨髄抑制、手足症候群、下痢、悪心・嘔吐、口内炎、腹痛 疲労、無力症、脱毛、皮膚の発赤、掻痒感
大腸癌(C18)	AADC-0230	RAM + FOLFIRI	ラムシルマブ 8mg/kg day1 5-FU(bolus) 400mg/m <sup>2</sup> day1 5-FU(infusion) 2400mg/m <sup>2</sup> day1~3

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			1-LV 200mg/m <sup>2</sup> day1
			CPT-11 150mg/m <sup>2</sup> day1
			2週毎 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛 口内炎、鼻出血、高血圧、動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症 消化管穿孔
<b>大腸癌(C18)</b> 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	<b>AADC-0259</b>	<b>bevacizumab+S-1(3週毎)</b>	ベバシズマブ 7.5mg/kg day1 3週ごと TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14 3週ごと 体表面積 1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回 1.25から1.5m <sup>2</sup> 未満 50mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 消化管穿孔、肝機能障害 創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ 可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、間質性肺炎
<b>大腸癌(C18)</b> 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	<b>AADC-0260</b>	<b>bevacizumab+S-1(4週毎)</b>	ベバシズマブ 5mg/kg day1、15 TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14 体表面積 1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回 1.25から1.5m <sup>2</sup> 未満 50mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 消化管穿孔、肝機能障害 創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ 可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、間質性肺炎
<b>大腸癌(C18)</b> 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	<b>AADC-0261</b>	<b>bevacizumab+IRIS</b>	ベバシズマブ 5mg/kg day1、15 CPT-11 150mg/m <sup>2</sup> day1、15 TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14 体表面積 1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回 1.25から1.5m <sup>2</sup> 未満 50mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック、消化管穿孔 創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ 可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、間質性肺炎 肝機能障害、脱毛
<b>大腸癌(C18)</b> MSI-high	<b>AADC-0252</b>	<b>Nivolumab+Ipilimumab</b>	Nivolumab 240mg/body Ipilimumab 1mg/kg 3週毎4コースまで 5コースから Nivolumab 240mg/body 2週毎 又は 480mg/body 4週毎 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核
<b>大腸癌(C18)</b>	<b>AADC-0284</b>	<b>Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab</b>	Cetuximab 初回 400mg/m <sup>2</sup> (2回目以降は250mg/m <sup>2</sup> )を週1回 Encorafenib 1回300mg 1日1回経口投与 Binimetinib 1回45mg 1日2回経口投与 副作用: ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			掻痒感、infusion reaction、下痢、悪心嘔吐、疲労 手足症候群、眼障害、心機能障害、肝障害、横紋筋融解症
大腸癌(C18)	AADC-0285	Encorafenib+Cetuximab	Cetuximab 初回 400mg/m <sup>2</sup> (2回目以降は250mg/m <sup>2</sup> )を週1回 Encorafenib 1回300mg 1日1回経口投与 副作用: ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、下痢、悪心嘔吐、疲労 皮膚悪性腫瘍、手足症候群、眼障害、横紋筋融解症
大腸癌(C18) Her2陽性大腸癌 RAS野生型	AADC-0303	Pertuzumab+Trastuzumab(Her2陽性大腸癌)	Pertuzumab 初回840mg/body 2回目以降420mg/body day1 Trastuzumab 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg day1 3週ごと 副作用: インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感 間質性肺炎、悪心、口内炎
大腸癌(C18)	AADC-0317	Bevacizumab+Trifluridine	ベバシズマブ 5mg/kg day1、15 トリフルリジン 1回35mg/m <sup>2</sup> を1日2回 5日間連続経口投与した後2日間休薬し、これを2回繰り返した後 14日間休む 1コース28日間 副作用: 骨髄抑制、悪心、食欲減退、疲労、下痢、嘔吐、口内炎、感染症、間質性肺炎 創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ
大腸癌(C18)	AADC-0321	bi weekly cetuximab	セツキシマブ 500mg/m <sup>2</sup> day1 2週毎 副作用: ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、下痢
大腸癌(C18)	AADC-0322	bi weekly cetuximab+mFOLFOX6	セツキシマブ 500mg/m <sup>2</sup> day1 L-OHP 85mg/m <sup>2</sup> day1 5-FU (bolus) 400mg/m <sup>2</sup> day1 5-FU (infusion) 2400mg/m <sup>2</sup> 46~48hr l-LV 200mg/m <sup>2</sup> day1 2週毎 副作用: ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、食欲不振、下痢、悪心・嘔吐、発熱 脱毛、疲労感、骨髄抑制、末梢神経障害、注射部位反応、
大腸癌(C18)	AADC-0323	bi weekly cetuximab+FOLFIRI	セツキシマブ 500mg/m <sup>2</sup> day1 CPT-11 150mg/m <sup>2</sup> (75歳以上は120mg/m <sup>2</sup> ) day1 l-LV 200mg/m <sup>2</sup> day1 5-FU (bolus) 400mg/m <sup>2</sup> day1 5-FU (infusion) 2400mg/m <sup>2</sup> 46~48hr 2週毎 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛、発熱 ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction
大腸癌(C18)	AADC-0324	bi weekly cetuximab+5FU+l-LV	セツキシマブ 500mg/m <sup>2</sup> day1 5-FU (bolus) 400mg/m <sup>2</sup> day1 5-FU (infusion) 2400mg/m <sup>2</sup> 46~48hr l-LV 200mg/m <sup>2</sup> day1 2週毎

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			副作用: Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、心不全、血栓塞栓症、口内炎 ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎 骨髄抑制、感染症、肝機能障害、手足症候群、低マグネシウム血症
大腸癌 (C18)	AADC-0329	Cetuximab+CPT-11(bi-weekly)	セツキシマブ 500mg/m <sup>2</sup> day1 CPT-11 150mg/m <sup>2</sup> (76才以上は120mg/m <sup>2</sup> ) day1 2週毎 副作用: Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、低マグネシウム血症、口内炎 ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎 骨髄抑制、腸管穿孔、消化管出血、腸閉塞、末梢神経障害、脱毛 腎機能障害、血栓塞栓症
大腸癌 (C18)	AADC-0330	IRIS+bev(TRICOLORE)	ベパシズマブ 7.5mg/kg day1 CPT-11 150mg/m <sup>2</sup> day1 TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1~day14 体表面積 1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回 1.25から1.5m <sup>2</sup> 未満 50mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回 3週毎 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック、消化管穿孔 創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ 可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、間質性肺炎 肝機能障害、脱毛
大腸癌 (C18) Her2陽性大腸癌 RAS野生型	AADC-0344	PHESGO	ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として 初回 (IN) それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1 2回目以降 (MA) それぞれ 600mg、600mg、20000U day1 初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与 3週ごと 副作用: インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感 間質性肺炎、悪心、口内炎
大腸癌 (C18)	AADC-0356	Bevacizumab+mFOLFOXIRI	ベパシズマブ 5mg/kg day1 5-FU (infusion) 2400mg/m <sup>2</sup> 46hr I-LV 200mg/m <sup>2</sup> day1 L-OHP 85mg/m <sup>2</sup> day1 CPT-11 150mg/m <sup>2</sup> day1 2週毎 副作用: 骨髄抑制、下痢、悪心、嘔吐、口内炎、無力症、末梢神経障害 高血圧、静脈血栓塞栓症、アナフィラキシー反応、間質性肺炎 腸管穿孔、創傷治癒遅延、白質脳症
肛門管癌 (C21.1)	AADC-0196	5-FU+MMC+RT	5-FU (infusion) 1000mg/m <sup>2</sup> /day day1~4 29~32 MMC(bolus) 10mg/m <sup>2</sup> /day day1,29 RT 1.8Gy/day 週5回 計33回 総線量 59.4Gy 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、全身倦怠感、体重減少、脱毛、口内炎 出血傾向、溶血性尿毒症症候群、腎障害、間質性肺炎、下痢、色素沈着 肝機能障害、アナフィラキシーショック、白質脳症、うっ血性心不全、手足症候群 食道炎、
肝癌 (C22)	AADC-0017	Epirubicin 肝動注	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			1日60mg/m <sup>2</sup> を動脈内投与 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、脱毛、悪心・嘔吐
肝癌(C22)	AADC-0141	Miriplatin肝動注	1日1回70mg を肝動脈内投与(1回120mgを上限) 繰り返し投与する場合は4週間以上の観察期間をおく 副作用: 肝機能障害、骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、発熱、投与部位の疼痛 腎機能障害、全身倦怠感
肝癌(C22)	AADC-0160	Sorafenib	用法・用量 1回400mg 1日2回 経口投与 適宜増減 副作用: 手足症候群、剥脱性皮膚炎、発疹、脱毛、下痢、高血圧、疲労 食欲不振、そう痒感、体重減少、肝機能障害、出血 間質性肺炎、急性肺障害、高血圧クレーゼ、可逆性後白室脳症 皮膚粘膜眼症候群、消化管穿孔、心筋虚血・心筋梗塞
肝癌(C22)	AADC-0240	Lenvatinib	用法・用量 体重60kg以上 1日1回12mg経口投与 体重60kg未満 1日1回8mg経口投与 副作用: 高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労 口内炎、蛋白尿、手掌・足底発赤知覚不全症候群、出 動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔 可逆性後白質脳症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延 低カルシウム血症
肝癌(C22) 切除不能肝細胞癌	AADC-0293	Atezolizumab+Bevacizumab	アテゾリズマブ 1200mg day1 4週間隔 ベバシズマブ 15mg/kg day1 3週ごと 副作用: 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、痔炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害 消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧
肝癌(C22) 進行再発肝細胞癌	AADC-0327	Durvalumab+Tremelimumab	Durvalumab 1500mg(体重30kg以下の場合は20mg/kg) 4週間隔 Tremelimumab 300mg(体重30kg以下の場合は4mg/kg) 初回単回のみ 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
肝癌(C22) 進行再発肝細胞癌	AADC-0348	Durvalumab	Durvalumab 1500mg/body day1 体重30kg以下の場合は1回20mg/kg 4週毎 副作用: 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー
胆道癌(C22~24)	AADC-0001	S-1(CG)	用法 a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的) 用量 朝食後および夕食後の1日2回 体表面積 1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回 1.25から1.5m <sup>2</sup> 未満 50mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
胆道癌(C22~24)	AADC-0015	GEM	副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
			GEM 1000 mg/m <sup>2</sup> を週1回 3回投与 1週休薬 1000 mg/m <sup>2</sup> を2週間に1回
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感
胆道癌(C22~24)	AADC-0163	GC療法	GEM 1000mg/m <sup>2</sup> day1.8
			CDDP 25mg/m <sup>2</sup> day1.8
			1クール:3週
			副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱
胆道癌(C22~24)	AADC-0320	Durvalumab+GEM+CDDP	Durvalumab 1500mg/body day1
			GEM 1000mg/m <sup>2</sup> day1.8
			CDDP 25mg/m <sup>2</sup> day1.8
			1クール:3週
			副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー
胆道癌(C22~24)	AADC-0347	GCS	GEM 1000mg/m <sup>2</sup> day1
			CDDP 25mg/m <sup>2</sup> day1
			S-1 80mg/m <sup>2</sup> day1-7
			1クール:2週 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 下痢、色素沈着、発疹
胆道癌(C22~24)	AADC-0352	Pembrolizumab+GEM+CDDP	Pembrolizumab 200mg/body day1
			GEM 1000mg/m <sup>2</sup> day1.8
			CDDP 25mg/m <sup>2</sup> day1.8
			1クール:3週 CDDPは最大8クールまで、以降Pembrolizumab+GEM or Pembrolizumab単剤で継続
			副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー
膵癌(C25)	AADC-0001	S-1(CG)	用法 a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的)
			用量 朝食後および夕食後の1日2回
			体表面積 1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回 1.25から1.5m <sup>2</sup> 未満 50mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回
膵癌(C25)	AADC-0015	GEM	GEM 1000 mg/m <sup>2</sup> を週1回 3回投与 1週休薬 1000 mg/m <sup>2</sup> を2週間に1回
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
膵癌(C25)	AADC-0143	GEM +IMRT療法	GEM	1000 mg/㎡を週1回 3回投与 1週休薬
			放射線照射	1.8Gy×28Fr total50.4Gy
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感
膵癌(C25)	AADC-0159	Erlotinib+GEM療法	Erlotinib	100mg/day 連日経口投与
			GEM	1000 mg/㎡を週1回 3回投与 1週休薬
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、ざ瘡様皮疹等の発疹、悪心・嘔吐、下痢 間質性肺炎
膵癌(C25) 治癒切除不能膵癌	AADC-0200	FOLFIRINOX	L-OHP	85mg/㎡ day1
			5-FU (bolus)	400mg/㎡ day1
			5-FU (infusion)	2400mg/㎡ 46hr
			l-LV	200mg/㎡ day1
			CPT-11	180mg/㎡ day1
			2週ごと	
副作用:	末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐、倦怠感、下痢 発熱、脱毛、肝機能障害			
膵癌(C25) 治癒切除不能膵癌	AADC-0212	GEM+nab-PTX	GEM	1000mg/㎡ day1
			nab-PTX	125mg/㎡ day1
			3週投与1週休薬	
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感 脱毛、末梢神経障害、発疹、下痢
膵癌(C25) BRCA遺伝子変異陽性、プラチナ製剤を含む化学療法後に疾患進行が認められていない膵癌	AADC-0248	Olaparib	オラパリブ	1回300mgを1日2回経口投与
			副作用:	悪心、嘔吐、味覚異常 貧血、好中球減少、血小板減少、リンパ球減少 疲労、無力症、間質性肺炎 下痢、頭痛
膵癌(C25) 切除可能膵癌術前	AADC-0256	GEM+S-1(膵癌NAC)	GEM	1000 mg/㎡ day1.day8 30分かけて点滴静注
			S-1	体表面積毎(80mg~120mg) 14日間 分2で内服 (day1の夕方からday15の朝まで) これを2コース繰り返す。
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感 下痢、口内炎、色素沈着、発疹
膵癌(C25) 治癒切除不能膵癌	AADC-0318	Nal-IRI+5FU/LV	Liposomal Irinotecan	70mg/㎡ day1
			5-FU (infusion)	2400mg/㎡ day1~3
			l-LV	200mg/㎡ day1
			2週毎	
副作用:	食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、肝機能障害、脱毛 倦怠感、好中球減少、貧血、低カリウム血症			
膵癌(C25) 治癒切除不能膵癌	AADC-0014	mFOLFOX6療法	L-OHP	85mg/㎡ day1
			5-FU (bolus)	400mg/㎡ day1
			5-FU (infusion)	2400mg/㎡ 46hr

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			1-LV 2週ごと 副作用: 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐、倦怠感、下痢発熱、肝機能障害
膵内分泌腫瘍 (C25.4)	AADC-0169	Everolimus	Everolimus 10mg/day 連日経口投与 副作用: 口内炎、発疹、下痢、疲労、末梢性浮腫、悪心・嘔吐、食欲不振、鼻出血、貧血、味覚障害、体重減少、頭痛、掻痒症、高血糖、血小板減少、無力症、間質性肺炎、腎不全、アナフィラキシー様症状、急性呼吸窮迫症候群、肺塞栓症、深部静脈血栓症、好中球減少、悪性腫瘍(二次発癌)、皮膚乾燥、爪の障害、心嚢液貯留、進行性多巣性白室脳症、BKウイルス腎症、細胞蛋白症
消化管神経内分泌腫瘍 (C26.9)	AADC-0188	サントスタチンLAR	サンドスタチンLAR 1回30mgを4週毎に臀部筋肉内に注射 副作用: 注射部位硬結、注射部位疼痛、胆石症、下痢
膵・消化管神経内分泌腫瘍 (C25.4、C26.9)	AADC-0257	Lanreotide	Lanreotide 1回120mgを4週毎に深部皮下内に注射 副作用: 注射部位硬結、注射部位疼痛、徐脈、胆石症、下痢、白色便
膵・消化管神経内分泌腫瘍 (C25.4、C26.9)	AADC-0277	Streptozocin	Streptozocin 1000 mg/m <sup>2</sup> 1週間毎 30分かけて点滴静注 副作用: 腎障害、骨髄抑制、耐糖能異常、肝障害、血管痛、悪心、便秘、味覚異常、倦怠感
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0001	S-1(CG)	用法 a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的) 用量 朝食後および夕食後の1日2回 体表面積 1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回 1.25から1.5m <sup>2</sup> 未満 50 mg/回 1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0010	UFT(UFTE)	用法・用量 1日量としてテガフル300-600mgを1日2-3回に分割投与 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0015	GEM	GEM 1000 mg/m <sup>2</sup> を週1回 3回投与 1週休薬 1000 mg/m <sup>2</sup> を2週間に1回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0019	PTX + CBDCA療法(TC)	PTX 200mg/m <sup>2</sup> day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 3週ごと 副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害
肺癌 (C34)	AADC-0020	DTX + CDDP療法(DC)	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメ名称	用法等
非小細胞肺癌			DTX 60mg/m <sup>2</sup> day1 CDDP 80mg/m <sup>2</sup> day1 3~4週ごと 副作用: 悪心・嘔吐、腎機能障害、神経毒性、聴覚障害、電解質異常、浮腫、倦怠感、味覚異常、爪の変形、骨髄抑制、脱毛
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	AADC-0022	<i>Iressa</i>	250mgを1日1回経口投与 副作用: 下痢、皮膚乾燥症、ニキビ様皮疹、肝機能障害、間質性肺炎
<b>肺癌(C34)</b> 非細胞肺癌	AADC-0025	<i>CPT-11</i>	CPT-11 100mg/m <sup>2</sup> day1.8.15 1週間隔で3回投与、1週休薬 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、間質性肺炎
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	AADC-0091	<i>tri-weekly DTX</i>	DTX 60mg/m <sup>2</sup> day1 3週ごと 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	AADC-0098	<i>CPT-11+CDDP療法(IP)</i>	CDDP 80mg/m <sup>2</sup> day1 CPT-11 60mg/m <sup>2</sup> day1.8.15 4週ごと 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、倦怠感、腎機能障害、下痢、間質性肺炎、食欲不振、末梢神経障害、脱毛、
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	AADC-0106	<i>Tarceva</i>	エルロチニブ 150mg 1日1回経口投与 副作用: 発疹、下痢、皮膚乾燥、掻痒感、間質性肺疾患、肝機能障害
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	AADC-0111	<i>VNR</i>	ビンレルビン 25mg/m <sup>2</sup> day1.8 3週ごと(4クール以上、最大6クール)
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	AADC-0114	<i>Pemetrexed+ CDDP療法</i>	Pemetrexed 500mg/m <sup>2</sup> day1 CDDP 75mg/m <sup>2</sup> day1 3週毎 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、倦怠感、口内炎、神経障害
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	AADC-0119	<i>CDDP+VNR+IMRT療法</i>	CDDP 80mg/m <sup>2</sup> day1 VNR 20mg/m <sup>2</sup> day1、8 3週ごと 4コース 放射線療法 2Gy/日 5回/週 計6週30回60Gy (化学療法1コース目のday3から開始) 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、間質性肺炎、食欲不振、口内炎、倦怠感、腎機能障害
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	AADC-0149	<i>Bevacizumab based TC療法</i>	PTX 200mg/m <sup>2</sup> day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 ベバシズマブ 15mg/kg day1 3週ごと CBDCA+PTX+ベバシズマブを3週間間隔で4~6サイクル実施後、アバチン単独を3週間間隔で投与する 副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
肺癌(C34) 非小細胞肺癌	AADC-0151	CDDP+VNR療法	肝機能障害、高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、喀血、肺出血、血栓塞栓症
			CDDP 80mg/m <sup>2</sup> day1
			VNR 25mg/m <sup>2</sup> day1、8
			3週ごと 4コース
			副作用： 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、間質性肺炎、食欲不振、口内炎、倦怠感 腎機能障害
肺癌(C34) 非小細胞肺癌	AADC-0170	Pemetrexed	Pemetrexed 500mg/m <sup>2</sup> day1
			3週毎 4コース
			副作用： 肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心
肺癌(C34) 非小細胞肺癌	AADC-0180	CBDCA+Pemetrexed	Pemetrexed 500mg/m <sup>2</sup> day1
			CBDCA 目標AUC=6 day1
			3週毎 4コース
			副作用： 肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり
肺癌(C34) ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行再発非小細胞肺癌 ROS1融合遺伝子陽性の切除不能な進行再発非小細胞肺癌	AADC-0176	Crizotinib	Crizotinib 1回250mg1日2回内服
			副作用： 悪心・嘔吐、視力障害、下痢、便秘、末梢性浮腫、間質性肺炎 肝機能障害、QT間隔延長、骨髄抑制
肺癌(C34) 進行性非扁平非小細胞肺癌	AADC-0181	PEM+CBDCA+BV followed by PEM+BV	Pemetrexed 500mg/m <sup>2</sup> day1
			CBDCA 目標AUC=6 day1
			ベニシズマブ 15mg/kg day1
			3~4週毎4コース後 CR、PR、SDなら維持療法へ
			維持療法
			Pemetrexed 500mg/m <sup>2</sup> day1
			ベニシズマブ 15mg/kg day1
3週毎PDになるまで継続			
			副作用： 肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり 高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、喀血、肺出血、血栓塞栓症
肺癌(C34) 非小細胞肺癌	AADC-0186	CBDCA+S-1療法	CBDCA 目標AUC=5 day1
			TS-1 80~120mg/body day1~14
			3週毎 副作用 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 神経障害、関節痛、脱毛
肺癌(C34) 非小細胞肺癌	AADC-0189	IMRT+CBDCA	CBDCA 30mg/m <sup>2</sup> day1~day5
			IMRT 2Gy/日 day1~day5
			1週毎
			CBDCAは4週間実施、IMRTは6週間実施
			副作用： 嘔気・嘔吐、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、発熱、骨髄抑制、肝機能障害 アナフィラキシー様症状、間質性肺炎、急性腎不全、肝不全、 消化管壊死、消化管出血、出血性腸炎、偽膜性大腸炎、麻痺性イレウス 脳梗塞、肺梗塞、血栓・塞栓症、心筋梗塞、うつ血性心不全、溶血性尿毒症候群 急性呼吸窮迫症候群、DIC、急性膀胱炎、難聴、皮膚炎、放射線肺炎、放射線食道炎

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			脊髄症
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	<b>AADC-0194</b>	<b>nab-paclitaxel + Carboplatin</b>	アブラキシサン 100mg/m <sup>2</sup> day1, 8, 15 CBDCA 目標AUC=6/body day1 4週毎 副作用: 脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹 食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、脳神経麻痺、アナフィラキシー 間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	<b>AADC-0201</b>	<b>AVAPERL</b>	Pemetrexed 500mg/m <sup>2</sup> day1 CDDP 75mg/m <sup>2</sup> day1 ペバシズマブ 7.5mg/kg day1 3週毎4コース後 SDもしくはresponse(+)なら維持療法へ 維持療法 Pemetrexed 500mg/m <sup>2</sup> day1 ペバシズマブ 7.5mg/kg day1 3週毎PDになるまで継続 副作用: 腎機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり 高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、喀血、肺出血、血栓塞栓症
<b>肺癌(C34)</b> 局所進行非小細胞肺癌	<b>AADC-0202</b>	<b>S-1+CDDP+RT</b>	CDDP 60mg/m <sup>2</sup> day1 TS-1 1回40mg/m <sup>2</sup> 1日2回 day1~14 4週毎2コース施行中に放射線治療施行 1回2Gy 週5日 30回照射 計60Gy(6週間) 上記化学放射線療法終了後2週間後から CDDP 60mg/m <sup>2</sup> day1 TS-1 1回40mg/m <sup>2</sup> 1日2回 day1~14 4週毎2コース施行 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
<b>肺癌(C34)</b> EGFR遺伝子変異陽性の手術不能または再発 非小細胞肺癌	<b>AADC-0204</b>	<b>Afatinib</b>	Afatinib 1日1回40mg経口投与 患者の状態により適宜増減 1日50mgまで 副作用: 下痢、発疹、爪囲炎、口内炎、間質性肺炎、皮膚障害、肝機能障害 鼻出血、食欲減退、疲労、粘膜の炎症、体重減少、味覚異常 結膜炎、心障害
<b>肺癌(C34)</b> 小細胞肺癌	<b>AADC-0010</b>	<b>UFT(UFTE)</b>	用法・用量 1日量としてテガフル300-600mgを1日2-3回に分割投与 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
<b>肺癌(C34)</b> 小細胞肺癌	<b>AADC-0023</b>	<b>CBDCA+ETP療法(CE)</b>	VP-16 80mg/m <sup>2</sup> day1~3 CBDCA 目標AUC=5/body day1 3~4週ごと 副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振
<b>肺癌(C34)</b> 小細胞肺癌	<b>AADC-0024</b>	<b>CPT-11+ CDDP療法(IP)</b>	CDDP 60mg/m <sup>2</sup> day1 CPT-11 60mg/m <sup>2</sup> day1.8.15

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			4週ごと 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、倦怠感、腎機能障害、下痢、間質性肺炎、食欲不振、末梢神経障害、脱毛、
肺癌(C34) 小細胞肺癌	AADC-0025	CPT-11	CPT-11 100mg/m <sup>2</sup> day1.8.15 1週間隔で3回投与、2週休薬 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、間質性肺炎
肺癌(C34) 小細胞肺癌	AADC-0100	PE(CDDP+ETP)+IMRT療法	CDDP 80mg/m <sup>2</sup> day1 VP-16 100mg/m <sup>2</sup> day1~3 3~4週ごと 4コース 副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振
肺癌(C34)	AADC-0137	AMR	AMR 35~40mg/m <sup>2</sup> 3日間連続投与 3週ごと 3~6コース 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、脱毛、肝機能障害、発熱
肺癌(C34)	AADC-0145	GC療法	GEM 1000mg/m <sup>2</sup> day1.8 CDDP 80mg/m <sup>2</sup> day1 3週毎 4~6コース 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱
肺癌(C34) ALK陽性・ROSI陽性肺癌	AADC-0176	Crizotinib	クリゾチニブ 1回250mgを1日2回経口投与 副作用: 間質性肺疾患、肝機能障害、QT間隔延長、徐脈、血液障害、心不全、発疹、便秘、口内炎、悪心、腎機能障害、倦怠感、筋肉痛、光線過敏性
肺癌(C34) CPT-11が使用できない進展型小細胞肺癌	AADC-0177	CDDP+VP-16	CDDP 80mg/m <sup>2</sup> day1 VP-16 100mg/m <sup>2</sup> day1~3 副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振
肺癌(C34)	AADC-0210	Alectinib	アレクチニブ 1回300mg1日2回経口投与 副作用: 間質性肺疾患、肝機能障害、骨髄抑制、消化管穿孔、血栓塞栓症、味覚異常、発疹、便秘、口内炎、悪心、腎機能障害、倦怠感、筋肉痛、光線過敏性
肺癌(C34) EGFR遺伝子変異陽性肺癌	AADC-0211	Erlotinib+Bevacizumab併用療法	ベバシズマブ 15mg/kg 3週間毎 エルロチニブ 100~150mg 1日1回経口投与 副作用: 発疹、下痢、皮膚乾燥、掻痒感、肝機能障害、神経毒性、食欲減退、口内炎、嘔吐、高血圧、脱毛、関節痛、疲労、倦怠感、卵巣機能不全 重大な副作用: ショック、アナフィラキシー、消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧クリーゼ、可逆性後白質脳症症候群、ネフローゼ症候群、骨髄抑制、感染症、うつ血性心不全、間質性肺炎、血栓性微小血管症、
肺癌(C34) 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症、大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害、腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
肺癌(C34)	AADC-0231	Osimertinib	タグリッソ 1日1回80mg 副作用: 発疹、ざ瘡、下痢、皮膚乾燥、爪の障害、間質性肺炎、QT間隔延長

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			骨髄抑制、肝機能障害
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	<b>AADC-0232</b>	<b>RAM+DTX</b>	RAM 10mg/kg day1 3週ごと DTX 60mg/m <sup>2</sup> day1 3週ごと 副作用: 腹痛、高血圧、下痢、 動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害 インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血 骨髄抑制、低カリウム血症、低ナトリウム血症 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、
<b>肺癌(C34)</b> PD-L1陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 PD-L1陽性の未治療非小細胞肺癌	<b>AADC-0235</b>	<b>Pembrolizumab</b>	ペムプロリズマブ 1回200mg 3週間隔 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
<b>肺癌(C34)</b>	<b>AADC-0237</b>	<b>Ceritinib</b>	セリチニブ 1日1回750mg空腹時に経口投与 副作用: 間質性肺炎、肝機能障害、QT間隔延長、徐脈、下痢 高血糖、眼障害、皮下組織障害、胃腸障害、疲労 腎及び尿路障害
<b>肺癌(C34)</b> 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	<b>AADC-0241</b>	<b>Atezolizumab</b>	アテゾリズマブ 1200mg day1 3週ごと 副作用: 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害
<b>肺癌(C34)</b>	<b>AADC-0243</b>	<b>Lorlatinib</b>	ロルラチニブ 1日1回100mgを経口投与 副作用: 間質性肺炎、肝機能障害、QT間隔延長、徐脈、下痢 膵炎、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症 末梢性ニューロパシー
<b>肺癌(C34)</b> 進行性非扁平上皮非小細胞肺癌	<b>AADC-0245</b>	<b>CBDC+PEM+Pembrolizumab→PEM+Pembrolizumab</b>	Pemetrexed 500mg/m <sup>2</sup> day1 CBDC 目標AUC=5 day1 Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎4コース後 維持療法へ 維持療法 Pemetrexed 500mg/m <sup>2</sup> day1 Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎 副作用: 肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
<b>肺癌(C34)</b>	<b>AADC-0246</b>	<b>CBDC+nab-PTX+Pembrolizumab→Pembrolizumab</b>	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
扁平上皮癌			アブラキサン 100mg/m <sup>2</sup> day1, 8, 15 CBDCA 目標AUC=6/body day1 Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎4コース後 維持療法へ 維持療法 Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎 副作用: 脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹 食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー 間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
<b>肺癌(C34)</b>	<b>AADC-0247</b>	<b>CBDCA+PTX+Bevacizumab+Atezolizumab→Bevacizumab+Atezolizumab維持療法</b>	
非扁平上皮非小細胞肺癌			PTX 200mg/m <sup>2</sup> day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 ベバシズマブ 15mg/kg day1 アテゾリズマブ 1200mg/body day1 3週毎4-6コース後 維持療法へ 維持療法 ベバシズマブ 15mg/kg day1 アテゾリズマブ 1200mg/body day1 3週毎 副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、悪心・嘔吐 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害
<b>肺癌(C34)</b>	<b>AADC-0254</b>	<b>CBDCA+VP-16+Atezolizumab f/b Atezolizumab</b>	
小細胞肺癌			VP-16 100mg/m <sup>2</sup> day1~3 CBDCA 目標AUC=5 day1 アテゾリズマブ 1200mg/body day1 3週毎4コース後 維持療法へ 維持療法 アテゾリズマブ 1200mg/body day1 3週毎 副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害
<b>肺癌(C34)</b>	<b>AADC-0262</b>	<b>CBDCA+PEM+Atezolizumab→PEM+Atezolizumab</b>	
進行性非扁平上皮非小細胞肺癌			Pemetrexed 500mg/m <sup>2</sup> day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 Atezolizumab 1200mg/boc day1 3週毎4-6コース後 維持療法へ 維持療法 Pemetrexed 500mg/m <sup>2</sup> day1 Atezolizumab 1200mg/boc day1

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメ名称	用法等
			3週毎 副作用: 肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
<b>肺癌(C34)</b> HER2遺伝子変異陽性 非小細胞肺癌	AADC-0264	Trastuzumab Deruxtecan	Trastuzumab Deruxtec 5.4mg/kg day1 3週ごと 副作用: 間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション 骨髄抑制、脱毛、疲労、悪心・嘔吐、下痢、便秘、口内炎
<b>肺癌(C34)</b> 非小細胞肺癌	AADC-0268	Pembrolizumab(6週間)	ペムプロリズマブ 1回400mg 6週間隔 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
<b>肺癌(C34)</b> 小細胞肺癌	AADC-0270	CDDP+VP-16+Durvalumab→維持療法Durvalumab	VP-16 80-100mg/m <sup>2</sup> day1~3 CDDP 75-80mg/m <sup>2</sup> day1 Durvalumab 1500mg/body day1 3週毎4コース後 維持療法へ 維持療法 Durvalumab 1500mg/body day1 4週毎 副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振 腎機能障害、疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害
<b>肺癌(C34)</b> 小細胞肺癌	AADC-0271	CBDCa+VP-16+Durvalumab→維持療法Durvalumab	VP-16 80-100mg/m <sup>2</sup> day1~3 CBDCa 目標AUC=5-6 day1 Durvalumab 1500mg/body day1 3週毎4コース後 維持療法へ 維持療法 Durvalumab 1500mg/body day1 4週毎 副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害
<b>肺癌(C34)</b> 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
肺癌(C34) 非小細胞肺癌	AADC-0274	Ipilimumab+Nivolumab	Ipilimumab 1mg/kg 6週間隔
			Nivolumab 360mg/body 3週間隔
			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
			血球食食症候群、結核
肺癌(C34) 小細胞肺癌	AADC-0275	Nogitecan	Nogitecan 1mg/m <sup>2</sup> 5日間連続投与
			3週ごと
			副作用: 骨髄抑制、消化管出血、間質性肺炎、血栓塞栓症
			悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、発熱、易疲労感
肺癌(C34) 非小細胞肺癌(前治療2レジメン以内)	AADC-0276	nab-PTX単剤	nab-PTX 100mg/m <sup>2</sup> day1,8,15
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感
			脱毛、末梢神経障害、発疹、下痢
肺癌(C34) 非小細胞肺癌	AADC-0279	Ipilimumab+Nivolumab+PEM+CDDP	Ipilimumab 1mg/kg 6週間隔
			Nivolumab 360mg/body 3週間隔
			Pemetrexed 500mg/m <sup>2</sup> 3週間隔
			CDDP 75mg/m <sup>2</sup> 3週間隔
			★CDDP+Pemetrexedは2コースで終了
			★維持療法はNivolumab(±Pemetrexed)を3週毎+Ipilimumab6週毎
			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
			血球食食症候群、結核
			悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎
肺癌(C34) 非小細胞肺癌	AADC-0280	Ipilimumab+Nivolumab+PEM+CBDCA	Ipilimumab 1mg/kg 6週間隔
			Nivolumab 360mg/body 3週間隔
			Pemetrexed 500mg/m <sup>2</sup> 3週間隔
			CBDCA 目標AUC=6 3週間隔
			★CBDCA+Pemetrexedは2コースで終了
			★維持療法はNivolumab(±Pemetrexed)を3週毎+Ipilimumab6週毎
			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
			血球食食症候群、結核
			発疹、骨髄抑制、悪心、下痢、味覚異常、便秘、しゃっくり
肺癌(C34) 非小細胞肺癌	AADC-0281	Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX	Ipilimumab 1mg/kg 6週間隔
			Nivolumab 360mg/body 3週間隔
			PTX 200mg/m <sup>2</sup> 3週間隔
			CBDCA 目標AUC=6 3週間隔
			★CBDCA+PTXは2コースで終了
			★維持療法はNivolumabを3週毎+Ipilimumab6週毎
			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
			血球食食症候群、結核
			脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、悪心・嘔吐

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
肺癌(C34) 扁平上皮癌	AADC-0282	Nectumumab+GEM+CDDP	Necitumumab 800mg day1.8
			GEM 1250mg/m <sup>2</sup> day1.8
			CDDP 75mg/m <sup>2</sup> day1
			3週毎
			★CDDP+GEMは最大6コース
			★維持療法はNecitumumab単剤でPDまで継続
肺癌(C34)	AADC-0299	CBDCA+PTX+Pembrolizumab	副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱
			ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、低マグネシウム血症、
			掻痒感、インフュージョンリアクション、下痢
			CBDCA 目標AUC=6/body day1
			PTX 200mg/m <sup>2</sup> day1
			Pembrolizumab 200mg/body day1
肺癌(C34)	AADC-0304	Erlotinib+Ramucirumab	3週毎4コース後 維持療法へ
			維持療法
			Pembrolizumab 200mg/body day1
			3週毎
			副作用: 脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹
			食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー
肺癌(C34) EGFR遺伝子変異陽性肺癌	AADC-0305	Gefitinib+Ramucirumab	間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全
			難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群
			急性腎不全、白質脳症、
			大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病
			膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
			ラムシルマブ 10mg/kg 2週間毎
肺癌(C34) EGFR遺伝子変異陽性肺癌	AADC-0306	Dabrafenib+Trametinib	エルロチニブ 150mg 1日1回 空腹時 連日経口投与
			副作用: 高血圧、動脈血拴塞栓症、静脈血拴塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害
			インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血
			発疹、下痢、皮膚乾燥、掻痒感、間質性肺疾患、肝機能障害
			ラムシルマブ 10mg/kg 2週間毎
			ゲフィチニブ 250mg 1日1回 連日経口投与
肺癌(C34) BRAF遺伝子変異陽性肺癌	AADC-0307	CBDCA+PTX+RT	副作用: 高血圧、動脈血拴塞栓症、静脈血拴塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害
			インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血
			発疹、下痢、皮膚乾燥、掻痒感、間質性肺疾患、肝機能障害
			ダブラフェニブ 1回150mg 1日2回 空腹時連日経口投与
			トラメチニブ 1回2mg 1日1回 空腹時連日経口投与
			副作用: 発熱、肝機能障害、眼障害、心障害
肺癌(C34) 局所進行非小細胞肺癌	AADC-0315	Atezolizumab+nab-PTX+CBDCA→Atezolizumab	静脈血拴塞栓症、脳血管障害
			有棘細胞癌、横紋筋融解症、間質性肺疾患
			PTX 40mg/m <sup>2</sup> day1
			CBDCA 目標AUC=2 day1
			毎週投与 計6回(放射線療法を行っている間)
			副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、
肺癌(C34) 非小細胞肺癌 非扁平上皮癌	AADC-0315	Atezolizumab+nab-PTX+CBDCA→Atezolizumab	肝機能障害
			アブラキササン 100mg/m <sup>2</sup> day1, 8, 15
			CBDCA 目標AUC=6/body day1

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			Atezolizumab 1200mg/body day1 3週毎4コース後 維持療法へ 維持療法
			Atezolizumab 1200mg/body day1 3週毎 副作用: 脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹 食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー 間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
肺癌(C34) ALK陽性肺癌	AADC-0325	Brigatinib	ブリグチニブ 1日1回90mgを7日間経口投与後、1日1回180mgを経口投与 (14日以上休薬した場合は90mgにて再開) 副作用: 間質性肺疾患、高血圧、徐脈、高血糖 視覚障害、CK上昇、リバーゼorアミラーゼ上昇(膵炎) 下痢、悪心、肝機能障害、口内炎、発疹
肺癌(C34) KRAS G12C変異陽性肺癌	AADC-0328	Sotorasib	ソトラシブ 1日1回 960mg(8錠)を連日経口投与 副作用: 食欲不振、悪心、嘔吐、下痢 肝機能障害、間質性肺疾患
肺癌(C34) ROS1融合遺伝子陽性肺癌	AADC-0331	Entrectinib	エントレクチニブ 1日1回 600mg(3Cap)を連日経口投与 副作用: 心臓障害、QT延長、認知障害・運動失調 間質性肺疾患、失神、成長発達遅延 味覚異常、浮動性めまい、末梢感覚ニューロパシー
肺癌(C34) 非小細胞肺癌	AADC-0332	Tremelimumab+durvalumab+PEM+CBDCA	Tremelimumab 75mg/body day1 Durvalumab 1500mg/boç day1 Pemetrexed 500mg/m <sup>2</sup> day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 3週毎 CBDCAは4コースで終了 維持療法は4週毎にPemetrexed+Durvalumab ★維持療法の2回目のみ Pemetrexed+Durvalumab+Tremelimumab 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 発疹、骨髄抑制、悪心、下痢、味覚異常、便秘、しゃっくり
肺癌(C34) 非小細胞肺癌	AADC-0333	Tremelimumab+durvalumab+nab-PTX+CBDCA	Tremelimumab 75mg/body day1 Durvalumab 1500mg/boç day1 nab-PTX 100mg/m <sup>2</sup> day1、8、15 CBDCA 目標AUC=6 day1 3週毎 CBDCA+nab-PTXは4コースで終了 維持療法は4週毎にDurvalumab ★維持療法の2回目のみ Durvalumab+Tremelimumab 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、悪心・嘔吐
<b>肺癌(C34)</b> 術前 StageⅢA(StageⅡでも症例によって考慮)	<b>AADC-0334</b>	<b>Nivolumab+PTX+CBDCA(術前のみ)</b>	Nivolumab 360mg/body day1 CBDCA 目標AUC=5 or 6 day1 PTX 175mg/m <sup>2</sup> day1 3週毎 最大3コース 副作用: 脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹 食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー 間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
<b>肺癌(C34)</b> 肺腺癌術前 StageⅢA(StageⅡでも症例によって考慮)	<b>AADC-0335</b>	<b>Nivolumab+CDDP+PEM(術前のみ)</b>	Nivolumab 360mg/body day1 Pemetrexed 500mg/m <sup>2</sup> day1 CDDP 75mg/m <sup>2</sup> day1 3週毎 最大3コース 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎
<b>肺癌(C34)</b> 切除可能非小細胞肺癌	<b>AADC-0338</b>	<b>Nivolumab+GEM+CDDP(術前のみ)</b>	Nivolumab 360mg/body day1 CDDP 75mg/m <sup>2</sup> day1 GEM 1000mg/m <sup>2</sup> day1,day8 3週毎 最大3コース 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎
<b>肺癌(C34)</b> 根治的化学放射線療法後の維持療法 投与期間は12ヶ月まで	<b>AADC-0345</b>	<b>Durvalumab</b>	Durvalumab 1500mg/body day1 体重30kg以下の場合は1回20mg/kg 4週毎 副作用: 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー
<b>肺癌(C34)</b> METエクソン14スキッピング変異陽性 切除不能な進行・再発非小細胞性肺癌	<b>AADC-0350</b>	<b>Capmatinib</b>	カプマチニブ 1日2回 1回400mg を連日経口投与 副作用: 間質性肺疾患、体液貯留、肝機能障害、腎機能障害 悪心・嘔吐、下痢、リバーゼ増加、疲労 低リン酸血症、発疹、便秘、血中ビリルビン増加
<b>肺癌(C34)</b> EGFR変異陽性肺癌	<b>AADC-0359</b>	<b>Osimertinib+PEM+CDDP</b>	Osimertinib 1日1回80mg を連日経口投与 CDDP 75mg/m <sup>2</sup> day1 Pemetrexed 500mg/m <sup>2</sup> day1 3週毎 CDDP併用は最大4コース 維持療法はPEM 500mg/m <sup>2</sup> day1 3週毎 + Osimertinib 80mg 連日 副作用: 悪心・嘔吐、下痢、便秘、食欲不振、口内炎

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメ名称	用法等
			皮疹、皮膚乾燥、浮腫 貧血、好中球減少、血小板減少
<b>肺癌(C34)</b> 肺扁平上皮癌(周術期)	<i>AADC-0361</i>	<i>Pembrolizumab+GEM+CDDP</i>	Pembrolizumab 200mg/body day1 CDDP 75mg/m <sup>2</sup> day1 GEM 1000mg/m <sup>2</sup> day1,day8 (術前) 3週毎 最大4コース Pembrolizumab 200 or 400mg/body day1 (術後) 200mg 3週毎 もしくは 400mg6週毎 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球食食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎
<b>肺癌(C34)</b> 非扁平上皮非小細胞肺癌(周術期)	<i>AADC-0362</i>	<i>Pembrolizumab+PEM+CDDP</i>	Pembrolizumab 200mg/body day1 Pemetrexed 500mg/m <sup>2</sup> day1 CDDP 75mg/m <sup>2</sup> day1 (術前) 3週毎 最大4コース Pembrolizumab 200 or 400mg/body day1 (術後) 200mg 3週毎 もしくは 400mg6週毎 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球食食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎
<b>胸腺腫(C37)</b>	<i>AADC-0308</i>	<i>ADOC</i>	DXR 40mg/m <sup>2</sup> day1 CDDP 50mg/m <sup>2</sup> day1 VCR 0.6mg/m <sup>2</sup> (最大2mg/body day3 CPA 700mg/m <sup>2</sup> day4 3週毎 副作用: 骨髄抑制、心毒性、末梢神経障害、肝障害、悪心・嘔吐、脱毛 腎障害、出血性膀胱炎
<b>胸腺癌(C37)</b> 進行胸腺癌2次治療以降	<i>AADC-0222</i>	<i>Lenvatinib</i>	用法・用量 1回24mg 1日1回 副作用: 高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労 口内炎、蛋白尿、手掌・足底発赤知覚不全症候群、出 動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔 可逆性後白質脳症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延 低カルシウム血症
<b>悪性胸膜中皮腫(C38)</b>	<i>AADC-0114</i>	<i>Pemetrexed+ CDDP療法</i>	Pemetrexed 500mg/m <sup>2</sup> day1 CDDP 75mg/m <sup>2</sup> day1 3週毎 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、倦怠感、口内炎、神経障害
<b>悪性胸膜中皮腫(C38)</b>	<i>AADC-0225</i>	<i>Nivolumab</i>	ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
悪性胸膜中皮腫(C38)	AADC-0274	Ipilimumab+Nivolumab	Ipilimumab	1mg/kg 6週間隔
			Nivolumab	360mg/body 3週間隔
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核
悪性胸膜中皮腫(C38)	AADC-0349	CBDCA+Pemetrexed	Pemetrexed	500mg/m <sup>2</sup> day1
			CBDCA	目標AUC=5 day1
			3週毎	4-6コース
			副作用:	肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり
骨髄腫(C42)	AADC-0161	Bortezomib	ボルテゾミブ	1.3mg/m <sup>2</sup> 1日1回 day1.4.8.11
			3週毎	
			副作用:	肺障害、心障害、末梢性ニューロパシー、イレウス 骨髄抑制、低血圧、腫瘍崩壊症候群、皮膚粘膜眼症候群 中毒性表皮壊死症、発熱、可逆性後白質脳症候群 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、肝機能障害
骨髄腫(C42)	AADC-0165	Bortezomib+Dexamethasone	ボルテゾミブ	1.3mg/m <sup>2</sup> 1日1回 day1.4.8.11
			デキサメタゾン	20mg 1日1回 day1.2.4.5.8.9.11.12
			3週毎	
			副作用:	肺障害、心障害、末梢性ニューロパシー、イレウス 骨髄抑制、低血圧、腫瘍崩壊症候群、皮膚粘膜眼症候群 中毒性表皮壊死症、発熱、可逆性後白質脳症候群 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、肝機能障害、血管浮腫 不眠症、無力症、疲労、錯覚症、筋痙攣、高血糖 誘発感染症、続発性副腎皮質機能不全、消化性潰瘍 骨粗鬆症、霧視、紅斑、味覚異常、血栓塞栓症、緑内障、
骨髄腫(C42) 原発性マクログロブリン血症	AADC-0218	DRC療法	デキサメタゾン	20mg 点滴 day1
			リツキシマブ	375mg/m <sup>2</sup> 点滴 day1
			シクロホスファミド	200mg/m <sup>2</sup> 経口 day1~5
			3週毎6ヶ月間	
副作用:	アナフィラキシー様症状、腫瘍崩壊症候群、肝機能障害、 皮膚粘膜症状、皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死融解症 骨髄抑制、間質性肺炎、心障害、消化管穿孔、イレウス、 SIADH 横紋筋融解症、悪心・嘔吐、脱毛、色素沈着、食欲不振 口内炎、不眠、高血糖			
悪性黒色腫(C43)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ	240mg/body 2週間隔
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
悪性黒色腫(C43)	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ	480mg/body 4週間隔
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
悪性軟部腫瘍 (C49)	AADC-0199	Pazopanib	パゾパニブ 1日1回800mg 経口投与 副作用: 下痢、疲労、悪心、高血圧、毛髪変色、食欲減退、体重減少、味覚異常 肝機能障害、心機能障害、動脈血栓性事象、静脈血栓性事象、出血 甲状腺機能障害、ネフローゼ症候群、蛋白尿、感染症、創傷治癒遅延
悪性軟部腫瘍 (C49)	AADC-0265	doxorubicin	doxorubicin 75mg/m <sup>2</sup> day1 3週毎 total 6回施行 (心毒性に対する用量制限) 副作用: 悪心・嘔吐、白血球減少、食欲不振、脱毛、肝機能異常、下痢・軟便 全身倦怠感、口内炎
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経前	AADC-0027	Tamoxifen	TAM 1日1回20mg 副作用: 無月経、月経異常、悪心・嘔吐、食欲不振
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経前	AADC-0069	Zoladex	ゴセリン 4週に1回3.6mgを皮下投与 副作用: 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経前	AADC-0070	Zoladex LA	ゴセリン 10.8mgを前腹部に12~13週毎に1回投与 副作用: 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経前	AADC-0094	Leuprorelin	リュープロレリン 4週に1回3.75mgを皮下投与 12週に1回11.25mgを皮下投与へ切り替え使用あり 副作用: 間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、肝機能障害、黄疸、うつ状態 熱感、ほてり、のぼせ、頭痛・頭重、発汗、寝汗、注射部位障害 悪心・嘔吐、体重増加
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経前	AADC-0095	Leuprorelin +TAM療法	リュープロレリン 4週に1回3.75mgを皮下投与 12週に1回11.25mgを皮下投与へ切り替え使用あり TAM 1日1回20mg 副作用: 間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、肝機能障害、黄疸、うつ状態 熱感、ほてり、のぼせ、頭痛・頭重、発汗、寝汗、注射部位障害 悪心・嘔吐、体重増加、無月経、月経異常
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経前	AADC-0096	Leuprorelin + Femara療法	リュープロレリン 4週に1回3.75mgを皮下投与 12週に1回11.25mgを皮下投与へ切り替え使用あり レトロゾール 1日1回2.5mg 副作用: 間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、肝機能障害、黄疸、うつ状態 熱感、ほてり、のぼせ、頭痛・頭重、発汗、寝汗、注射部位障害 悪心・嘔吐、体重増加、関節痛、発疹、掻痒感、血栓症、塞栓症
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経前	AADC-0097	Femara	レトロゾール 1日1回2.5mg 副作用: ほてり、頭痛、関節痛、悪心、発疹、掻痒感、肝機能障害 塞栓症、血栓症
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経後	AADC-0030	Arimidex	アナストロゾール 1日1回 1mg 副作用: ほてり、嘔気、脱毛、性器出血
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経後	AADC-0031	Aromasin	エキセメスタン 1日1回 25mg 副作用: ほてり、多汗、高血圧、めまい、悪心、疲労
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経後	AADC-0032	Fareston	トレミフェン 1日1回40mg 副作用: 肝機能障害、白血球減少

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
乳癌(C50) 内分泌療法 閉経後	AADC-0033	high dose Fareston	トレミフェン 1日1回120mg 副作用: 肝機能障害、白血球減少
乳癌(C50) 内分泌療法 閉経後	AADC-0034	Hysron-H	MPA 1日600から1200mg 分3 副作用: 体重増加、満月様顔貌、子宮出血、浮腫、血栓症、月経異常
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0001	S-1(CG)	用法 a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的) 用量 朝食後および夕食後の1日2回 体表面積 1.25㎡未満 40mg/回 1.25から1.5㎡未満 50 mg/回 1.5㎡以上 60mg/回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0010	UFT(UFTE)	用法・用量 1日量としてテガフル300-600mgを1日2-3回に分割投与 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0035	Xeloda	カペシタビン 1日2回 3週連続投与 1週休薬 体表面積 1.31㎡未満 900mg/回 1.31から1.64㎡未満 1200mg/回 1.64㎡以上 1500mg/回 副作用: 手足症候群、骨髄抑制
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0036	weekly PTX	PTX 100mg/㎡ 6週投与2週休薬 副作用: 脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛、関節痛 悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0038	tri-weekly DTX	DTX 60~75mg/㎡ day1 3週毎 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0040	FEC100療法	5-FU 500mg/㎡ day1 EPI 100mg/㎡ day1 CPA 500mg/㎡ day1 3週毎 副作用: 悪心・嘔吐、白血球減少、食欲不振、脱毛、肝機能異常、下痢・軟便 全身倦怠感、口内炎
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0042	weekly Trastuzumab	トラスツズマブ 初回 4mg/kg 2回目以降 2mg/kg 毎週投与 副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0043	bi weekly Trastuzumab	トラスツズマブ 4mg/kg day1 2週毎 副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0044	bi weekly PTX + Trastuzumab療法	PTX 80mg/㎡ day1 トラスツズマブ 4mg/kg day1 2週毎 副作用: 脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛 関節痛、悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常、発熱、悪寒

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0045	VNR	アントラサイクリン系・タキサン系無効例 25mg/m <sup>2</sup> 1週間間隔で2回投与 1週休薬 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、嘔気・嘔吐、静脈炎、発熱、口内炎 電解質異常
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0046	VNR + Trastuzumab療法	VNR 25mg/m <sup>2</sup> day1 2回投与1週休薬 トラスツズマブ 2mg/kg day1 毎週投与 (初回は4mg/kg) 3週毎 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、嘔気・嘔吐、静脈炎、発熱、口内炎 電解質異常、悪寒
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0087	tri-weekly Trastuzumab	トラスツズマブ 初回8mg/kg day1 2回目以降 6mg/kg day1 3週毎 副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0088	weekly trastuzumab + PTX療法	PTX 80mg/m <sup>2</sup> day1 トラスツズマブ 2mg/kg day1 毎週投与 副作用: 脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛 関節痛、悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常、発熱、悪寒
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0129	Tykerb + Xeloda 療法	タイケルブ 1回1250mg 1日1回 連日投与 カペシタビン 1回1000mg/m <sup>2</sup> 1日2回 2週連続投与 1週休薬 副作用: 手足症候群、骨髄抑制、下痢、口内炎、倦怠感、嘔気・嘔吐
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0130	DTX+Cyclophosphamide療法	DTX 60~75mg/m <sup>2</sup> day1 CPA 500~600mg/m <sup>2</sup> day1 3週毎 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0131	DTX +Xeloda療法	DTX 60~75mg/m <sup>2</sup> day1 3週毎 カペシタビン 1回1250mg/m <sup>2</sup> 1日2回 2週連続投与 1週休薬 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害、手足症候群
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0132	DTX+tri-weekly Trastuzumab 療法	DTX 60~75mg/m <sup>2</sup> day1 3週毎 トラスツズマブ 初回8mg/kg 2回目以降 6mg/kg day1 3週毎 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0144	XELODA + Trastuzumab療法	カペシタビン 1回1250mg/m <sup>2</sup> 1日2回 2週連続投与 1週休薬 トラスツズマブ 6mg/kg day1 3週毎 副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制、手足症候群
乳癌(C50) トリプルネガティブ	AADC-0149	Bevacizumab based TC療法	PTX 200mg/m <sup>2</sup> day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 ベバシズマブ 15mg/kg day1 3週ごと CBDCA+PTX+ベバシズマブを3週間間隔で4~6サイクル実施後、アバシチン単独を 3週間間隔で投与する 副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、 肝機能障害、高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、喀血、肺出血、血栓塞栓症

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
乳癌(C50) 進行・再発乳癌 化学療法	AADC-0150	tri-weekly Abraxane	アブラキサン 1回 260mg/m <sup>2</sup> 3週毎
			副作用: 脱毛、疲労、筋痛、末梢神経障害、骨髄抑制、下痢、悪心嘔吐
乳癌(C50) アントサイクリン及びタキサンを含む抗がん剤治療後 再発・転移乳癌 化学療法	AADC-0166	Eribulin	ハラブエン 1.4mg/m <sup>2</sup> day1、8
			副作用: 骨髄抑制、脱毛、疲労、食欲減退、発熱、便秘、下痢、嘔吐、口内炎、味覚異常、末梢神経障害、肝機能障害、間質性肺炎
乳癌(C50) 内分泌療法 閉経後	AADC-0167	Fulvestrant	フルベストラント 1回2筒(1筒250mg) 左右の臀部に1筒ずつ筋肉内投与
			副作用: 初回、2週後、4週後、その後4週ごとに1回 注射部位疼痛、注射部位硬結、ほてり、注射部位掻痒感 肝機能障害、血栓塞栓症、悪心、便秘、卵巣腫大、頭痛 感覚異常、不眠症、背部痛、筋肉痛、高TG血症、高コレステロール血症
乳癌(C50)	AADC-0172	CMF(経口法)	MTX 40mg/m <sup>2</sup> day1、8
			5-FU 600mg/m <sup>2</sup> day1、8
乳癌(C50)	AADC-0173	CMF(静注法)	CPA 1回50mg 1日2回 day1~15
			副作用: 嘔気・嘔吐、食欲不振、脱毛、肝機能障害、口内炎、骨髄抑制
乳癌(C50)	AADC-0174	Bevacizumab + PTX療法	PTX 90mg/m <sup>2</sup> day1,8,15
			副作用: 嘔気・嘔吐、食欲不振、脱毛、肝機能障害、口内炎、骨髄抑制
乳癌(C50)	AADC-0190	Gemcitabine 手術不能又は再発乳癌	GEM 1250mg/m <sup>2</sup> day1,8
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感 間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、心筋梗塞、うっ血性心不全 肺水腫、気管支痙攣、ARDS、腎不全、溶血性尿毒症症候群
乳癌(C50) 進行・再発乳癌 補助化学療法	AADC-0195	THP療法	用法・用量 1クール目
			副作用 DTX を6サイクルまで投与し、7サイクル以降が主治医の判断で継続 下痢、脱毛、爪の異常、倦怠感、嘔気・嘔吐、しびれ、発疹、骨髄抑制

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			インフュージョンリアクション、うつ血性心不全
乳癌(C50)	AADC-0203	Everolimus	Everolimus 1日1回10mgを経口投与(ホルモン療法併用) 副作用: 口内炎、発疹、疲労、食欲減退、下痢、味覚異常、悪心 感染症、体重減少、貧血、鼻出血、高血糖、血小板減少 搔痒症
乳癌(C50)	AADC-0207	P/T+Eribulin	Pertuzumab 初回840mg/body 2回目以降420mg/body day1 Trastuzumab 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg day1 Eribulin 1.4mg/m <sup>2</sup> day1、day8 3週ごと 副作用: インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、脱毛、倦怠感 骨髄抑制、悪心、爪の異常、ニューロパシー、発疹、間質性肺炎 涙液増加、肝機能障害、アナフィラキシー、浮腫、疼痛
乳癌(C50)	AADC-0209	T-DM1(手術不能または再発乳癌)	T-DM1 3.6mg/kg day1 3週ごと 副作用: 倦怠感、鼻出血、悪心、発熱、食欲減退、骨髄抑制、肝機能障害 間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション 末梢神経障害
乳癌(C50)	AADC-0217	EC療法	EPI 100mg/m <sup>2</sup> day1 CPA 600mg/m <sup>2</sup> day1 3週毎 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎 出血性膀胱炎、下痢、口内炎、アナフィラキシー、排尿障害 イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、
乳癌(C50)	AADC-0221	AC療法	ADM 60mg/m <sup>2</sup> day1 CPA 600mg/m <sup>2</sup> day1 3週毎 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎 口内炎、心電図異常、出血性膀胱炎、下痢、肝機能障害 イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、急性腎不全 アナフィラキシー、排尿障害
乳癌(C50)	AADC-0226	Leuprorelin Pro	Leuprorelin Pro2.5mg 24週毎皮下注射 副作用: 注射部位硬結、注射部位紅斑、注射部位疼痛、糖尿病、ほてり 間質性肺炎、アナフィラキシー、肝機能障害、血栓塞栓症
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0234	TC+tri weekly Trastuzumab	DTX 75mg/m <sup>2</sup> day1 CPA 600mg/m <sup>2</sup> day1 トラスツズマブ 初回8mg/kg 2回目以降 6mg/kg day1 3週毎 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害
乳癌(C50)	AADC-0238	Palbociclib + Letrozole	パルボシクリブ 1日1回125mg 3週連続投与1週休薬 レトロゾール 1日1回2.5mg 連続投与 4週毎 副作用: ほてり、頭痛、関節痛、悪心、発疹、搔痒感、肝機能障害 塞栓症、血栓症 骨髄抑制、脱毛、疲労、感染症、口内炎、下痢、間質性肺炎

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
乳癌(C50)	AADC-0239	Palbociclib + fulvestrant	<p>バルボシクリブ 1日1回125mg 3週連続投与1週休薬</p> <p>フルベストラント 1回2筒(1筒250mg) 左右の臀部に1筒ずつ筋肉内投与 day1,day15 その後はサイクル1の1日目から換算して18日(±7日)毎</p> <p>副作用: 注射部位疼痛、注射部位硬結、ほてり、注射部位掻痒感 肝機能障害、血栓塞栓症、悪心、便秘、卵巣腫大、頭痛 感覚異常、不眠症、背部痛、筋肉痛、高TG血症、高コレステロール血症 骨髄抑制、脱毛、疲労、感染症、口内炎、下痢、間質性肺炎</p>
乳癌(C50)	AADC-0244	Abemaciclib	<p>アベマシクリブ 1回150mgを1日2回経口投与(フルベストラントorレトゾールorアナストロゾールと併用)</p> <p>副作用: 肝機能障害、骨髄抑制、下痢、間質性肺炎 静脈血栓塞栓症、感染症、悪心、嘔吐 疲労、脱毛症 血清クレアチニン上昇</p>
乳癌(C50)	AADC-0248	Olaparib	<p>オラパリブ 1回300mgを1日2回経口投与</p> <p>副作用: 悪心、嘔吐、味覚異常 貧血、好中球減少、血小板減少、リンパ球減少 疲労、無力症、間質性肺炎 下痢、頭痛</p>
乳癌(C50)	AADC-0249	nab-PTX+trasutuzumab	<p>nab-PTX 1回 260mg/m<sup>2</sup> 3週毎</p> <p>トラスツズマブ<sup>†</sup> 初回8mg/kg day1 2回目以降 6mg/kg day1</p> <p>3週毎</p> <p>副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制 脱毛、筋痛、末梢神経障害、下痢</p>
乳癌(C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行	AADC-0255	nab-PTX+Atezolizumab	<p>Atezolizumab 840mg/回 点滴静注 day1, day15</p> <p>nab-PTX 100mg/m<sup>2</sup> 点滴静注 day1, day8, day15</p> <p>その後13日間休薬 28日で1コース</p> <p>副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制 脱毛、筋痛、末梢神経障害、下痢 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害</p>
乳癌(C50)	AADC-0258	DD-EC	<p>EPI 90mg/m<sup>2</sup> day1</p> <p>CPA 600mg/m<sup>2</sup> day1</p> <p>ベグフィグラスチム 3.6mg day2</p> <p>2週毎</p> <p>副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎 出血性膀胱炎、下痢、口内炎、アナフィラキシー、排尿障害 イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、</p>
乳癌(C50)	AADC-0263	DD-PTX	<p>PTX 175mg/m<sup>2</sup> day1</p> <p>ベグフィグラスチム 3.6mg day2</p> <p>2週毎</p> <p>副作用: 脱毛、疲労、筋痛、末梢神経障害、骨髄抑制、下痢、悪心嘔吐</p>
乳癌(C50)	AADC-0264	Trastuzumab Deruxtec	<p>Trastuzumab Deruxtec 5.4mg/kg day1</p>

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
化学療法歴のあるHER2陽性乳癌			3週ごと 副作用： 間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション 骨髄抑制、脱毛、疲労、悪心・嘔吐、下痢、便秘、口内炎
<b>乳癌 (C50)</b>	<b>AADC-0269</b>	<b>T-DM1(術後)</b>	T-DM1 3.6mg/kg day1 3週ごと (投与回数は14回まで) 副作用： 倦怠感、鼻出血、悪心、発熱、食欲減退、骨髄抑制、肝機能障害 間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション 末梢神経障害
<b>乳癌 (C50)</b>	<b>AADC-0286</b>	<b>CBDCA+GEM</b>	GEM 1000mg/m <sup>2</sup> day1.8 CBDCA AUC2 day1.8 3週毎 副作用： 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、発熱、皮疹
<b>乳癌 (C50)</b>	<b>AADC-0287</b>	<b>Pembrolizumab+CBDCA+GEM</b>	Pembrolizumab 200mg/body day1 GEM 1000mg/m <sup>2</sup> day1.8 CBDCA AUC2 day1.8 3週毎 副作用： 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、発熱、皮疹 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膝炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害
<b>乳癌 (C50)</b> ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行	<b>AADC-0288</b>	<b>Pembrolizumab+CBDCA+GEM</b>	Pembrolizumab 200mg/body day1 GEM 1000mg/m <sup>2</sup> day1.8 day22.29 CBDCA AUC2 day1.8 day22.29 6週毎 副作用： AADC-0287と同様
<b>乳癌 (C50)</b> ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行	<b>AADC-0289</b>	<b>Pembrolizumab+nab-PTX</b>	Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎 nab-PTX 100mg/m <sup>2</sup> 点滴静注 day1,8,15 4週毎 副作用： 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制 脱毛、筋痛、末梢神経障害、下痢 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膝炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害
<b>乳癌 (C50)</b> ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行	<b>AADC-0290</b>	<b>Pembrolizumab+nab-PTX</b>	Pembrolizumab 200mg/body day1 6週毎 nab-PTX 100mg/m <sup>2</sup> 点滴静注 day1,8,15 4週毎 副作用： AADC-0289と同様
<b>乳癌 (C50)</b> ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行	<b>AADC-0291</b>	<b>Pembrolizumab+PTX 3週</b>	Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎 PTX 90mg/m <sup>2</sup> 点滴静注 day1,8,15 4週毎 副作用： 脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛、関節痛 悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膝炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメ名称	用法等
乳癌(C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行	AADC-0292	Pembrolizumab+PTX 6週	Pembrolizumab 200mg/body day1 6週毎
			PTX 90mg/m <sup>2</sup> 点滴静注 day1,8,15 4週毎
			副作用: AADC-0291と同様
乳癌(C50) トリプルネガティブ進行乳癌 術前	AADC-0311	Pembrolizumab+CBDC+PTX	Pembrolizumab 200mg/body day1
			CBDC 目標AUC=5 day1
			PTX 80mg/m <sup>2</sup> day1,8,15
			3週毎 術前4コース
			副作用: 脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹 食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー 間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
乳癌(C50) トリプルネガティブ進行乳癌 術前	AADC-0312	Pembrolizumab+EC	Pembrolizumab 200mg/body day1
			EPI 90mg/m <sup>2</sup> day1
			CPA 600mg/m <sup>2</sup> day1
			3週毎 術前4コース
			副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎 出血性膀胱炎、下痢、口内炎、アナフィラキシー、排尿障害 イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
乳癌(C50) トリプルネガティブ進行乳癌 術後 9回まで	AADC-0313	Pembrolizumab 200mg 3週毎	ペムプロリズマブ 1回200mg day1
			3週毎 術後9コースまで
			副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
乳癌(C50) トリプルネガティブ進行乳癌 術後 5回まで	AADC-0314	Pembrolizumab 400mg 6週毎	ペムプロリズマブ 1回400mg day1
			6週毎 術後5コースまで
			副作用: AADC-0313と同様
乳癌(C50) HER2陽性乳癌	AADC-0326	PT+PTX	用法・用量 1クール目
			Pertuzumab 840mg/bod day1
			Trastuzumab 8mg/kg day1
			PTX 80mg/m <sup>2</sup> day1、8、15
			2クール目以降
			Pertuzumab 420mg/bod day1
			Trastuzumab 6mg/kg day1
			PTX 80mg/m <sup>2</sup> day1、8、15
副作用 1クール=3週間 下痢、脱毛、倦怠感、しびれ、骨髄抑制 インフュージョンリアクション、うっ血性心不全			

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
乳癌(C50) HER2陽性乳癌	AADC-0339	P/T+nab-PTX	用法・用量
			1クール目
			Pertuzumab 840mg/bod day1
			Trastuzumab 8mg/kg day1
			nab-PTX 260mg/m <sup>2</sup> day1
			2クール目以降
			Pertuzumab 420mg/bod day1
Trastuzumab 6mg/kg day1			
nab-PTX 260mg/m <sup>2</sup> day1			
1クール=3週間			副作用:
			発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制
			脱毛、筋痛、末梢神経障害、下痢
			インフュージョンリアクション、うっ血性心不全
乳癌(C50) HER2陽性乳癌	AADC-0340	PHESGO+DTX	ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として
			初回(IN) それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1
			2回目以降(MA) それぞれ 600mg、600mg、20000U day1
			初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与
			DTX 75mg/m <sup>2</sup> day1
			3週ごと
			副作用:
			インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感
			間質性肺炎、悪心、口内炎
			脱毛、筋痛、末梢神経障害、爪の異常
乳癌(C50) HER2陽性乳癌	AADC-0341	PHESGO+Eribulin	ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として
			初回(IN) それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1
			2回目以降(MA) それぞれ 600mg、600mg、20000U day1
			初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与
			Eribulin 1.4mg/m <sup>2</sup> day1、8
			3週ごと
			副作用:
			インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感
			間質性肺炎、悪心、口内炎、末梢神経障害
乳癌(C50) HER2陽性乳癌	AADC-0342	PHESGO+PTX	ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として
			初回(IN) それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1
			2回目以降(MA) それぞれ 600mg、600mg、20000U day1
			初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与
			PTX 80mg/m <sup>2</sup> day1、8、15
			3週ごと
			副作用:
			インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感
			間質性肺炎、悪心、口内炎
			脱毛、筋痛、末梢神経障害
乳癌(C50) HER2陽性乳癌	AADC-0343	PHESGO+nab-PTX	ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として
			初回(IN) それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1
			2回目以降(MA) それぞれ 600mg、600mg、20000U day1
			初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与
			nab-PTX 260mg/m <sup>2</sup> day1
			3週ごと
			副作用:
			インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感
			間質性肺炎、悪心、口内炎
			脱毛、筋痛、末梢神経障害
乳癌(C50)	AADC-0344	PHESGO	ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
HER2陽性乳癌 術前・術後の場合は投与期間は12ヶ月まで			初回(IN) それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1
			2回目以降(MA) それぞれ 600mg、600mg、20000U day1
			初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与
			3週ごと 副作用: インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感 間質性肺炎、悪心、口内炎
<b>乳癌(C50)</b>	<b>AADC-0351</b>	<b>Capivasertib</b>	カピバセルチブ 1回400mgを1日2回 経口投与 4日間服用3日間休薬 副作用: 高血糖、下痢、皮膚障害 悪心・嘔吐、口内炎、発疹、疲労 味覚不全、腎機能障害
<b>乳癌(C50)</b> BRCA遺伝子変異陽性かつHER2陰性乳癌	<b>AADC-0358</b>	<b>Talazoparib</b>	タラゾパリブ 1回1mgを1日1回 経口投与 副作用: 骨髄抑制、間質性肺疾患、血栓塞栓症、二次性悪性腫瘍 口内炎、倦怠感、悪心、脱毛 下痢、頭痛
<b>子宮頸癌(C53)</b>	<b>AADC-0082</b>	<b>NDP+CPT-11療法</b>	CPT-11 60mg/m <sup>2</sup> day1、8 ネダプラチン 100mg/m <sup>2</sup> day1 3週毎 副作用: 下痢、悪心・嘔吐、骨髄抑制、腎機能障害、肝機能障害
<b>子宮体癌(C54)</b>	<b>AADC-0019</b>	<b>PTX + CBDCA療法(TC)</b>	PTX 180mg/m <sup>2</sup> day1 CBDCA 目標AUC=5 day1 3~4週ごと 副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振 悪心・嘔吐、肝機能障害
<b>子宮体癌(C54)</b>	<b>AADC-0080</b>	<b>DTX+CBDCA療法(DC)</b>	DTX 60~75mg/m <sup>2</sup> day1 CBDCA 目標AUC=5 day1 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害
<b>子宮体癌(C54)</b>	<b>AADC-0081</b>	<b>CPA+ADM+CDDP療法(CAP)</b>	CPA 500mg/m <sup>2</sup> day1 DXR 50mg/m <sup>2</sup> day1 CDDP 50mg/m <sup>2</sup> day1 4週ごと 副作用: 脱毛、骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、口内炎、全身倦怠感
<b>卵巣癌(C56)</b>	<b>AADC-0019</b>	<b>PTX + CBDCA療法(TC)</b>	PTX 180mg/m <sup>2</sup> day1 CBDCA 目標AUC=5 day1 3~4週ごと 副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振 悪心・嘔吐、肝機能障害
<b>卵巣癌(C56)</b>	<b>AADC-0080</b>	<b>DTX+CBDCA療法(DC)</b>	DTX 60~75mg/m <sup>2</sup> day1 CBDCA 目標AUC=5 day1 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害
<b>卵巣癌(C56)</b>	<b>AADC-0081</b>	<b>CPA+ADM+CDDP療法(CAP)</b>	CPA 500mg/m <sup>2</sup> day1 DXR 50mg/m <sup>2</sup> day1

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			CDDP 50mg/m <sup>2</sup> day1 4週ごと 副作用: 脱毛、骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、口内炎、全身倦怠感
卵巣癌(C56)	AADC-0133	DOXIL	DXR 50mg/m <sup>2</sup> を1mg/分で静注 day1 4週ごと 副作用: 骨髄抑制、アナフィラキシー用症状、手足症候群、口内炎、肝機能障害 悪心、食欲不振、発疹、疲労、体重減少、心筋障害
卵巣杯細胞性悪性腫瘍(C56)	AADC-0075	EP療法	VP-16 100mg/m <sup>2</sup> day1~5 CDDP 20mg/m <sup>2</sup> day1~5 1クール:3週 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、
卵巣杯細胞性悪性腫瘍(C56)	AADC-0083	BEP療法	BLM 30mg/body day2,9,16 VP-16 100mg/m <sup>2</sup> day1~5 CDDP 20mg/m <sup>2</sup> day1~5 1クール:3週 副作用: 間質性肺炎、肺繊維症、皮膚の硬化、色素沈着、発熱・悪寒、脱毛、食欲不振 体重減少、全身倦怠感、悪心・嘔吐、骨髄抑制、
前立腺癌(C61)	AADC-0038	tri-weekly DTX	DTX 60~75mg/m <sup>2</sup> day1 3週毎 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害
前立腺癌(C61)	AADC-0064	Prostal	クロルマジン 1回50mg1日2回 副作用: インポテンツ、浮腫、体重増加、女性化乳房
前立腺癌(C61)	AADC-0065	Casodex	ビ'カルタミド 1回80mg1日1回 副作用: 乳房腫脹、乳房圧痛、肝機能障害、勃起力低下
前立腺癌(C61)	AADC-0066	Odyne	フルタミド 1回125mg 1日3回 副作用: 肝機能障害、女性型乳房、悪心・嘔吐
前立腺癌(C61)	AADC-0067	Estracyt	エストラムスチン 1回280mg 1日2回 副作用: 女性化乳房、食欲不振、浮腫、貧血、肝機能異常
前立腺癌(C61)	AADC-0068	Leuplin	リュ-プロレリン 4週に1回3.75mgを皮下投与 副作用: 肝機能障害、ほてり、熱感
前立腺癌(C61)	AADC-0070	Zoladex LA	ゴ'セリン 10.8mgを前腹部に12~13週毎に1回投与 副作用: 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下
前立腺癌(C61)	AADC-0103	多剤ホルモン療法無効前立腺癌 Prosexol	エチニルエストラジオール 1回0.5~1.0mg 1日3回 副作用: 血栓症、心不全、狭心症、発疹、肝機能障害、血圧上昇、電解質異常
前立腺癌(C61)	AADC-0124	Casodex + ZoladexLA 療法	ビ'カルタミド 1回80mg1日1回 ゴ'セリン 10.8mgを前腹部に12~13週毎に1回投与 副作用: 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下 乳房腫脹、乳房圧痛、肝機能障害

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメ名称	用法等
前立腺癌(C61)	AADC-0125	Casodex + Leuplin 療法	ビカルタミド 1回80mg1日1回 リュープロレリン 4週ごとに3.75mgまたは12週ごとに11.25mgを皮下投与 副作用: 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下 ほてり、熱感
前立腺癌(C61)	AADC-0127	Odyne + ZoladexLA 療法	フルタミド 1回125mg 1日3回 ゴセリン 10.8mgを前腹部に12~13週毎に1回投与 副作用: 肝機能障害、女性型乳房、悪心・嘔吐 代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下
前立腺癌(C61)	AADC-0187	Degarelix	デガレリクス 初回240mgを1箇所あたり120mgずつ腹部2箇所に皮下投与 2回目以降80mgを腹部1箇所に皮下投与 4週毎 副作用: 注射部位疼痛、注射部位硬結、注射部位紅斑、ほてり、体重増加 発熱、高血圧、注射部位熱感、間質性肺炎、肝機能障害、糖尿病憎悪 心不全、血栓塞栓症、アナフィラキシー
前立腺癌(C61)	AADC-0128	Odyne + Leuplin 療法	フルタミド 1回125mg 1日3回 リュープロレリン 4週ごとに3.75mgまたは12週ごとに11.25mgを皮下投与 副作用: 肝機能障害、女性型乳房、悪心・嘔吐、ほてり、熱感
前立腺癌(C61) 去勢抵抗性前立腺癌	AADC-0205	Enzalutamide	エンザルタミド 1回160mg 1日1回 経口投与 連日 副作用: 疲労、悪心、食欲減退、無力症、痙攣発作、下痢、
前立腺癌(C61) 去勢抵抗性前立腺癌	AADC-0208	Abiraterone	Abiraterone 1回1000mg 1日1回 経口投与 連日 アレドニン 1回5mg 1日2回 経口投与 連日 副作用: 肝機能障害、心障害、疲労、ほてり、悪心・嘔吐、低カリウム血症 高血圧、消化器症状、高脂血症
前立腺癌(C61) 去勢抵抗性前立腺癌	AADC-0224	Cabazitaxel	Cabazitaxel 20~25mg/m <sup>2</sup> day1 Pegfilgrastin 3.6mg day2 3週毎 副作用: 好中球減少症、骨髄抑制、疲労、悪心、下痢、食欲減退 貧血、腎不全、消化管出血、アナフィラキシーショック 心不全、末梢神経障害、DIC、皮膚粘膜眼症候群、心タンポナーデ 心筋梗塞、静脈血栓塞栓症、間質性肺炎、口内炎、SIADH
前立腺癌(C61)	AADC-0226	Leuproterin Pro	Leuproterin Pro22.5mg 24週毎皮下注射 副作用: 注射部位硬結、注射部位紅斑、注射部位疼痛、糖尿病、ほてり 間質性肺炎、アナフィラキシー、肝機能障害、血栓塞栓症
前立腺癌(C61)	AADC-0250	Degarelix(12週毎)	デガレリクス 初回240mgを1箇所あたり120mgずつ腹部2箇所に皮下投与 2回目以降は初回投与4週間後より480mgを維持用量として 腹部2箇所に皮下投与し、12週間間隔で投与を繰り返す。 副作用: 注射部位疼痛、注射部位硬結、注射部位紅斑、ほてり、体重増加 発熱、高血圧、注射部位熱感、間質性肺炎、肝機能障害、糖尿病憎悪 心不全、血栓塞栓症、アナフィラキシー
前立腺癌(C61)	AADC-0251	Apalutamide	アパルタミド 1回240mg 1日1回 経口投与 連日 副作用: 疲労、皮疹、甲状腺機能低下症、掻痒症、体重減少

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			痙攣発作、心房細動、心筋梗塞、悪心、下痢
前立腺癌(C61) 遠隔転移を有しない去勢抵抗性前立腺癌	AADC-0266	Darolutamide	ダロルタミド 1回600mg(300mgを2錠) 1日2回 食後経口投与 連日 副作用: 心臓障害、間質性肺疾患、疲労、皮疹、頭痛、めまい 悪心、下痢、ほてり、高血圧、女性化乳房
前立腺癌(C61) BRCA遺伝子変異陽性の遠隔転移を有する去勢抵抗性前立腺癌	AADC-0248	Olaparib	オラパリブ 1回300mgを1日2回経口投与 副作用: 悪心、嘔吐、味覚異常 貧血、好中球減少、血小板減少、リンパ球減少 疲労、無力症、間質性肺炎 下痢、頭痛
精巣腫瘍(C63)	AADC-0074	BEP療法	BLM 30mg/body day1.8.15 VP-16 100mg/m <sup>2</sup> day1~5 CDDP 20mg/m <sup>2</sup> day1~5 1クール:3週 副作用: 間質性肺炎、肺繊維症、皮膚の硬化、色素沈着、発熱・悪寒、脱毛、食欲不振 体重減少、全身倦怠感、悪心・嘔吐、骨髄抑制、
精巣腫瘍(C63)	AADC-0075	EP療法	VP-16 100mg/m <sup>2</sup> day1~5 CDDP 20mg/m <sup>2</sup> day1~5 1クール:3週 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、
精巣腫瘍(C63) セミノーマ	AADC-0171	CBDCA	CBDCA AUC=7 単回投与 副作用: 嘔気・嘔吐、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、発熱、骨髄抑制、肝機能障害
腎癌(C64)	AADC-0076	Sumiferon	IFN-α 1日1回300万~600万IU 連日または週1~3回 副作用: 発熱、全身倦怠感、食欲不振、骨髄抑制、肝機能障害
腎癌(C64)	AADC-0077	Imunace	テセロイキン 1日1回70万単位 連日 副作用: 発熱、悪寒、倦怠感、食欲不振、悪心・嘔吐、好酸球増多、肝機能障害、浮腫
腎癌(C64)	AADC-0112	Sutent	スニチニブ1日1回50mg 4週間連続投与2週間休薬 副作用: 骨髄抑制、皮膚変色、手足症候群、食欲不振、肝機能異常、疲労感 味覚異常、口内炎、下痢、悪心、歯肉炎、代謝異常、浮腫、発熱、高血圧
腎癌(C64) 根治切除不能または転移性の腎細胞癌	AADC-0160	Sorafenib	用法・用量 1回400mg 1日2回 経口投与 適宜増減 副作用: 手足症候群、剥脱性皮膚炎、発疹、脱毛、下痢、高血圧、疲労 食欲不振、そう痒感、体重減少、肝機能障害、出血 間質性肺炎、急性肺障害、高血圧クリーゼ、可逆性後白室脳症 皮膚粘膜眼症候群、消化管穿孔、心筋虚血・心筋梗塞
腎癌(C64) 根治切除不能または転移性の腎細胞癌	AADC-0169	Everolimus	Everolimus 10mg/day 連日経口投与 副作用: 口内炎、発疹、貧血、疲労、下痢、無力症、食欲減退、高コレステロール血症 悪心、粘膜の炎症、嘔吐、末梢性浮腫、高トリグリセリド血症、咳嗽、掻痒症 感染症、皮膚乾燥、鼻出血、呼吸困難、味覚異常、間質性肺炎、腎不全 高血糖、アナフィラキシー様症状、急性呼吸窮迫症候群、肺塞栓症、心嚢液貯留 進行性多巣性白質脳症、BKウイルス腎症、血栓性微小血管障害、肺胞蛋白症
腎癌(C64)	AADC-0178	Temsirolimus	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			テムシロリムス 25mgを1週間に1回点滴 副作用: 発疹、口内炎、食欲不振、肝機能障害、高血糖、間質性肺疾患 infusion reaction、脂質代謝異常、創傷治癒遅延、腎不全 消化管穿孔、心嚢液貯留、胸水、痙攣、脳出血、感染症 皮膚粘膜眼症候群、横紋筋融解症、骨髄抑制
腎癌(C64) 進行再発腎癌	AADC-0183	Axitinib	アキシチニブ 1回5mg1日2回経口投与 患者の状態により増減可、増量は1回10mgまで 副作用: 高血圧、甲状腺機能障害、創傷治癒遅延、蛋白尿、手足症候群 肝機能障害、下痢、疲労、悪心嘔吐、発声障害、無力症、体重減少 粘膜炎症、口内炎、味覚異常、鼻出血、
腎癌(C64)	AADC-0199	Pazopanib	パゾパニブ 1日1回800mg 経口投与 副作用: 下痢、疲労、悪心、高血圧、毛髪変色、食欲減退、体重減少、味覚異常 肝機能障害、心機能障害、動脈血栓性事象、静脈血栓性事象、出血 甲状腺機能障害、ネフローゼ症候群、蛋白尿、感染症、創傷治癒遅延
腎癌(C64)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
腎癌(C64)	AADC-0252	Nivolumab+Ipilimumab	Nivolumab 240mg/body Ipilimumab 1mg/kg 3週毎4コースまで 5コースから Nivolumab 240mg/body 2週毎継続 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核
腎癌(C64)	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
腎癌(C64)	AADC-0268	Pembrolizumab(6週間)	ペムブロリズマブ 1回400mg 6週間隔 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
腎癌(C64)	AADC-0278	Cabozantinib	カボザンチニブ 1回60mg 1日1回空腹時 副作用: 高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労 口内炎、蛋白尿、手足症候群、横紋筋融解症 動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔 可逆性後白質脳症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延 低カルシウム血症
腎う癌(C65)	AADC-0121	GC療法	GEM 1000mg/m <sup>2</sup> day1.8.15

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
			CDDP	70mg/m <sup>2</sup>	day2
				1クール:4週	
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱	
腎う癌(C65)	AADC-0268	Pembrolizumab(6週間)	ペムブロリズマブ	1回400mg	6週間隔
			副作用:	骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 肺炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎	
腎う癌(C65)	AADC-0283	Avelumab	Avelumab	10mg/kg	day1
		根治切除不能尿路上皮癌における化学療法後の維持療法		2週毎	
			副作用:	間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー	
腎う癌(C65)	AADC-0294	Enfortumab Vedotin	Enfortumab Vedotin	1.25mg/kg	day1.8.15
		がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌		4週毎	
			副作用:	皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパシー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患 肝機能障害、Infusion reaction	
腎う癌(C65)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ	240mg/body	2週間隔
		筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで			
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
腎う癌(C65)	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ	480mg/body	4週間隔
		筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで			
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
腎う癌(C65)	AADC-0336	GEM+PTX	GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	day1.8.15
		切除不能または転移を有する尿路上皮癌	PTX	200mg/m <sup>2</sup>	day1
				4週毎	
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 関節痛、筋肉痛、末梢神経障害	
腎う癌(C65)	AADC-0337	GEM+CBDCA	GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	day1.8
		切除不能または転移を有する尿路上皮癌	CBDCA	目標AUC=5	day1
				3週毎	
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、発熱	
腎う癌(C65)	AADC-0360	Pembrolizumab+Enfortumab Vedotin	Pembrolizumab	200mg/body	day1
		根治切除不能な尿路上皮癌の一次治療	Enfortumab Vedotin	1.25mg/kg	day1.8
				3週毎	
			副作用:	皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパシー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患 肝機能障害、Infusion reaction 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、静脈血栓塞栓症	
尿管癌(C66)	AADC-0121	GC療法	GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	day1.8.15
			CDDP	70mg/m <sup>2</sup>	day2

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメ名称	用法等
			1クール:4週 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱
尿管癌(C66)	AADC-0268	Pembrolizumab(6週間)	ペムプロリズマブ 1回400mg 6週間隔 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
尿管癌(C66) 根治切除不能尿路上皮癌における化学療法後の維持療法	AADC-0283	Avelumab	Avelumab 10mg/kg day1 2週毎 副作用: 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー
尿管癌(C66) がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌	AADC-0294	Enfortumab Vedotin	Enfortumab Vedotin 1.25mg/kg day1.8.15 4週毎 副作用: 皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患 肝機能障害、Infusion reaction
尿管癌(C66) 筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
尿管癌(C66) 筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
尿管癌(C66) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌	AADC-0336	GEM+PTX	GEM 1000mg/m <sup>2</sup> day1.8.15 PTX 200mg/m <sup>2</sup> day1 4週毎 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 関節痛、筋肉痛、末梢神経障害
尿管癌(C66) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌	AADC-0337	GEM+CBDC	GEM 1000mg/m <sup>2</sup> day1.8 CBDC 目標AUC=5 day1 3週毎 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、発熱
尿管癌(C66) 根治切除不能な尿路上皮癌の一次治療	AADC-0360	Pembrolizumab+Enfortumab Vedotin	Pembrolizumab 200mg/body day1 Enfortumab Vedotin 1.25mg/kg day1.8 3週毎 副作用: 皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患 肝機能障害、Infusion reaction 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、静脈血栓塞栓症
膀胱癌(C67)	AADC-0012	Furtulon	5'-DFUR 800-1200mgを3-4回に分けて服用 副作用: 食欲不振、下痢、白血球減少

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
膀胱癌 (C67)	AADC-0071	Epirubicin 膀胱内注入	EPI 40mgを週1回膀胱内へ注入 10回 副作用: 悪心・嘔吐、白血球減少、食欲不振、脱毛
膀胱癌 (C67)	AADC-0072	Immunobladder 膀胱内注入	BCG 40mgまたは80mgを週1回膀胱内へ注入 10回 副作用: BCG感染、排尿痛、頻尿、肉眼的血尿、肝機能障害、発熱、
膀胱癌 (C67)	AADC-0121	GC療法	GEM 1000mg/m <sup>2</sup> day1.8.15 CDDP 70mg/m <sup>2</sup> day2 1クール:4週 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱
膀胱癌 (C67)	AADC-0268	Pembrolizumab(6週間)	ペムプロリズマブ 1回400mg 6週間隔 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
膀胱癌 (C67) 根治切除不能尿路上皮癌における化学療法後の維持療法	AADC-0283	Avelumab	Avelumab 10mg/kg day1 2週毎 副作用: 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー
膀胱癌 (C67) がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌	AADC-0294	Enfortumab Vedotin	Enfortumab Vedotin 1.25mg/kg day1.8.15 4週毎 副作用: 皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患 肝機能障害、Infusion reaction
膀胱癌 (C67) 筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
膀胱癌 (C67) 筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
膀胱癌 (C67) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌	AADC-0336	GEM+PTX	GEM 1000mg/m <sup>2</sup> day1.8.15 PTX 200mg/m <sup>2</sup> day1 4週毎 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 関節痛、筋肉痛、末梢神経障害
膀胱癌 (C67) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌	AADC-0337	GEM+CBDCA	GEM 1000mg/m <sup>2</sup> day1.8 CBDCA 目標AUC=5 day1 3週毎 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、発熱
膀胱癌 (C67) 根治切除不能な尿路上皮癌の一次治療	AADC-0360	Pembrolizumab+Enfortumab Vedotin	Pembrolizumab 200mg/body day1 Enfortumab Vedotin 1.25mg/kg day1.8 3週毎

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメ名称	用法等
			副作用： 皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患 肝機能障害、Infusion reaction 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、静脈血栓塞栓症
悪性膠芽腫、乏突起神経膠腫(C71)	AADC-0078	IFNβ+MCNU+IMRT(IMR療法)	IFNβまたはフェロン 300万単位 5投2休(5週間)、1回/週(6週目以降) サイメリン 1mg/kg 2ヶ月に1回 放射線照射 副作用： 発熱、骨髄抑制、蛋白尿、食欲不振、悪心嘔吐
悪性神経膠腫(C71)	AADC-0104	Temodal	テモダール 経口又は点滴静注 初発)放射線照射との併用 テモゾロミドとして1回75mg/m <sup>2</sup> 1日1回連日42日間投与し4週間休薬 その後本剤単独にて、テモゾロミドとして1回150mg/m <sup>2</sup> を1日1回連日5日間投与し、23日間休薬。28日間1クール 再発) テモゾロミドとして1回150mg/m <sup>2</sup> 1日1回連日5日間投与し23日間休薬 28日間1クール 副作用： 放射線照射との併用 脱毛、悪心・嘔吐、疲労 併用後の単独投与時 疲労、脱毛、悪心・嘔吐、食欲不振、頭痛、便秘
悪性神経膠腫(C71)	AADC-0197	BV+RT/TMZ療法	ベバシズマブ 1回10mg/kgを2週間間隔で計4回点滴静注 テモダール 1回75mg/m <sup>2</sup> 1日1回連日経口投与 放射線照射 2Gy/日 週5日 総線量60Gy その後 ベバシズマブ 1回10mg/kgを2週間間隔点滴静注 テモダール 1回150mg~200mg/m <sup>2</sup> 1日1回連日5日間経口投与し23日間休薬 28日間1クール その後 ベバシズマブ 1回15mg/kgを3週間間隔点滴静注 PDになるまで 副作用： 脳出血、粘膜皮膚出血、動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、創傷治癒遅延 骨髄抑制、感染症、高血圧、蛋白尿、可逆性後白質脳症症候群、消化管穿孔 うっ血性心不全、疲労、脱毛、悪心・嘔吐、食欲不振、頭痛、便秘
悪性神経膠腫(C71)	AADC-0198	Gliadel	ギリアデル 腫瘍切除腔の大きさや形状に応じて、8枚または適宜減じた枚数を 脳腫瘍切除術時の切除面を被覆するように留置 副作用： 脳浮腫、発熱、リンパ球数減少、片麻痺、悪心、嘔吐、食欲減退 頭痛、肝機能異常、痙攣、創傷治癒不良、血栓塞栓症
悪性リンパ腫(C72)	AADC-0116	髄注MTX+PSL療法	MTX 15mg PSL 20mg 髄液中悪性リンパ腫細胞が陰性化するまで2回/週 繰り返し施行 副作用： 骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、口内炎、下痢、腎機能障害、
悪性リンパ腫(C72)	AADC-0118	high dose MTX	MTX 3.5g/m <sup>2</sup> 24時間点滴 LV 15mg/body 静注 LVはMTX終了12時間後から6時間毎に投与 副作用： 骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、口内炎、下痢、腎機能障害、

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			肝機能障害、食欲不振
悪性リンパ腫(C72)	AADC-0267	Tirabrutinib	チラブルチニブ 1回480mg(80mgを6錠)1日1回 空腹時経口投与 連日 副作用: 感染症、皮膚障害、骨髄抑制、過敏症、間質性肺疾患 肝機能障害、出血、下痢、悪心嘔吐 高カリウム血症、高トリグリセリド血症
甲状腺癌(C73)	AADC-0160	Sorafenib	用法・用量 1回400mg 1日2回 経口投与 適宜増減 副作用: 手足症候群、剥脱性皮膚炎、発疹、脱毛、下痢、高血圧、疲労 食欲不振、そう痒感、体重減少、肝機能障害、出血 間質性肺炎、急性肺障害、高血圧クレーゼ、可逆性後白室脳症 皮膚粘膜眼症候群、消化管穿孔、心筋虚血・心筋梗塞
甲状腺癌(C73)	AADC-0222	Lenvatinib	用法・用量 1回24mg 1日1回 副作用: 高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労 口内炎、蛋白尿、手掌・足底発赤知覚不全症候群、出 動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔 可逆性後白質脳症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延 低カルシウム血症
甲状腺癌(C73) BRAF遺伝子変異陽性	AADC-0357	Encorafenib+Binimetinib	Encorafenib 1回450mg 1日1回経口投与 Binimetinib 1回45mg 1日2回経口投与 副作用: 手足症候群、眼障害、心機能障害、肝障害、横紋筋融解症 高血圧、出血、腫瘍崩壊症候群
悪性リンパ腫(C77) 非ホジキンリンパ腫	AADC-0048	CHOP療法	CPA 750mg/m <sup>2</sup> day1 DXR 50mg/m <sup>2</sup> day1 VCR 1.4mg/m <sup>2</sup> day1 PSL 100mg/body day1~5 1クール:3週 副作用: 骨髄抑制、心毒性、末梢神経障害、肝障害、悪心・嘔吐、脱毛、出血性膀胱炎
悪性リンパ腫(C77) 非ホジキンリンパ腫	AADC-0049	R-CHOP療法	リツキシマブ 375mg/m <sup>2</sup> (CHOP療法の前日) CPA 750mg/m <sup>2</sup> day1 DXR 50mg/m <sup>2</sup> day1 VCR 1.4mg/m <sup>2</sup> day1 PSL 100mg/body day1~5 1クール:3週 副作用: 全身浮腫、呼吸障害、発熱、悪寒、頭痛、血圧上昇、発疹、骨髄抑制、悪心・嘔吐 出血性膀胱炎、心毒性、末梢神経障害、肝障害、脱毛、下肢深部反射減弱・消失、
悪性リンパ腫(C77) 非ホジキンリンパ腫	AADC-0236	High dose MTX + High dose Ara-C	MTX 200mg/m <sup>2</sup> day1 MTX 800mg/m <sup>2</sup> 持続 day1 ソル・メルコート 50mg/body day1~3 キロサト 6000mg/m <sup>2</sup> /日 day2~3 1クール:3週 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、口内炎、下痢、腎機能障害、 肝機能障害、食欲不振、間質性肺炎、急性呼吸促進症候群 中枢神経障害、代謝異常

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
原発不明癌(C80)	AADC-0015	GEM	GEM 1000 mg/m <sup>2</sup> を週1回 3回投与 1週休薬 1000 mg/m <sup>2</sup> を2週間に1回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感
原発不明癌(C80)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
原発不明癌(C80)	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
リンパ性白血病(C91) 再発又は難治性の慢性リンパ性白血病	AADC-0319	Acalabrutinib	用法・用量 1回100mg 1日2回 経口投与 副作用: 下痢、悪心・嘔吐、頭痛 骨髄抑制、感染症、出血 不整脈、虚血性心疾患、間質性肺疾患 腫瘍崩壊症候群、二次性悪性腫瘍
骨髄異形成症候群(D46)	AADC-0301	Azacitidine 皮下注	アザシチジン 75mg/m <sup>2</sup> day1-7 皮下注 21日間休薬 副作用: 骨髄抑制、感染症、出血、腎尿管アドーシス、低血圧 食欲不振、便秘、悪心、口内炎、下痢 発疹、掻痒、倦怠感、発熱、注射部位反応、注射部位紅斑
骨髄異形成症候群(D46)	AADC-0302	Azacitidine 点滴静注	アザシチジン 75mg/m <sup>2</sup> day1-7 10分かけて点滴静注 21日間休薬 副作用: 骨髄抑制、感染症、出血、腎尿管アドーシス、低血圧 食欲不振、便秘、悪心、口内炎、下痢 発疹、掻痒、倦怠感、発熱
固形癌(MSI-High)	AADC-0235	Pembrolizumab	ペムプロリズマブ 1回200mg 3週間隔 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
固形癌(MSI-High)	AADC-0268	Pembrolizumab(6週間)	ペムプロリズマブ 1回400mg 6週間隔 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
固形癌(NTRK融合遺伝子陽性)	AADC-0346	Larotrectinib	ラトロレクチニブ 1回 100mg、1日2回、連日経口投与 副作用: 浮動性めまい、頭痛、末梢性感覚ニューロパシー 肝機能障害、骨髄抑制 疲労、筋肉痛、関節痛