

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
頭頸部癌(C00)	AADC-0001	S-1(CG)	用法	a.4週投与 2週休薬法	
				b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的)	
			用量	朝食後および夕食後の1日2回	
				体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回	
				1.25から1.5m ² 未満 50mg/回	
				1.5m ² 以上 60mg/回	
			副作用:	骨髓抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、	
頭頸部癌(C00)	AADC-0091	tri-weekly DTX	DTX	60mg/m ² day1	
			3週ごと		
			副作用:	脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髓抑制 肝機能障害、腎機能障害	
頭頸部癌(C00)	AADC-0008	DCF 療法	CDDP 80 mg/m ²	day1	
			TXT 70mg/m ²	day1	
			5Fu 800 mg/m ²	day1からday5	
			副作用:	骨髓抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、発熱、	
頭頸部癌(C00)	AADC-0182	Cetuximab + FP	セツキシマブ	初回400 mg/m ² 、2回目以降250 mg/m ²	毎週点滴静注
			CDDP	100 mg/m ² day1	3週に1回
			5Fu	1000 mg/m ² /day day1～day4	3週に1回
			副作用:	骨髓抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛 ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪園炎、低マグネシウム血症、間質性肺炎、 搔痒感、infusion reaction、食欲不振、疲労感、心不全、血栓塞栓症	
頭頸部癌(C00)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ	240mg/body 2週間隔	
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
頭頸部癌(C00)	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ	480mg/body 4週間隔	
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
頭頸部癌(C00)	AADC-0235	Pembrolizumab	ペムブロリズマブ	1回200mg 3週間隔	
			副作用:	骨髓抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎	
頭頸部癌(C00)	AADC-0268	Pembrolizumab(6週間)	ペムブロリズマブ	1回400mg 6週間隔	
			副作用:	骨髓抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
食道癌(C15)	AADC-0007	CDDP+5-FU療法(FP)	CDDP	10 mg/body	day1からday5
			5Fu	500 mg/m ²	day1からday5
			副作用:	骨髓抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛	
食道癌(C15)	AADC-0008	DCF療法	CDDP 80 mg/m ²	day1	
			TXT 70mg/m ²	day1	
			5Fu 800 mg/m ²	day1からday5	
			副作用:	骨髓抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、発熱、	
食道癌(C15)	AADC-0105	FP+IMRT療法	5-FU	500 mg/body	day1からday5
			CDDP	5 mg/body	day1からday5
			トモセラピー	2Gy/body	day1からday5
			day6,7は休薬 6週連続 (到達目標60Gy)		
			副作用:	骨髓抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛	
食道癌(C15)	AADC-0164	DTX	DTX	70mg/m ²	day1
			3週ごと		
			副作用:	脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髓抑制 肝機能障害、腎機能障害	
食道癌(C15)	AADC-0184	IMRT+FP	CDDP	70 mg/m ²	day1
			5Fu	700 mg/m ²	day1からday5
			IMRT	50Gy 25分割	
			副作用:	骨髓抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛 食道炎、心嚢水貯留、胸水貯留、肺臓炎	
			化学療法は4週毎に繰り返す		
食道癌(C15)	AADC-0185	FP	CDDP	80 mg/m ²	day1
			5Fu	800 mg/m ²	day1からday5
			4週毎	副作用:	
			副作用:	骨髓抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛	
食道癌(C15)	AADC-0227	PTX(6投2休)	PTX	100 mg/m ²	day1.8.15.22.29.36 少なくとも2週休薬
			副作用:	脱毛、発疹、爪の障害、感覚減退、味覚異常、浮動性めまい、疲労 浮腫、発熱、悪心、嘔吐、下痢、便秘、食欲不振、口内炎、筋痛、関節痛	
			副作用:	骨髓抑制、末梢神経障害、間質性肺炎	
食道癌(C15)	AADC-0233	Nedaplatin + 5-FU	Nedaplatin	90 mg/m ²	day1
			5Fu	800 mg/m ² /day	day1からday5
			4週毎	副作用:	
			副作用:	骨髓抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、腎機能障害、口内炎、脱毛、肝機能異常 色素沈着、ショック、アナフィラキシー、電解質異常、間質性肺炎	
食道癌(C15)	AADC-0014	mFOLFOX6療法	L-OHP	85mg/m ²	day1
			5-FU (bolus)	400mg/m ²	day1
			5-FU (infusion)	2400mg/m ²	46～48hr
			l-LV	200mg/m ²	day1
				2週ごと	
			副作用:	末梢神経障害、食欲不振、骨髓抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢 発熱	
食道癌(C15)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ	240mg/body	2週間隔 (術後補助の場合投与は1年間)

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
術前治療でpCRでなかったStage II / IIIの術後補助				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
食道癌(C15)	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ	480mg/body	4週間隔 (術後補助の場合投与は1年間)
がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
術前治療でpCRでなかったStage II / IIIの術後補助				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
食道癌(C15)	AADC-0298	Pembrolizumab+5-FU+CDDP	ペムブロリズマブ	1回200mg	day1
			CDDP	80 mg / m ²	day1
			5FU	800 mg / m ²	day1からday5
			3週毎		
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎	
				インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症	
				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感	
				肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害	
				下垂体機能障害、1型糖尿病	
				膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎	
食道癌(C15)	AADC-0300	DCF療法(術前)	CDDP 70 mg / m ²	day1	
切除可能、局所進行食道扁平上皮癌(cT1N1-3M0,cT2-3N0-3M0)			DTX 70mg / m ²	day1	
年齢20歳以上75歳以下mECOG PS 0-1			5Fu 750 mg / m ²	day1からday5	
			3週毎に3回施行		
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎	
				脱毛、食欲不振、全身倦怠感、発熱、	
食道癌(C15)	AADC-0309	Nivolumab+ipilimumab	Nivolumab	240mg/body	2週間隔
			Ipilimumab	1mg/kg	6週間隔
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
				血球貪食症候群、結核	
食道癌(C15)	AADC-0310	Nivolumab+FP	ニボルマブ	240mg/body	2週間隔
			CDDP	80 mg / m ²	day1
			5Fu	800 mg / m ²	day1からday5
			4週毎		
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎	
				インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症	
				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感	
				肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害	
				下垂体機能障害、1型糖尿病	
				膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎	
食道癌(C15)	AADC-0373	Tislelizumab+FP	Tislelizumab	200mg/body	day1
根治切除不能な進行・再発			CDDP	80 mg / m ²	day1
			5FU	800 mg / m ²	day1からday5
			3週毎		
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎	
				インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症	
				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感	
				肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
			下垂体機能障害、1型糖尿病		
			膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎		
食道癌(C15)	AADC-0374	Tislelizumab	Tislelizumab	200mg/body	3週間隔
がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
胃癌(C16)	AADC-0001	S-1(CG)	用法	a.4週投与	2週休薬法
				b.2週投与	1週休薬法(副作用の軽減を目的)
			用量	朝食後および夕食後の1日2回	
				体表面積 1.25m ² 未満	40mg/回
				1.25から1.5m ² 未満	50mg/回
				1.5m ² 以上	60mg/回
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹	
				流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、	
胃癌(C16)	AADC-0002	S-1+CDDP療法	TS-1 3週投与2週休薬		
			TS-1開始8日目にCDDP60 mg/m ²		
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹	
				流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、	
胃癌(C16)	AADC-0003	PTX	a. 70 mg/m ² を1週に1回	3回投与	1週休薬
			b. 80 mg/m ² を2週に1回	もしくは 3週に1回	
			副作用:	脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害	
				筋肉痛、関節痛、悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常	
胃癌(C16)	AADC-0006	CPT-11+CDDP療法(IP)	CDDP	80 mg/m ²	day1
			CPT-11	70 mg/m ²	day1,15
			4週毎		
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、全身倦怠感	
				末梢神経障害、脱毛	
胃癌(C16)	AADC-0014	mFOLFOX6療法	L-OHP	85mg/m ²	day1
			5-FU (bolus)	400mg/m ²	day1
			5-FU (infusion)	2400mg/m ²	46～48hr
			l-LV	200mg/m ²	day1
				2週ごと	
			副作用:	末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢	
				発熱	
胃癌(C16)	AADC-0085	CPT-11	CPT-11	150 mg/m ²	2週に1回
			副作用:	下痢、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、骨髄抑制、肝機能障害	
胃癌(C16)	AADC-0101	外来 CPT-11+CDDP療法(IP)	CDDP	30 mg/m ²	day1,15
			CPT-11	60 mg/m ²	day1,15
			4週毎		
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、全身倦怠感	
				末梢神経障害、脱毛	
胃癌(C16)	AADC-0122	S-1+DTX療法	TS-1	2週投与1週休薬	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等			
			朝食後および夕食後の1日2回			
			80 mg/m ² /day			
		DTX	40 mg/m ² day1			
		3週毎				
		副作用:	骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、色素沈着、神経障害、脱毛 浮腫、悪心・嘔吐、流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、			
胃癌(C16)	AADC-0134	XELOX 療法	カペシタビン	1日2回	14日間内服7日間休薬	
			体表面積	1.36 m ² 未満	1200mg/回	
				1.36以上1.66 m ² 未満	1500mg/回	
				1.66以上1.96 m ² 未満	1800mg/回	
				1.96 m ² 以上	2100mg/回	
		L-OHP	130mg/m ² day1	3週ごと		
		副作用:	手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着			
胃癌(C16)	AADC-0150	tri-weekly Abraxane	アブラキサン	1回 260mg/m ²	3週毎	
		副作用:	脱毛、疲労、筋痛、末梢神経障害、骨髄抑制、下痢、悪心嘔吐			
胃癌(C16)	AADC-0153	tri weekly Trastuzumab + XP療法	トラスツズマブ [*]	8mg/kg day1	(2回目からは6mg/kg)	
		CDDP	80 mg/m ² day1			
		カペシタビン	1日2回1回1000mg/m ²	day1夕からday15朝まで内服その後7日間休薬		
		3週毎				
		副作用:	発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制、下痢、口内炎、色素沈着 手足症候群、血中ビリルビン増加、腎機能障害、脱毛、末梢神経障害			
胃癌(C16)	AADC-0154	DCS療法	TS-1	朝食後および夕食後の1日2回		
			80 mg/m ² /day	day1夕からday15朝まで内服その後14日間休薬		
		DTX	35 mg/m ² day1, day15			
		CDDP	35 mg/m ² day1, day15			
		副作用:	骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、色素沈着、神経障害、脱毛 浮腫、悪心・嘔吐、腎機能障害、下痢			
胃癌(C16)	AADC-0179	DTX	DTX	75mg/m ² day1		
		3週ごと				
		副作用:	脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害、間質性肺炎			
胃癌(C16)	AADC-0213	SOX	L-OHP	130mg/m ² day1	3週ごと	
		TS-1	朝食後および夕食後の1日2回	day1～day14	3週ごと	
		副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック			
胃癌(C16)	AADC-0219	RAM療法	RAM	8mg/kg day1	2週ごと	
一次治療が無効の治癒切除不能胃癌		副作用:	腹痛、高血圧、下痢、 動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害 インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血 骨髄抑制、低カリウム血症、低ナトリウム血症			
胃癌(C16)	AADC-0220	PTX+RAM療法	RAM	8mg/kg day1	2週ごと	
一次治療が無効の治癒切除不能胃癌		PTX	70mg/m ² day1, 8	2週ごと		

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
			副作用:	腹痛、高血圧、下痢、疲労、無力症、末梢性浮腫 口内炎、肝機能障害、呼吸困難、蛋白尿、発疹、皮膚乾燥 動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害 インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血 骨髓抑制、低アルブミン血症、低ナトリウム血症、ざ瘡様皮膚炎 眼瞼浮腫、顔面浮腫、鼻出血	
胃癌(C16)	AADC-0225	<i>Nivolumab</i>	ニボルマブ	240mg/body 2週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
胃癌(C16)	AADC-0253	<i>Weekly nab-PTX</i>	nab-PTX	100mg/m ² 週1回投与 3週連続投与1週休薬 副作用: 骨髓抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感 脱毛、末梢神経障害、発疹、下痢	
胃癌(C16)	AADC-0206	<i>Trifluridine</i>	トリフルリジン	1回35mg/m ² を1日2回 5日間連続経口投与した後2日間休薬し、これを2回繰り返した後 14日間休む 1コース28日間 副作用: 骨髓抑制、恶心、食欲減退、疲労、下痢、嘔吐、口内炎、感染症、間質性肺炎	
胃癌(C16)	AADC-0272	<i>4週毎 Nivolumab</i>	ニボルマブ	480mg/body 4週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
胃癌(C16) HER2陽性切除不能進行再発	AADC-0273	<i>Trastuzumab Deruxtecan</i>	Trastuzumab Deruxtec	6.4mg/kg day1 3週ごと 副作用: 間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション 骨髓抑制、脱毛、疲労、恶心・嘔吐、下痢、便秘、口内炎	
胃癌(C16)	AADC-0295	<i>Nivolumab+CAPOX</i>	ニボルマブ カペシタビン	360mg/body day1 3週ごと 1日2回 14日間内服7日間休薬 体表面積 1.36m ² 未満 1200mg/回 1.36以上1.66m ² 未満 1500mg/回 1.66以上1.96m ² 未満 1800mg/回 1.96m ² 以上 2100mg/回 L-OHP	130mg/m ² day1 3週ごと 副作用: 手足症候群、骨髓抑制、恶心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着 発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
胃癌(C16)	AADC-0296	<i>Nivolumab+SOX</i>	ニボルマブ L-OHP TS-1	360mg/body day1 3週ごと 130mg/m ² day1 3週ごと 朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14 3週ごと 体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回 1.25から1.5m ² 未満 50mg/回 1.5m ² 以上 60mg/回 副作用: 骨髓抑制、食欲不振、恶心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 末梢神経障害、感覺異常、アナフィラキシーショック 発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等					
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション					
胃癌(C16)	AADC-0297	<i>Nivolumab+mFOLFOX6</i>	ニボルマブ L-OHP 5-FU (bolus) 5-FU (infusion) l-LV	240mg/body 85mg/ m ² 400mg/ m ² 2400mg/ m ² 200mg/ m ²	day1 day1 day1 46～48hr day1	2週ごと		
			副作用:	末梢神経障害、食欲不振、骨髓抑制、注射部位反応、恶心・嘔吐倦怠感、下痢 発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション				
胃癌(C16)	AADC-0353	<i>Pembrolizumab+CAPOX</i>	ペムブロリズマブ カペシタビン 体表面積 L-OHP	200mg/body 1日2回 1.36 m ² 未満 1.36以上1.66 m ² 未満 1.66以上1.96 m ² 未満 1.96 m ² 以上 130mg/ m ²	day1 14日間内服7日間休薬 1200mg/回 1500mg/回 1800mg/回 2100mg/回 day1	3週ごと		
			副作用:	手足症候群、骨髓抑制、恶心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着 発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション				
胃癌(C16)	AADC-0354	<i>Zolbetuximab+CAPOX</i>	ゾルベツキシマブ カペシタビン 体表面積 L-OHP	初回 800mg/ m ² (2回目以降は600mg/ m ²) 1日2回 14日間内服7日間休薬 1.36 m ² 未満 1.36以上1.66 m ² 未満 1.66以上1.96 m ² 未満 1.96 m ² 以上 130mg/ m ²	3週ごと			
			副作用:	重度の恶心・嘔吐、過敏症、インフュージョンリアクション 手足症候群、骨髓抑制、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着				
胃癌(C16)	AADC-0355	<i>Zolbetuximab+mFOLFOX6</i>	ゾルベツキシマブ L-OHP 5-FU (bolus) 5-FU (infusion) l-LV	初回 800mg/ m ² (2回目以降は600mg/ m ²) 85mg/ m ² 400mg/ m ² 2400mg/ m ² 200mg/ m ²	3週ごと			
			副作用:	重度の恶心・嘔吐、過敏症、インフュージョンリアクション 末梢神経障害、食欲不振、骨髓抑制、注射部位反応、倦怠感、下痢 発熱、高血圧				
胃癌(C16) HER2陽性かつCPS≥1の進行再発胃癌	AADC-0370	<i>Pembrolizumab+Trastuzumab+CAPOX</i>	ペムブロリズマブ トラスツズマブ カペシタビン 体表面積	200mg/body 8mg/kg 1日2回 1.36 m ² 未満 1.36以上1.66 m ² 未満 1.66以上1.96 m ² 未満	day1 day1 (2回目からは6mg/kg) 14日間内服7日間休薬 1200mg/回 1500mg/回 1800mg/回			

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			1.96m ² 以上 2100mg/回
		L-OHP	130mg/m ² day1
		3週ごと	
		副作用:	手足症候群、骨髓抑制、恶心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着 発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
胃癌(C16) HER2陽性かつCPS≥1の進行再発胃癌	AADC-0371	Pembrolizumab+Trastuzumab+FP	ペムブロリズマブ 1回200mg day1 トラスツズマブ [®] 8mg/kg (2回目からは6mg/kg) day1 CDDP 80 mg/m ² day1 5FU 800 mg/m ² day1からday5 3週毎
		副作用:	骨髓抑制、恶心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎 インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感 肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 下垂体機能障害、1型糖尿病 肺炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
GIST(C16～C17)	AADC-0009	Glivec	イマチニブ1日1回400mgを食後に投与 副作用: 骨髓抑制、食欲不振、恶心・嘔吐、浮腫、発疹、倦怠感、電解質異常 肝機能障害、血中アルブミン減少
GIST(C16～C17)	AADC-0112	Sutent	スニチニブ1日1回50mg 4週間連続投与2週間休薬 副作用: 骨髓抑制、皮膚変色、手足症候群、食欲不振、肝機能異常、疲労感 味覚異常、口内炎、下痢、恶心、歯肉炎、代謝異常、浮腫、発熱、高血圧
GIST(C16～C17)	AADC-0316	Pimtespib	ピミテスピブ 1日1回 160mg 空腹時 5日間連続経口投与後2日間休薬 副作用: 下痢、食欲不振、倦怠感、恶心、血清クレアチニン上昇 腎機能低下、夜盲症、貧血
大腸癌(C18)	AADC-0001	S-1(CG)	用法 a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的) 用量 朝食後および夕食後の1日2回 体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回 1.25から1.5m ² 未満 50mg/回 1.5m ² 以上 60mg/回 副作用: 骨髓抑制、食欲不振、恶心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
大腸癌(C18)	AADC-0010	UFT(UFTE)	用法・用量 1日量としてテガフル300-600mgを1日2-3回に分割投与 副作用: 食欲不振、恶心・嘔吐、下痢、骨髓抑制、肝機能障害
大腸癌(C18)	AADC-0011	UFT(UFT-E)/LV 療法	UFT-E 300mg/m ² /日 1日3回に分けて LV 75mg/日 1日3回に分けて 食間に服用 副作用: 食欲不振、恶心・嘔吐、下痢、骨髓抑制、肝機能障害

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等			
大腸癌(C18)	AADC-0014	<i>mFOLFOX6</i> 療法	L-OHP 5-FU (bolus) 5-FU (infusion) l-LV	85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² 200mg/m ²	day1 day1 46～48hr day1	2週ごと
			副作用:	末梢神経障害、食欲不振、骨髓抑制、注射部位反応、恶心・嘔吐倦怠感、下痢 発熱		
大腸癌(C18)	AADC-0084	<i>FOLFIRI</i> 療法	5-FU (bolus) 5-FU (infusion) l-LV CPT-11	400mg/m ² 2400mg/m ² 200mg/m ² 150mg/m ²	day1 46～48hr day1 day1	2週ごと
			副作用:	食欲不振、恶心・嘔吐、下痢、骨髓抑制、肝機能障害、脱毛		
大腸癌(C18)	AADC-0092	<i>Bevacizumab based mFOLFOX6</i> 療法	ベバシズマブ L-OHP 5-FU (bolus) 5-FU (infusion) l-LV	1回5mg/kgまたは10mg/kg 85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ² 200mg/m ²	day1 day1 day1 46～48hr day1	2週ごと
			副作用:	末梢神経障害、食欲不振、骨髓抑制、注射部位反応、恶心・嘔吐倦怠感、下痢 発熱、消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症 高血圧性クリーゼ		
大腸癌(C18)	AADC-0093	<i>Bevacizumab based FOLFIRI</i> 療法	ベバシズマブ 5-FU (bolus) 5-FU (infusion) l-LV CPT-11	1回5mg/kgまたは10mg/kg 400mg/m ² 2400mg/m ² 200mg/m ² 150mg/m ²	day1 day1 46～48hr day1 day1	2週ごと
			副作用:	食欲不振、恶心・嘔吐、下痢、骨髓抑制、肝機能障害、脱毛、発熱 消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症 高血圧性クリーゼ		
大腸癌(C18)	AADC-0099	<i>5-FU/LV</i> 療法	5-FU (bolus) 5-FU (infusion) l-LV	400mg/m ² 2400mg/m ² 200mg/m ²	day1 46～48hr day1	
			2週ごと	骨髓抑制、食欲不振、恶心・嘔吐、口内炎、手足症候群、脱毛 全身倦怠感、肝機能障害、下痢		
大腸癌(C18)	AADC-0102	<i>Xeloda</i>	カペシタビン 体表面積	1日2回 1.33m ² 未満 1.33から1.57m ² 未満 1.57から1.81m ² 未満 1.81m ² 以上	2週連続投与 1.33m ² 未満 1.33から1.57m ² 未満 1.57から1.81m ² 未満 2100mg/回 1800mg/回 2400mg/回	1週休薬 1500mg/回
			副作用:	手足症候群、骨髓抑制、恶心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎		
大腸癌(C18)	AADC-0107	<i>Bevacizumab based 5-FU/LV</i> 療法	ベバシズマブ	1回5mg/kgまたは10mg/kg	day1	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
			5-FU (bolus)	400mg/m ²	day1
			5-FU (infusion)	2400mg/m ²	46~48hr
			l-LV	200mg/m ²	day1
			2週ごと		
			副作用:	骨髓抑制、食欲不振、恶心・嘔吐、口内炎、手足症候群、脱毛 全身倦怠感、肝機能障害、下痢、高血圧性クリーゼ 消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症	
大腸癌(C18)	AADC-0108	UFT/LV+IMRT療法	UFT 300mg/m ² /日 1日3回に分けて LV 75mg/日 1日3回に分けて 食間に服用 トモセラピー 2Gy/day (day1~5まで行い、day6,7は中止) 4週連続投与(到達目標40Gy)		
			副作用:	食欲不振、恶心・嘔吐、下痢、骨髓抑制、肝機能障害	
大腸癌(C18)	AADC-0109	Cetuximab + FOLFIRI 療法	セツキシマブ 初回 400mg/m ² (2回目以降は250mg/m ²) CPT-11 150mg/m ² (75歳以上は120mg/m ²) l-LV 200mg/m ² 5-FU (bolus) 400mg/m ² 5-FU (infusion) 2400mg/m ² 副作用:	day1 週1回 day1 2週ごと ² day1 2週ごと ² day1 2週ごと ² 46~48hr 2週ごと ²	
			食欲不振、恶心・嘔吐、下痢、骨髓抑制、肝機能障害、脱毛、発熱 ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪園炎、口内炎、低マグネシウム血症、 搔痒感、infusion reaction		
大腸癌(C18)	AADC-0110	Cetuximab + CPT-11 療法	セツキシマブ 初回 400mg/m ² (2回目以降は250mg/m ²) CPT-11 150mg/m ² (75歳以上は120mg/m ²) 副作用:	day1 週1回 day1 2週ごと ²	
			ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪園炎、口内炎、低マグネシウム血症、 搔痒感、infusion reaction、食欲不振、下痢、恶心・嘔吐 脱毛、疲労感、骨髓抑制		
大腸癌(C18)	AADC-0115	Cetuximab	セツキシマブ 初回 400mg/m ² (2回目以降は250mg/m ²) 週1回 副作用:	day1 ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪園炎、口内炎、低マグネシウム血症、 搔痒感、infusion reaction、下痢	
大腸癌(C18)	AADC-0134	XELOX 療法	カペシタビン 1日2回 14日間内服7日間休薬 体表面積 1.36m ² 未満 1200mg/回 1.36以上1.66m ² 未満 1500mg/回 1.66以上1.96m ² 未満 1800mg/回 1.96m ² 以上 2100mg/回 L-OHP 130mg/m ² day1 3週ごと 副作用:	手足症候群、骨髓抑制、恶心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着	
大腸癌(C18)	AADC-0135	Bevacizumab based XELOX 療法	ベバシズマブ 7.5mg/kg day1 3週ごと カペシタビン 1日2回 14日間内服7日間休薬 体表面積 1.36m ² 未満 1200mg/回 1.36以上1.66m ² 未満 1500mg/回 1.66以上1.96m ² 未満 1800mg/回 1.96m ² 以上 2100mg/回 L-OHP 130mg/m ² day1 3週ごと 副作用:	手足症候群、骨髓抑制、恶心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着 消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等			
大腸癌(C18)	AADC-0136	IRIS(大腸)	高血圧性クリーゼ			
			CPT-11	125 mg/m ²	2週ごと	
			TS-1	80~120mg/body	2週投与2週休薬	
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹、脱毛		
大腸癌(C18)	AADC-0140	Bevacizumab based XELODA 療法	ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1 3週ごと	
			カペシタビン	1日2回	14日間内服7日間休薬	
			体表面積	1.36 m ² 未満	1200mg/回	
				1.36以上1.66 m ² 未満	1500mg/回	
				1.66以上1.96 m ² 未満	1800mg/回	
				1.96 m ² 以上	2100mg/回	
			副作用:	手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加		
				口内炎、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着		
				消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症		
				高血圧性クリーゼ		
大腸癌(C18)	AADC-0146	Panitumumab	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注 2週毎	
			副作用:	infusion reaction、ざ瘡、皮膚乾燥、発疹、搔痒、爪周炎、低マグネシウム血症		
				疲労、口内炎、食欲不振、下痢、間質性肺疾患		
大腸癌(C18)	AADC-0147	Panitumumab based FOLFIRI療法	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	
			5-FU (bolus)	400mg/m ²	day1	
			5-FU (infusion)	2400mg/m ²	46~48hr	
			l-LV	200mg/m ²	day1	
			CPT-11	150mg/m ² (76才以上は120mg/m ²)	day1	
			2週毎			
			副作用:	infusion reaction、ざ瘡、皮膚乾燥、発疹、搔痒、爪周炎、低マグネシウム血症		
				疲労、口内炎、食欲不振、下痢、間質性肺疾患、悪心・嘔吐、骨髄抑制		
				肝機能障害、脱毛		
大腸癌(C18)	AADC-0148	Panitumumab based FOLFOX療法	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	
			L-OHP	85mg/m ²	day1	
			5-FU (bolus)	400mg/m ²	day1	
			5-FU (infusion)	2400mg/m ²	46~48hr	
			l-LV	200mg/m ²	day1	
			2週毎			
			副作用:	infusion reaction、ざ瘡、皮膚乾燥、発疹、搔痒、爪周炎、低マグネシウム血症		
				疲労、口内炎、食欲不振、下痢、間質性肺疾患、発熱		
				末梢神経障害、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐、倦怠感、		
大腸癌(C18)	AADC-0168	Cetuximab based mFOLFOX6 療法	セツキシマブ	初回 400mg/m ² (2回目以降は250mg/m ²)	day1	週1回
			L-OHP	85mg/m ²	day1	2週ごと
			5-FU (bolus)	400mg/m ²	day1	2週ごと
			5-FU (infusion)	2400mg/m ²	46~48hr	2週ごと
			l-LV	200mg/m ²	day1	2週ごと
			副作用:	ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪周炎、口内炎、低マグネシウム血症、		
				搔痒感、infusion reaction、食欲不振、下痢、悪心・嘔吐、発熱		
				脱毛、疲労感、骨髄抑制、末梢神経障害、注射部位反応、		
大腸癌(C18)	AADC-0191	Regorafenib	レゴラフェニブ	1日1回160mgを3週間連日経口投与、その後1週間休薬	これを繰り返す	
治癒切除不能な進行・再発大腸癌			副作用:	手足症候群、TEN、Stevens-Johnson症候群、多形紅斑		
				肝機能障害、出血、血栓塞栓症、高血圧、高血圧クリーゼ、可逆性後白質脳症		
				消化管穿孔、下痢、食欲不振、口内炎、悪心・嘔吐、頻脈、発声障害、骨髄抑制		

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等						
			脱毛、搔痒、多汗症						
大腸癌(C18) 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	<i>AADC-0192</i>	<i>BV/SOX</i>	ベバシズマブ	5mg/kg	day1	3週ごと			
			L-OHP	130mg/m ²	day1	3週ごと			
			TS-1	朝食後および夕食後の1日2回	day1～day14	3週ごと			
			体表面積	1.25m ² 未満	40mg/回				
				1.25から1.5m ² 未満	50mg/回				
				1.5m ² 以上	60mg/回				
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 末梢神経障害、感覺異常、アナフィラキシーショック、消化管穿孔 創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クリーゼ 可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うつ血性心不全、間質性肺炎 肝機能障害、脱毛、					
大腸癌(C18)	<i>AADC-0206</i>	<i>Trifluridine</i>	トリフルリジン	1回35mg/m ² を1日2回					
				5日間連続経口投与した後2日間休薬し、これを2回繰り返した後					
				14日間休む					
				1コース28日間					
			副作用:	骨髄抑制、悪心、食欲減退、疲労、下痢、嘔吐、口内炎、感染症、間質性肺炎					
大腸癌(C18)	<i>AADC-0213</i>	<i>SOX</i>	L-OHP	130mg/m ²	day1	3週ごと			
			TS-1	朝食後および夕食後の1日2回	day1～day14	3週ごと			
			体表面積	1.25m ² 未満	40mg/回				
				1.25から1.5m ² 未満	50mg/回				
				1.5m ² 以上	60mg/回				
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 末梢神経障害、感覺異常、アナフィラキシーショック					
大腸癌(C18)	<i>AADC-0214</i>	<i>Panitumumab+5-FU/LV</i>	パニツムマブ	6mg/kg		day1			
			5-FU (bolus)	400mg/m ²		day1			
			5-FU (infusion)	2400mg/m ²		46～48hr			
			l-LV	200mg/m ²		day1			
			2週毎						
			副作用:	Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、低マグネシウム血症、口内炎 ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪剥炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎 骨髄抑制、感染症、肝機能障害、手足症候群					
大腸癌(C18)	<i>AADC-0215</i>	<i>Cetuximab+5-FU/LV</i>	セツキシマブ	初回 400mg/m ² (2回目以降は250mg/m ²)		day1	週1回		
			5-FU (bolus)	400mg/m ²		day1	2週ごと		
			5-FU (infusion)	2400mg/m ²		46～48hr	2週ごと		
			l-LV	200mg/m ²		day1	2週ごと		
			副作用:	Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、心不全、血栓塞栓症、口内炎 ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪剥炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎 骨髄抑制、感染症、肝機能障害、手足症候群、低マグネシウム血症 末梢神経障害					
大腸癌(C18)	<i>AADC-0216</i>	<i>Panitumumab+CPT-11</i>	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注				
			CPT-11	150mg/m ² (76才以上は120mg/m ²)		day1			
			2週毎						
			副作用:	Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、低マグネシウム血症、口内炎 ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪剥炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎 骨髄抑制、腸管穿孔、消化管出血、腸閉塞、末梢神経障害、脱毛 腎機能障害、血栓塞栓症					

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
大腸癌(C18)	AADC-0223	<i>bevacizumab+XELIRI</i>	ベバシズマブ CPT-11 XELODA 3週毎	7.5mg/kg 200mg/m ² 1600mg/m ² /日	day1 day1 day1～14
			副作用:	infusion reaction、消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、高血圧性脳症 可逆性後白質脳症症候群、ネフローゼ症候群、骨髄抑制、感染症 うつ血性心不全、間質性肺炎、神経障害、食欲減退、恶心、口内炎 脱毛、下痢、手足症候群、腎障害、色素沈着	
大腸癌(C18)	AADC-0228	<i>Bevacizumab + FOLFOXIRI</i>	ベバシズマブ 5-FU (infusion) l-LV L-OHP CPT-11 2週毎	5mg/kg 3200mg/m ² 200mg/m ² 85mg/m ² 165mg/m ²	day1 46hr day1 day1 day1
			副作用:	骨髄抑制、下痢、恶心、嘔吐、口内炎、無力症、末梢神経障害 高血圧、静脈血栓塞栓症、アナフィラキシー反応、間質性肺炎 腸管穿孔、創傷治癒遅延、白質脳症	
大腸癌(C18)	AADC-0229	<i>Capecitabine + IMRT</i>	カペシタбин トモセラピー	1日2回 1.31m ² 未満 1.31以上1.64m ² 未満 1.64以上	週5日 900mg/回 1200mg/回 1500mg/回 2Gy/day day1～5実施、day6～7中止 最大50Gy (2Gy×25回 5週間)
			副作用:	骨髄抑制、手足症候群、下痢、恶心・嘔吐、口内炎、腹痛 疲労、無力症、脱毛、皮膚の発赤、搔痒感	
大腸癌(C18)	AADC-0230	<i>RAM + FOLFIRI</i>	ラムシルマブ 5-FU (bolus) 5-FU (infusion) l-LV CPT-11 2週毎	8mg/kg 400mg/m ² 2400mg/m ² 200mg/m ² 150mg/m ²	day1 day1 day1～3 day1 day1
			副作用:	食欲不振、恶心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛 口内炎、鼻出血、高血圧、動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症 消化管穿孔	
大腸癌(C18) 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	AADC-0259	<i>bevacizumab+S-1(3週毎)</i>	ベバシズマブ TS-1	7.5mg/kg 朝食後および夕食後の1日2回	day1 day1～day14 3週ごと
				体表面積 1.25m ² 未満 1.25から1.5m ² 未満 1.5m ² 以上	40mg/回 50mg/回 60mg/回
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、恶心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 消化管穿孔、肝機能障害 創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クリーゼ 可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うつ血性心不全、間質性肺炎	
大腸癌(C18) 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	AADC-0260	<i>bevacizumab+S-1(4週毎)</i>	ベバシズマブ TS-1	5mg/kg 朝食後および夕食後の1日2回	day1、15 day1～day14
				体表面積 1.25m ² 未満 1.25から1.5m ² 未満 1.5m ² 以上	40mg/回 50mg/回 60mg/回

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等			
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 消化管穿孔、肝機能障害 創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クリーゼ 可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うつ血性心不全、間質性肺炎		
大腸癌(C18) 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	<i>AADC-0261</i>	<i>bevacizumab+IRIS</i>	ベバシズマブ CPT-11 TS-1	5mg/kg day1、15 150mg/m ² day1、15 朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14 体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回 1.25から1.5m ² 未満 50mg/回 1.5m ² 以上 60mg/回		
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 末梢神経障害、感覺異常、アナフィラキシーショック、消化管穿孔 創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クリーゼ 可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うつ血性心不全、間質性肺炎 肝機能障害、脱毛		
大腸癌(C18) MSI-high	<i>AADC-0252</i>	<i>Nivolumab+Ipilimumab</i>	Nivolumab Ipilimumab	240mg/body 1mg/kg 3週毎4コースまで 5コースから		
			副作用:	240mg/body 2週毎 又は 480mg/body 4週毎 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核		
大腸癌(C18)	<i>AADC-0284</i>	<i>Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab</i>	Cetuximab Encorafenib Binimetinib	初回 400mg/m ² (2回目以降は250mg/m ²)を週1回 1回300mg 1日1回経口投与 1回45mg 1日2回経口投与		
			副作用:	ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪園炎、口内炎、低マグネシウム血症、 搔痒感、infusion reaction、下痢、悪心嘔吐、疲労 手足症候群、眼障害、心機能障害、肝障害、横紋筋融解症		
大腸癌(C18)	<i>AADC-0285</i>	<i>Encorafenib+Cetuximab</i>	Cetuximab Encorafenib	初回 400mg/m ² (2回目以降は250mg/m ²)を週1回 1回300mg 1日1回経口投与		
			副作用:	ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪園炎、口内炎、低マグネシウム血症、 搔痒感、infusion reaction、下痢、悪心嘔吐、疲労 皮膚悪性腫瘍、手足症候群、眼障害、横紋筋融解症		
大腸癌(C18) Her2陽性大腸癌 RAS野生型	<i>AADC-0303</i>	<i>Pertuzumab+Trastuzumab(Her2陽性大腸癌)</i>	Pertuzumab Trastuzumab	初回840mg/body 2回目以降420mg/body day1 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg day1		
			3週ごと			
			副作用:	インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感 間質性肺炎、悪心、口内炎		
大腸癌(C18)	<i>AADC-0317</i>	<i>Bevacizumab+Trifluridine</i>	ベバシズマブ トリフルリジン	5mg/kg day1、15 1回35mg/m ² を1日2回 5日間連続経口投与した後2日間休薬し、これを2回繰り返した後 14日間休む 1コース28日間		
			副作用:	骨髄抑制、悪心、食欲減退、疲労、下痢、嘔吐、口内炎、感染症、間質性肺炎 創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クリーゼ		

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
大腸癌(C18)	AADC-0321	<i>bi weekly cetuximab</i>	セツキシマブ 2週毎	500mg/ m ²	day1
			副作用:	ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪園炎、口内炎、低マグネシウム血症、搔痒感、infusion reaction、下痢	
大腸癌(C18)	AADC-0322	<i>bi weekly cetuximab+mFOLFOX6</i>	セツキシマブ L-OHP 5-FU (bolus) 5-FU (infusion) l-LV 2週毎	500mg/ m ² 85mg/ m ² 400mg/ m ² 2400mg/ m ² 200mg/ m ²	day1 day1 day1 46～48hr day1
			副作用:	ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪園炎、口内炎、低マグネシウム血症、搔痒感、infusion reaction、食欲不振、下痢、恶心・嘔吐、発熱、脱毛、疲労感、骨髓抑制、末梢神経障害、注射部位反応、	
大腸癌(C18)	AADC-0323	<i>bi weekly cetuximab+FOLFIRI</i>	セツキシマブ CPT-11 l-LV 5-FU (bolus) 5-FU (infusion) 2週毎	500mg/ m ² 150mg/ m ² (75歳以上は120mg/ m ²) 200mg/ m ² 400mg/ m ² 2400mg/ m ²	day1 day1 day1 day1 46～48hr
			副作用:	食欲不振、恶心・嘔吐、下痢、骨髓抑制、肝機能障害、脱毛、発熱、ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪園炎、口内炎、低マグネシウム血症、搔痒感、infusion reaction	
大腸癌(C18)	AADC-0324	<i>bi weekly cetuximab+5FU+l-LV</i>	セツキシマブ 5-FU (bolus) 5-FU (infusion) l-LV 2週毎	500mg/ m ² 400mg/ m ² 2400mg/ m ² 200mg/ m ²	day1 day1 46～48hr day1
			副作用:	Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、心不全、血栓塞栓症、口内炎、ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪園炎、発疹、味覚異常、恶心・嘔吐、結膜炎、骨髓抑制、感染症、肝機能障害、手足症候群、低マグネシウム血症	
大腸癌(C18)	AADC-0329	<i>Cetuximab+CPT-11(bi-weekly)</i>	セツキシマブ CPT-11 2週毎	500mg/ m ² 150mg/ m ² (76才以上は120mg/ m ²)	day1 day1
			副作用:	Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、低マグネシウム血症、口内炎、ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪園炎、発疹、味覚異常、恶心・嘔吐、結膜炎、骨髓抑制、腸管穿孔、消化管出血、腸閉塞、末梢神経障害、脱毛、腎機能障害、血栓塞栓症	
大腸癌(C18)	AADC-0330	<i>IRIS+bev(TRICOLORE)</i>	ベバシズマブ CPT-11 TS-1 3週毎	7.5mg/kg 150mg/ m ² 朝食後および夕食後の1日2回 体表面積 1.25m ² 未満 1.25から1.5m ² 未満 1.5m ² 以上	day1 day1 day1～day14 40mg/回 50mg/回 60mg/回
			副作用:	骨髓抑制、食欲不振、恶心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹、末梢神経障害、感覺異常、アナフィラキシーショック、消化管穿孔、創傷治癒遲延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クリーゼ、可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うつ血性心不全、間質性肺炎、肝機能障害、脱毛	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
大腸癌(C18) Her2陽性大腸癌 RAS野生型	AADC-0344	<i>PHESGO</i>	ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として 初回(IN) それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1 2回目以降(MA) それぞれ 600mg、600mg、20000U day1 初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与 3週ごと		
			副作用: インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感 間質性肺炎、悪心、口内炎		
大腸癌(C18)	AADC-0356	<i>Bevacizumab+mFOLFOXIRI</i>	ベバシズマブ 5mg/kg day1 5-FU (infusion) 2400mg/ m ² 46hr I-LV 200mg/ m ² day1 L-OHP 85mg/ m ² day1 CPT-11 150mg/ m ² day1 2週毎		
			副作用: 骨髄抑制、下痢、悪心、嘔吐、口内炎、無力症、末梢神経障害 高血圧、静脈血栓塞栓症、アナフィラキシー反応、間質性肺炎 腸管穿孔、創傷治癒遅延、白質脳症		
大腸癌(C18) がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発大腸癌	AADC-0364	<i>Fruquintinib</i>	フルキンチニブ 1日1回 5mgを3週間連日経口投与、その後1週間休薬 これを繰り返す 副作用: 手足症候群、蛋白尿、創傷治癒遅延、甲状腺機能低下症、動脈解離 肝機能障害、出血、血栓塞栓症、高血圧、高血圧クリーゼ、可逆性後白質脳症 消化管穿孔、下痢、食欲不振、口内炎、悪心・嘔吐、頻脈、発声障害、骨髄抑制		
肛門管癌(C21.1)	AADC-0196	<i>5-FU+MMC+RT</i>	5-FU (infusion) 1000mg/ m ² /day day1~4 29~32 MMC(bolus) 10mg/ m ² /day day1,29 RT 1.8Gy/day 週5回 計33回 総線量 59.4Gy 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、全身倦怠感、体重減少、脱毛、口内炎 出血傾向、溶血性尿毒症症候群、腎障害、間質性肺炎、下痢、色素沈着 肝機能障害、アナフィラキシーショック、白質脳症、うつ血性心不全、手足症候群 食道炎、		
肝癌(C22)	AADC-0017	<i>Epirubicin 肝動注</i>	1日 60mg/ m ² を動脈内投与 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、脱毛、悪心・嘔吐		
肝癌(C22)	AADC-0141	<i>Miriplatin肝動注</i>	1日1回70mg を肝動脈内投与(1回120mgを上限) 繰り返し投与する場合は4週間以上の観察期間をおく 副作用: 肝機能障害、骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、発熱、投与部位の疼痛 腎機能障害、全身倦怠感		
肝癌(C22)	AADC-0160	<i>Sorafenib</i>	用法・用量 1回400mg 1日2回 経口投与 適宜増減 副作用: 手足症候群。剥脱性皮膚炎、発疹、脱毛、下痢、高血圧、疲労 食欲不振、うっ痒感、体重減少、肝機能障害、出血 間質性肺炎、急性肺障害、高血圧クリーゼ、可逆性後白質脳症 皮膚粘膜眼症候群、消化管穿孔、心筋虚血・心筋梗塞		
肝癌(C22)	AADC-0240	<i>Lenvatinib</i>	用法・用量 体重60kg以上 1日1回12mg経口投与 体重60kg未満 1日1回8mg経口投与 副作用: 高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労 口内炎、蛋白尿、手掌・足底発赤知覚不全症候群、出		

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
			動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔		
			可逆性後白質脳症症候群、心障害、骨髓抑制、創傷治癒遅延		
			低カルシウム血症		
肝癌(C22) 切除不能肝細胞癌	<i>AADC-0293</i>	<i>Atezolizumab+Bevacizumab</i>	アテゾリズマブ ベバシズマブ	1200mg 15mg/kg	day1 day1 3週ごと
			副作用:	疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、肺炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神經障害 消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧	
肝癌(C22) 進行再発肝細胞癌	<i>AADC-0327</i>	<i>Durvalumab+Tremelimumab</i>	Durvalumab Tremelimumab	1500mg(体重30kg以下の場合は20mg/kg) 300mg(体重30kg以下の場合は4mg/kg)	4週間隔 初回単回のみ
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神經障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
肝癌(C22) 進行再発肝細胞癌	<i>AADC-0348</i>	<i>Durvalumab</i>	Durvalumab	1500mg/body 体重30kg以下の場合は1回20mg/kg	day1 4週毎
			副作用:	間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー	
肝癌(C22) がん化学療法後に増悪した切除不能な肝細胞癌	<i>AADC-0278</i>	<i>Cabozantinib</i>	カボザンチニブ	1回60mg 1日1回空腹時	
			副作用:	高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、恶心、疲労 口内炎、蛋白尿、手足症候群、横紋筋融解症 動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔 可逆性後白質脳症症候群、心障害、骨髓抑制、創傷治癒遅延 低カルシウム血症	
肝癌(C22) 切除不能肝細胞癌	<i>AADC-0309</i>	<i>Nivolumab+ipilimumab</i>	Nivolumab Ipilimumab	80mg/body 3mg/kg	
			3週毎 4回投与後、Nivolumab 240mg/bodyを2週毎、又は480mg/bodyを4週毎 で継続	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、神經障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 肝機能障害、肝炎、血球貪食症候群、結核	
胆道癌(C22~24)	<i>AADC-0001</i>	<i>S-1(CG)</i>	用法	a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的)	
			用量	朝食後および夕食後の1日2回 体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回 1.25から1.5m ² 未満 50mg/回 1.5m ² 以上 60mg/回	
			副作用:	骨髓抑制、食欲不振、恶心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹	
胆道癌(C22~24)	<i>AADC-0015</i>	<i>GEM</i>	GEM	1000 mg/m ² を週1回 3回投与 1週休薬 1000 mg/m ² を2週間に1回	
			副作用:	骨髓抑制、食欲不振、恶心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
胆道癌(C22~24)	AADC-0163	GC療法	GEM	1000mg/m ²	day1.8
			CDDP	25mg/m ²	day1.8
			1クール:3週		
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髓抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱	
胆道癌(C22~24)	AADC-0320	Durvalumab+GEM+CDDP	Durvalumab	1500mg/body	day1
			GEM	1000mg/m ²	day1.8
			CDDP	25mg/m ²	day1.8
			1クール:3週		
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髓抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー	
胆道癌(C22~24)	AADC-0347	GCS	GEM	1000mg/m ²	day1
			CDDP	25mg/m ²	day1
			S-1	80mg/m ²	day1-7
			1クール:2週		
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髓抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 下痢、色素沈着、発疹	
胆道癌(C22~24)	AADC-0352	Pembrolizumab+GEM+CDDP	Pembrolizumab	200mg/body	day1
			GEM	1000mg/m ²	day1.8
			CDDP	25mg/m ²	day1.8
			1クール:3週	CDDPは最大8クールまで、以降Pembrolizumab+GEM or Pembrolizumab単剤で継続	
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髓抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー	
肺癌(C25)	AADC-0001	S-1(CG)	用法	a.4週投与 2週休薬法	
				b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的)	
			用量	朝食後および夕食後の1日2回	
				体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回	
				1.25から1.5m ² 未満 50mg/回	
				1.5m ² 以上 60mg/回	
肺癌(C25)	AADC-0015	GEM	GEM	1000 mg/m ² を週1回 3回投与 1週休薬	
				1000 mg/m ² を2週間に1回	
			副作用:	骨髓抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感	
肺癌(C25)	AADC-0143	GEM +IMRT療法	GEM	1000 mg/m ² を週1回 3回投与 1週休薬	
			放射線照射	1.8Gy × 28Fr total50.4Gy	
			副作用:	骨髓抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感	
肺癌(C25)	AADC-0159	Erlotinib+GEM療法			

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
			Erlotinib	100mg/day	連日経口投与
			GEM	1000 mg/m ²	を週1回 3回投与 1週休薬
			副作用:	骨髓抑制、食欲不振、ざ瘡様皮疹等の発疹、恶心・嘔吐、下痢 間質性肺炎	
脾癌(C25)	AADC-0200	FOLFIRINOX			
治癒切除不能脾癌			L-OHP	85mg/m ²	day1
			5-FU (bolus)	400mg/m ²	day1
			5-FU (infusion)	2400mg/m ²	46hr
			l-LV	200mg/m ²	day1
			CPT-11	180mg/m ²	day1
			2週ごと		
			副作用:	末梢神経障害、食欲不振、骨髓抑制、注射部位反応、恶心・嘔吐、倦怠感、下痢 発熱、脱毛、肝機能障害	
脾癌(C25)	AADC-0212	GEM+nab-PTX	GEM	1000mg/m ²	day1
治癒切除不能脾癌			nab-PTX	125mg/m ²	day1
			3週投与1週休薬		
			副作用:	骨髓抑制、食欲不振、恶心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感 脱毛、末梢神経障害、発疹、下痢	
脾癌(C25)	AADC-0248	Olaparib	オラバリブ	1回300mgを1日2回経口投与	
BRCA遺伝子変異陽性、プラチナ製剤を含む化学療法後に疾患進行が認められていない脾癌			副作用:	恶心、嘔吐、味覚異常 貧血、好中球減少、血小板減少、リンパ球減少 疲労、無力症、間質性肺炎 下痢、頭痛	
脾癌(C25)	AADC-0256	GEM+S-1(脾癌NAC)	GEM	1000 mg/m ² day1.day8 30分かけて点滴静注	
切除可能脾癌術前			S-1	体表面積毎(80mg～120mg) 14日間 分2で内服 (day1の夕方からday15の朝まで)	
				これを2コース繰り返す。	
			副作用:	骨髓抑制、食欲不振、恶心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感 下痢、口内炎、色素沈着、発疹	
脾癌(C25)	AADC-0318	Nal-IRI+5FU/LV	Liposomal Irinotecan	70mg/m ²	day1
治癒切除不能脾癌			5-FU (infusion)	2400mg/m ²	day1～3
			l-LV	200mg/m ²	day1
			2週毎		
			副作用:	食欲不振、恶心・嘔吐、下痢、肝機能障害、脱毛 倦怠感、好中球減少、貧血、低カリウム血症	
脾癌(C25)	AADC-0014	mFOLFOX6療法	L-OHP	85mg/m ²	day1
治癒切除不能脾癌			5-FU (bolus)	400mg/m ²	day1
			5-FU (infusion)	2400mg/m ²	46hr
			l-LV	200mg/m ²	day1
			2週ごと		
			副作用:	末梢神経障害、食欲不振、骨髓抑制、注射部位反応、恶心・嘔吐、倦怠感、下痢 発熱、肝機能障害	
脾内分泌腫瘍(C25.4)	AADC-0169	Everolimus	Everolimus	10mg/day	連日経口投与

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
			副作用:	口内炎、発疹、下痢、疲労、末梢性浮腫、恶心・嘔吐、食欲不振 鼻出血、貧血、味覚障害、体重減少、頭痛、搔痒症、高血糖 血小板減少、無力症、間質性肺炎、腎不全、アナフィラキシー様症状 急性呼吸窮迫症候群、肺塞栓症、深部静脈血栓症、好中球減少 悪性腫瘍(二次発癌)、皮膚乾燥、爪の障害、心嚢液貯留 進行性多巣性白室脳症、BKウィルス腎症、細胞蛋白症
消化管神経内分泌腫瘍(C26.9)	AADC-0188	サンドスタチンLAR	サンドスタチンLAR	1回30mgを4週毎に臀部筋肉内に注射 副作用: 注射部位硬結、注射部位疼痛、胆石症、下痢
膵・消化管神経内分泌腫瘍(C25.4、C26.9)	AADC-0257	Lanreotide	Lanreotide	1回120mgを4週毎に深部皮下内に注射 副作用: 注射部位硬結、注射部位疼痛、徐脈 胆石症、下痢、白色便
膵・消化管神経内分泌腫瘍(C25.4、C26.9)	AADC-0277	Streptozocin	Streptozocin	1000 mg/m ² 1週間毎 30分かけて点滴静注 副作用: 腎障害、骨髓抑制、耐糖能異常、肝障害 血管痛、恶心、便秘、味覚異常、倦怠感
肺癌(C34)	AADC-0001	S-1(CG)	用法	a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的)
非小細胞肺癌			用量	朝食後および夕食後の1日2回 体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回 1.25から1.5m ² 未満 50 mg/回 1.5m ² 以上 60mg/回
			副作用:	骨髓抑制、食欲不振、恶心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
肺癌(C34)	AADC-0010	UFT(UFTE)	用法・用量	1日量としてテガフル300-600mgを1日2-3回に分割投与
非小細胞肺癌			副作用:	食欲不振、恶心・嘔吐、下痢、骨髓抑制、肝機能障害
肺癌(C34)	AADC-0015	GEM	GEM	1000 mg/m ² を週1回 3回投与 1週休薬 1000 mg/m ² を2週間に1回
非小細胞肺癌			副作用:	骨髓抑制、食欲不振、恶心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感
肺癌(C34)	AADC-0019	PTX + CBDCA療法(TC)	PTX 200mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 3週ごと	副作用: 脱毛、骨髓抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、恶心・嘔吐、肝機能障害
非小細胞肺癌			副作用:	脱毛、骨髓抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、恶心・嘔吐、肝機能障害
肺癌(C34)	AADC-0020	DTX + CDDP療法(DC)	DTX 60mg/m ² day1 CDDP 80mg/m ² day1 3~4週ごと	副作用: 悪心・嘔吐、腎機能障害、神経毒性、聴覚障害、電解質異常、浮腫、倦怠感 味覚異常、爪の変形、骨髓抑制、脱毛
非小細胞肺癌			副作用:	悪心・嘔吐、腎機能障害、神経毒性、聴覚障害、電解質異常、浮腫、倦怠感 味覚異常、爪の変形、骨髓抑制、脱毛
肺癌(C34)	AADC-0022	Iressa		250mgを1日1回経口投与
非小細胞肺癌				

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
肺癌(C34)	AADC-0025	CPT-11	副作用: 下痢、皮膚乾燥症、ニキビ様皮疹、肝機能障害、間質性肺炎 CPT-11 100mg/m ² day1.8.15 1週間隔で3回投与、1週休薬
肺癌(C34)	AADC-0091	tri-weekly DTX	副作用: 骨髓抑制、恶心・嘔吐、下痢、間質性肺炎 DTX 60mg/m ² day1 3週ごと
肺癌(C34)	AADC-0098	CPT-11+CDDP療法(IP)	副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、恶心・嘔吐、発熱、下痢、骨髓抑制 肝機能障害、腎機能障害 CDDP 80mg/m ² day1 CPT-11 60mg/m ² day1.8.15 4週ごと
肺癌(C34)	AADC-0106	Tarceva	副作用: 骨髓抑制、恶心・嘔吐、倦怠感、腎機能障害、下痢、間質性肺炎、食欲不振 末梢神経障害、脱毛、 エルロチニブ 150mg 1日1回経口投与 副作用: 発疹、下痢、皮膚乾燥、搔痒感、間質性肺疾患、肝機能障害
肺癌(C34)	AADC-0111	VNR	ビノレルビン 25mg/m ² day1.8 3週ごと(4クール以上、最大6クール)
肺癌(C34)	AADC-0114	Pemetrexed+ CDDP療法	副作用: 悪心・嘔吐、骨髓抑制、食欲不振、倦怠感、口内炎、神経障害 Pemetrexed 500mg/m ² day1 CDDP 75mg/m ² day1 3週毎
肺癌(C34)	AADC-0119	CDDP+VNR+IMRT療法	副作用: 悪心・嘔吐、骨髓抑制、食欲不振、倦怠感、口内炎、神経障害 CDDP 80mg/m ² day1 VNR 20mg/m ² day1、8 3週ごと 4コース 放射線療法 2Gy/日 5回/週 計6週30回60Gy (化学療法1コース目のday3から開始) 副作用: 骨髓抑制、恶心・嘔吐、下痢、間質性肺炎、食欲不振、口内炎、倦怠感 腎機能障害
肺癌(C34)	AADC-0149	Bevacizumab based TC療法	副作用: 脱毛、骨髓抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、恶心・嘔吐、 肝機能障害、高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、喀血、肺出血、血栓塞栓症 PTX 200mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 ベバシズマブ 15mg/kg day1 3週ごと CBDCA+PTX+ベバシズマブを3週間間隔で4~6サイクル実施後、アバスチン単独を 3週間間隔で投与する
肺癌(C34)	AADC-0151	CDDP+VNR療法	副作用: 脱毛、骨髓抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、恶心・嘔吐、 肝機能障害、高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、喀血、肺出血、血栓塞栓症 CDDP 80mg/m ² day1 VNR 25mg/m ² day1、8 3週ごと 4コース 副作用: 骨髓抑制、恶心・嘔吐、下痢、間質性肺炎、食欲不振、口内炎、倦怠感 腎機能障害
肺癌(C34)	AADC-0170	Pemetrexed	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
非小細胞肺癌			Pemetrexed 500mg/m ² day1
			3週毎 4コース
			副作用: 肝機能障害、発疹、骨髓抑制、食欲不振、恶心
肺癌(C34)	AADC-0180	CBDCA+Pemetrexed	
非小細胞肺癌			Pemetrexed 500mg/m ² day1
			CBDCA 目標AUC=6 day1
			3週毎 4コース
			副作用: 肝機能障害、発疹、骨髓抑制、食欲不振、恶心、間質性肺炎、疲労感
			下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり
肺癌(C34)	AADC-0176	Crizotinib	
ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行再発非小細胞肺癌			Crizotinib 1回250mg 1日2回内服
ROS1融合遺伝子陽性の切除不能な進行再発非小細胞肺癌			副作用: 悪心・嘔吐、視力障害、下痢、便秘、末梢性浮腫、間質性肺炎
			肝機能障害、QT間隔延長、骨髓抑制
肺癌(C34)	AADC-0181	PEM+ CBDCA+ BV followed by PEM+ BV	
進行性非扁平非小細胞肺癌			Pemetrexed 500mg/m ² day1
			CBDCA 目標AUC=6 day1
			ベバシズマブ 15mg/kg day1
			3~4週毎4コース後 CR、PR、SDなら維持療法へ
			維持療法
			Pemetrexed 500mg/m ² day1
			ベバシズマブ 15mg/kg day1
			3週毎PDになるまで継続
			副作用: 肝機能障害、発疹、骨髓抑制、食欲不振、恶心、間質性肺炎、疲労感
			下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり
			高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、喀血、肺出血、血栓塞栓症
肺癌(C34)	AADC-0186	CBDCA+S-1療法	
非小細胞肺癌			CBDCA 目標AUC=5 day1
			TS-1 80~120mg/body day1~14
			3週毎
			副作用 骨髓抑制、食欲不振、恶心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
			神経障害、関節痛、脱毛
肺癌(C34)	AADC-0189	IMRT+ CBDCA	
非小細胞肺癌			CBDCA 30mg/m ² day1~day5
			IMRT 2Gy/日 day1~day5
			1週毎
			CBDCAは4週間実施、IMRTは6週間実施
			副作用: 嘔気・嘔吐、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、発熱、骨髓抑制、肝機能障害
			アナフィラキシー様症状、間質性肺炎、急性腎不全、肝不全、
			消化管壊死、消化管出血、出血性腸炎、偽膜性大腸炎、麻痺性イレウス
			脳梗塞、肺梗塞、血栓・塞栓症、心筋梗塞、うつ血性心不全、溶血性尿毒症症候群
			急性呼吸窮迫症候群、DIC、急性膵炎、難聴、皮膚炎、放射線肺炎、放射線食道炎
			脊髄症
肺癌(C34)	AADC-0194	nab-paclitaxel + Carboplatin	
非小細胞肺癌			アブラキサン 100mg/m ² day1, 8, 15
			CBDCA 目標AUC=6/body day1
			4週毎
			副作用: 脱毛、末梢神経障害、骨髓抑制、関節痛、筋肉痛、発疹
			食欲不振、恶心、肝機能障害、口内炎、脳神経麻痺、アナフィラキシー
			間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うつ血性心不全
			難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			急性腎不全、白質脳症、
肺癌(C34) 非小細胞肺癌	<i>AADC-0201</i>	<i>AVAPERL</i>	Pemetrexed 500mg/m ² day1 CDDP 75mg/m ² day1 ベバシズマブ 7.5mg/kg day1 3週毎4コース後 SDもしくはresponse(+)なら維持療法へ 維持療法 Pemetrexed 500mg/m ² day1 ベバシズマブ 7.5mg/kg day1 3週毎PDになるまで継続 副作用: 腎機能障害、発疹、骨髓抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃつくり 高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、喀血、肺出血、血栓塞栓症
肺癌(C34) 局所進行非小細胞肺癌	<i>AADC-0202</i>	<i>S-1+CDDP+RT</i>	CDDP 60mg/m ² day1 TS-1 1回40mg/m ² 1日2回 day1~14 4週毎2コース施行中に放射線治療施行 1回2Gy 週5日 30回照射 計60Gy(6週間) 上記化学放射線療法終了後2週間後から CDDP 60mg/m ² day1 TS-1 1回40mg/m ² 1日2回 day1~14 4週毎2コース施行 副作用: 骨髓抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
肺癌(C34) EGFR遺伝子変異陽性の手術不能または再発 非小細胞肺癌	<i>AADC-0204</i>	<i>Afatinib</i>	Afatinib 1日1回40mg経口投与 患者の状態により適宜増減 1日50mgまで 副作用: 下痢、発疹、爪周炎、口内炎、間質性肺炎、皮膚障害、肝機能障害 鼻出血、食欲減退、疲労、粘膜の炎症、体重減少、味覚異常 結膜炎、心障害
肺癌(C34) 小細胞肺癌	<i>AADC-0010</i>	<i>UFT(UFTE)</i>	用法・用量 1日量としてテガフル300~600mgを1日2~3回に分割投与 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髓抑制、肝機能障害
肺癌(C34) 小細胞肺癌	<i>AADC-0023</i>	<i>CBDCA+ETP療法(CE)</i>	VP-16 80mg/m ² day1~3 CBDCA 目標AUC=5/body day1 3~4週ごと ¹ 副作用: 骨髓抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振
肺癌(C34) 小細胞肺癌	<i>AADC-0024</i>	<i>CPT-11+ CDDP療法(IP)</i>	CDDP 60mg/m ² day1 CPT-11 60mg/m ² day1.8.15 4週ごと ¹ 副作用: 骨髓抑制、悪心・嘔吐、倦怠感、腎機能障害、下痢、間質性肺炎、食欲不振 末梢神経障害、脱毛、
肺癌(C34) 小細胞肺癌	<i>AADC-0025</i>	<i>CPT-11</i>	CPT-11 100mg/m ² day1.8.15 1週間隔で3回投与、2週休薬 副作用: 骨髓抑制、悪心・嘔吐、下痢、間質性肺炎
肺癌(C34) 小細胞肺癌	<i>AADC-0100</i>	<i>PE(CDDP+ETP)+IMRT療法</i>	CDDP 80mg/m ² day1 VP-16 100mg/m ² day1~3 3~4週ごと ¹ 4コース

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
肺癌(C34)	AADC-0137	AMR	副作用:	骨髓抑制、脱毛、恶心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振	
			AMR	35~40mg/m ²	3日間連続投与
			3週ごと	3~6コース	
肺癌(C34)	AADC-0145	GC療法	副作用:	骨髓抑制、食欲不振、恶心・嘔吐、脱毛、肝機能障害、発熱	
			GEM	1000mg/m ²	day1.8
			CDDP	80mg/m ²	day1
			3週毎	4~6コース	
肺癌(C34)	AADC-0176	Crizotinib	副作用:	悪心・嘔吐、骨髓抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱	
			クリゾチニブ	1回250mgを1日2回経口投与	
			副作用:	間質性肺疾患、肝機能障害、QT間隔延長、徐脈	
				血液障害、心不全、発疹、便秘、口内炎、悪心	
肺癌(C34)	AADC-0177	CDDP+VP-16		腎機能障害、倦怠感、筋肉痛、光線過敏性	
			CDDP	80mg/m ²	day1
			VP-16	100mg/m ²	day1~3
			副作用:	骨髓抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振	
肺癌(C34)	AADC-0210	Alectinib	アレクチニブ	1回300mg 1日2回経口投与	
			副作用:	間質性肺疾患、肝機能障害、骨髓抑制、消化管穿孔	
				血栓塞栓症、味覚異常、発疹、便秘、口内炎、悪心	
				腎機能障害、倦怠感、筋肉痛、光線過敏性	
肺癌(C34)	AADC-0211	Erlotinib+Bevacizumab併用療法	ベバシズマブ	15mg/kg	3週間毎
			エルロチニブ	100~150mg	1日1回経口投与
			副作用:	発疹、下痢、皮膚乾燥、搔痒感、肝機能障害、神経毒性、食欲減退	
				口内炎、嘔吐、高血圧、脱毛、関節痛、疲労、倦怠感、卵巢機能不全	
肺癌(C34)	AADC-0225	Nivolumab	重大な副作用:	ショック、アナフィラキシー、消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血	
				血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧クリーゼ、可逆性後白質脳症候群	
				ネフローゼ症候群、骨髓抑制、感染症、うつ血性心不全、間質性肺炎	
				血栓性微小血管症、	
肺癌(C34)	AADC-0231	Osimertinib	ニボルマブ	240mg/body	2週間隔
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
肺癌(C34)	AADC-0232	RAM+DTX	タグリッソ	1日1回80mg	
			副作用:	発疹、ざ瘡、下痢、皮膚乾燥、爪の障害、間質性肺炎、QT間隔延長	
				骨髓抑制、肝機能障害	
肺癌(C34)	AADC-0235	Pembrolizumab	RAM	10mg/kg	day1 3週ごと
			DTX	60mg/m ²	day1 3週ごと
			副作用:	腹痛、高血圧、下痢、動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害	
				インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血	
肺癌(C34)				骨髓抑制、低カリウム血症、低ナトリウム血症	
				脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
PD-L1陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌			副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症
PD-L1陽性の未治療非小細胞肺癌			甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、恶心・嘔吐
			口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害
			肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害
			膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
肺癌(C34)	AADC-0237	<i>Ceritinib</i>	セリチニブ 1日1回750mg空腹時に経口投与 副作用: 間質性肺炎、肝機能障害、QT間隔延長、徐脈、下痢 高血糖、眼障害、皮下組織障害、胃腸障害、疲労 腎及び尿路障害
肺癌(C34)	AADC-0241	<i>Atezolizumab</i>	アテゾリズマブ 1200mg day1 3週ごと 副作用: 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害
肺癌(C34)	AADC-0243	<i>Lorlatinib</i>	ロルラチニブ 1日1回100mgを経口投与 副作用: 間質性肺炎、肝機能障害、QT間隔延長、徐脈、下痢 膵炎、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症 末梢性ニューロパシー
肺癌(C34)	AADC-0245	<i>CBDCA+PEM+Pembrolizumab→PEM+Pembrolizumab</i>	Pemetrexed 500mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=5 day1 Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎4コース後 維持療法へ 維持療法 Pemetrexed 500mg/m ² day1 Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎 副作用: 肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、恶心、間質性肺炎、疲労感 下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
肺癌(C34)	AADC-0246	<i>CBDCA+nab-PTX+Pembrolizumab→Pembrolizumab</i>	アブラキサン 100mg/m ² day1, 8, 15 CBDCA 目標AUC=6/body day1 Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎4コース後 維持療法へ 維持療法 Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎 副作用: 脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹 食欲不振、恶心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー 間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うつ血性心不全 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 肺炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
肺癌(C34) 非扁平上皮非小細胞肺癌	AADC-0247	<i>CBDCA+PTX+Bevacizumab+Atezolizumab→Bevacizumab+Atezolizumab維持療法</i>	PTX 200mg/ m ² day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 ベバシズマブ 15mg/kg day1 アテゾリズマブ 1200mg/body day1 3週毎4-6コース後 維持療法へ 維持療法 ベバシズマブ 15mg/kg day1 アテゾリズマブ 1200mg/body day1 3週毎 副作用: 脱毛、骨髓抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、恶心・嘔吐 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、肺炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害
肺癌(C34) 小細胞肺癌	AADC-0254	<i>CBDCA+VP-16+Atezolizumab f/b Atezolizumab</i>	VP-16 100mg/ m ² day1～3 CBDCA 目標AUC=5 day1 アテゾリズマブ 1200mg/body day1 3週毎4コース後 維持療法へ 維持療法 アテゾリズマブ 1200mg/body day1 3週毎 副作用: 骨髓抑制、脱毛、恶心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、肺炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害
肺癌(C34) 進行性非扁平上皮非小細胞肺癌	AADC-0262	<i>CBDCA+PEM+Atezolizumab→PEM+Atezolizumab</i>	Pemetrexed 500mg/ m ² day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 Atezolizumab 1200mg/body day1 3週毎4-6コース後 維持療法へ 維持療法 Pemetrexed 500mg/ m ² day1 Atezolizumab 1200mg/body day1 3週毎 副作用: 肝機能障害、発疹、骨髓抑制、食欲不振、恶心、間質性肺炎、疲労感 下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 肺炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
肺癌(C34) HER2遺伝子変異陽性 非小細胞肺癌	AADC-0264	<i>Trastuzumab Deruxtecan</i>	Trastuzumab Deruxtec 5.4mg/kg day1 3週ごと 副作用: 間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション 骨髓抑制、脱毛、疲労、恶心・嘔吐、下痢、便秘、口内炎
肺癌(C34) 非小細胞肺癌	AADC-0268	<i>Pembrolizumab(6週間)</i>	ペムブロリズマブ 1回400mg 6週間隔 副作用: 骨髓抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
			甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、恶心・嘔吐	
			口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害	
			肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害	
			肺炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎	
肺癌(C34)	AADC-0270	CDDP+VP-16+Durvalumab→維持療法Durvalumab	VP-16 80-100mg/ m ²	day 1～3
小細胞肺癌			CDDP 75-80mg/ m ²	day 1
			Durvalumab 1500mg/body	day 1
			3週毎4コース後 維持療法へ	
			維持療法	
			Durvalumab 1500mg/body	day 1
			4週毎	
			副作用:	骨髓抑制、脱毛、恶心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振
				腎機能障害、疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢
				間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、肺炎、1型糖尿病
				甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎
				髄膜炎、神経障害
肺癌(C34)	AADC-0271	CBDCA+VP-16+Durvalumab→維持療法Durvalumab	VP-16 80-100mg/ m ²	day 1～3
小細胞肺癌			CBDCA 目標AUC=5-6	day 1
			Durvalumab 1500mg/body	day 1
			3週毎4コース後 維持療法へ	
			維持療法	
			Durvalumab 1500mg/body	day 1
			4週毎	
			副作用:	骨髓抑制、脱毛、恶心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振
				疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢
				間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、肺炎、1型糖尿病
				甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎
				髄膜炎、神経障害
肺癌(C34)	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ	480mg/body 4週間隔
切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
肺癌(C34)	AADC-0274	Ipilimumab+Nivolumab	Ipilimumab	1mg/kg 6週間隔
非小細胞肺癌			Nivolumab	360mg/body 3週間隔
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
				血球貪食症候群、結核
肺癌(C34)	AADC-0275	Nogitecan	Nogitecan	1mg/ m ² 5日間連続投与
小細胞肺癌			3週ごと	
			副作用:	骨髓抑制、消化管出血、間質性肺炎、血栓塞栓症
				恶心・嘔吐、食欲不振、脱毛、発熱、易疲労感
肺癌(C34)	AADC-0276	nab-PTX単剤	nab-PTX	100mg/ m ² day 1,8,15
非小細胞肺癌(前治療2レジメン以内)			副作用:	骨髓抑制、食欲不振、恶心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等			
			脱毛、末梢神経障害、発疹、下痢			
肺癌(C34) 非小細胞肺癌	<i>AADC-0279</i>	<i>Ipilimumab+Nivolumab+PEM+CDDP</i>	Ipilimumab Nivolumab Pemetrexed CDDP	1mg/kg 360mg/body 500mg/m ² 75mg/m ²	6週間隔 3週間隔 3週間隔 3週間隔	
			★CDDP+Pemetrexedは2コースで終了			
			★維持療法はNivolumab(±Pemetrexed)を3週毎+Ipilimumab6週毎			
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髓抑制、倦怠感、口内炎		
肺癌(C34) 非小細胞肺癌	<i>AADC-0280</i>	<i>Ipilimumab+Nivolumab+PEM+CBDDCA</i>	Ipilimumab Nivolumab Pemetrexed CBDDCA	1mg/kg 360mg/body 500mg/m ² 目標AUC=6	6週間隔 3週間隔 3週間隔 3週間隔	
			★CBDDCA+Pemetrexedは2コースで終了			
			★維持療法はNivolumab(±Pemetrexed)を3週毎+Ipilimumab6週毎			
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 発疹、骨髓抑制、悪心、下痢、味覚異常、便秘、しゃべり		
肺癌(C34) 非小細胞肺癌	<i>AADC-0281</i>	<i>Ipilimumab+Nivolumab+CBDDCA+PTX</i>	Ipilimumab Nivolumab PTX CBDDCA	1mg/kg 360mg/body 200mg/m ² 目標AUC=6	6週間隔 3週間隔 3週間隔 3週間隔	
			★CBDDCA+PTXは2コースで終了			
			★維持療法はNivolumabを3週毎+Ipilimumab6週毎			
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 脱毛、骨髓抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、悪心・嘔吐		
肺癌(C34) 扁平上皮癌	<i>AADC-0282</i>	<i>Nectatumumab+GEM+CDDP</i>	Nectatumumab GEM CDDP 3週毎	800mg 1250mg/m ² 75mg/m ²	day1.8 day1.8 day1	
			★CDDP+GEMは最大6コース			
			★維持療法はNectatumumab単剤でPDまで継続			
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髓抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪周炎、低マグネシウム血症、 搔痒感、インフュージョンリアクション、下痢		
肺癌(C34)	<i>AADC-0299</i>	<i>CBDDCA+PTX+Pembrolizumab</i>	CBDDCA PTX Pembrolizumab 3週毎4コース後	目標AUC=6/body 200mg/m ² 200mg/body	day1 day1 day1 維持療法へ	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			維持療法
			Pembrolizumab 200mg/body day1
			3週毎
			副作用: 脱毛、末梢神経障害、骨髓抑制、関節痛、筋肉痛、発疹 食欲不振、恶心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー 間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うつ血性心不全 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 肺炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
肺癌(C34) EGFR遺伝子変異陽性肺癌	<i>AADC-0304</i>	<i>Erlotinib+Ramucirumab</i>	ラムシルマブ 10mg/kg 2週間毎 エルロチニブ 150mg 1日1回 空腹時 連日経口投与 副作用: 高血圧、動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害 インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血 発疹、下痢、皮膚乾燥、搔痒感、間質性肺疾患、肝機能障害
肺癌(C34) EGFR遺伝子変異陽性肺癌	<i>AADC-0305</i>	<i>Gefitinib+Ramucirumab</i>	ラムシルマブ 10mg/kg 2週間毎 ゲフィチニブ 250mg 1日1回 連日経口投与 副作用: 高血圧、動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害 インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血 発疹、下痢、皮膚乾燥、搔痒感、間質性肺疾患、肝機能障害
肺癌(C34) BRAF遺伝子変異陽性肺癌	<i>AADC-0306</i>	<i>Dabrafenib+Trametinib</i>	ダブラフェニブ 1回150mg 1日2回 空腹時連日経口投与 トラメチニブ 1回2mg 1日1回 空腹時連日経口投与 副作用: 発熱、肝機能障害、眼障害、心障害 静脈血栓塞栓症、脳血管障害 有棘細胞癌、横紋筋融解症、間質性肺疾患
肺癌(C34) 局所進行非小細胞肺癌	<i>AADC-0307</i>	<i>CBDCA+PTX+RT</i>	PTX 40mg/ m ² day1 CBDCA 目標AUC=2 day1 毎週投与 計6回(放射線療法を行っている間) 副作用: 脱毛、骨髓抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、恶心・嘔吐、 肝機能障害
肺癌(C34) 非小細胞肺癌 非扁平上皮癌	<i>AADC-0315</i>	<i>Atezolizumab+nab-PTX+CBDCA→Atezolizumab</i>	アブラキサン 100mg/ m ² day1, 8, 15 CBDCA 目標AUC=6/body day1 Atezolizumab 1200mg/body day1 3週毎4コース後 維持療法へ 維持療法 Atezolizumab 1200mg/body day1 3週毎 副作用: 脱毛、末梢神経障害、骨髓抑制、関節痛、筋肉痛、発疹 食欲不振、恶心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー 間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うつ血性心不全 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 肺炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
肺癌(C34) ALK陽性肺癌	<i>AADC-0325</i>	<i>Brigatinib</i>	ブリグチニブ 1日1回90mgを7日間経口投与後、1日1回180mgを経口投与 (14日以上休薬した場合は90mgにて再開) 副作用: 間質性肺疾患、高血圧、徐脈、高血糖

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
			視覚障害、CK上昇、リパーゼorアミラーゼ上昇(膵炎) 下痢、悪心、肝機能障害、口内炎、発疹	
肺癌(C34) KRAS G12C変異陽性肺癌	<i>AADC-0328</i>	<i>Sotorasib</i>	ソトラシブ 副作用:	1日1回 960mg(8錠)を連日経口投与 食欲不振、悪心、嘔吐、下痢 肝機能障害、間質性肺疾患
肺癌(C34) ROS1融合遺伝子陽性肺癌	<i>AADC-0331</i>	<i>Entrectinib</i>	エヌトレクチニブ 副作用:	1日1回 600mg(3Cap)を連日経口投与 心臓障害、QT延長、認知障害・運動失調 間質性肺疾患、失神、成長発達遅延 味覚異常、浮動性めまい、末梢感覺ニューロパシー
肺癌(C34) 非小細胞肺癌	<i>AADC-0332</i>	<i>Tremelimumab+durvalumab+PEM+CBDCA</i>	Tremelimumab Durvalumab Pemetrexed CBDCA 3週毎 維持療法は4週毎にPemetrexed+Durvalumab ★維持療法の2回目のみ Pemetrexed+Durvalumab+Tremelimumab 副作用:	75mg/body day1 1500mg/body day1 500mg/m ² day1 目標AUC=6 day1 CBDCAは4コースで終了 ★維持療法の2回目のみ Pemetrexed+Durvalumab+Tremelimumab 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神經障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 発疹、骨髓抑制、悪心、下痢、味覚異常、便秘、しゃっくり
肺癌(C34) 非小細胞肺癌	<i>AADC-0333</i>	<i>Tremelimumab+durvalumab+nab-PTX+CBDCA</i>	Tremelimumab Durvalumab nab-PTX CBDCA 3週毎 維持療法は4週毎にDurvalumab ★維持療法の2回目のみ Durvalumab+Tremelimumab 副作用:	75mg/body day1 1500mg/body day1 100mg/m ² day1, 8, 15 目標AUC=6 day1 CBDCA+nab-PTXは4コースで終了 ★維持療法の2回目のみ Durvalumab+Tremelimumab 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神經障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 脱毛、骨髓抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神經障害、悪心・嘔吐
肺癌(C34) 術前 Stage IIIA(Stage IIでも症例によって考慮)	<i>AADC-0334</i>	<i>Nivolumab+PTX+CBDCA(術前のみ)</i>	Nivolumab CBDCA PTX 3週毎 最大3コース 副作用:	360mg/body day1 目標AUC=5 or 6 day1 175mg/m ² day1 脱毛、末梢神經障害、骨髓抑制、関節痛、筋肉痛、発疹 食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー 間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うつ血性心不全 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、 大腸炎、皮膚障害、神經障害、内分泌障害、1型糖尿病 膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
肺癌(C34) 肺腺癌術前 Stage IIIA(Stage IIでも症例によって考慮)	<i>AADC-0335</i>	<i>Nivolumab+CDDP+PEM(術前のみ)</i>	Nivolumab Pemetrexed 360mg/body day1 500mg/m ² day1	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
			CDDP	75mg/ m ²	day1
			3週毎 最大3コース		
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髓抑制、倦怠感、口内炎	
肺癌(C34) 切除可能非小細胞肺癌	<i>AADC-0338</i>	<i>Nivolumab+GEM+CDDP(術前のみ)</i>	Nivolumab	360mg/body	day1
			CDDP	75mg/ m ²	day1
			GEM	1000mg/ m ²	day1,day8
			3週毎 最大3コース		
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髓抑制、倦怠感、口内炎	
肺癌(C34) 切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における 根治的化学放射線療法後の維持療法 投与期間は12ヶ月まで	<i>AADC-0345</i>	<i>Durvalumab</i>	Durvalumab	1500mg/body	day1 体重30kg以下の場合は1回20mg/kg
			4週毎		
			副作用:	間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー	
肺癌(C34) METエクソン14スキッピング変異陽性 切除不能な進行・再発非小細胞性肺癌	<i>AADC-0350</i>	<i>Capmatinib</i>	カプマチニブ	1日2回 1回400mg	を連日経口投与
			副作用:	間質性肺疾患、体液貯留、肝機能障害、腎機能障害 悪心・嘔吐、下痢、リバーゼ増加、疲労 低リン酸血症、発疹、便秘、血中ビリルビン増加	
肺癌(C34) EGFR変異陽性肺癌	<i>AADC-0359</i>	<i>Osimertinib+PEM+CDDP</i>	Osimertinib	1日1回80mg	を連日経口投与
			CDDP	75mg/ m ²	day1
			Pemetrexed	500mg/ m ²	day1
			3週毎 CDDP併用は最大4コース		
			維持療法はPEM 500mg/m ² day1 3週毎 + Osimertinib 80mg 連日		
			副作用:	悪心・嘔吐、下痢、便秘、食欲不振、口内炎 皮疹、皮膚乾燥、浮腫 貧血、好中球減少、血小板減少	
肺癌(C34) 肺扁平上皮癌(周術期)	<i>AADC-0361</i>	<i>Pembrolizumab+GEM+CDDP</i>	Pembrolizumab	200mg/body	day1
			CDDP	75mg/ m ²	day1
			GEM	1000mg/ m ²	day1,day8
			(術前) 3週毎 最大4コース		
			Pembrolizumab	200 or 400mg/body	day1
			(術後) 200mg 3週毎 もしくは 400mg6週毎		
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髓抑制、倦怠感、口内炎	
肺癌(C34) 非扁平上皮非小細胞肺癌(周術期)	<i>AADC-0362</i>	<i>Pembrolizumab+PEM+CDDP</i>	Pembrolizumab	200mg/body	day1
			Pemetrexed	500mg/ m ²	day1

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			CDDP 75mg/ m ² day1 (術前) 3週毎 最大4コース Pembrolizumab 200 or 400mg/body day1 (術後) 200mg 3週毎 もしくは 400mg 6週毎 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髓抑制、倦怠感、口内炎
肺癌(C34) 白金製剤を含む化学療法後に増悪した小細胞肺癌	<i>AADC-0366</i>	<i>Tarlatamab</i>	Tarlatamab 1mg day1 10mg day8 10mg day15 以降 2週毎 副作用: サイトカイン放出症候群(CRS) 免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群(ICANS)を含む神経学的事象 骨髓抑制、間質性肺疾患、食欲不振、味覚異常
肺癌(C34) 限局型小細胞肺癌における 根治的化学放射線療法後の維持療法 投与期間は24ヶ月まで	<i>AADC-0368</i>	<i>Durvalumab</i>	Durvalumab 1500mg/body day1 体重30kg以下の場合は1回20mg/kg 4週毎 副作用: 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー
肺癌(C34) EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	<i>AADC-0369</i>	<i>Amivantamab+CBDCA+PEM</i>	Amivantamab 80kg未満 80kg以上 350mg/body 350mg/body day1 1050mg/body 1400mg/body day2 1400mg/body 1750mg/body day8、day15 1400mg/body 1750mg/body day1 (2サイクル目) 1750mg/body 2100mg/body day1 (3サイクル目以降) CBDCA 目標AUC=5 day1 Pemetrexed 500mg/ m ² day1 3週毎 CBDCAは4コースで終了 副作用: ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪団炎、低マグネシウム血症、体液貯留 搔痒感、インフュージョンリアクション、下痢、静脈血栓塞栓症 肝機能障害、発疹、骨髓抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり
胸腺腫(C37)	<i>AADC-0308</i>	<i>ADOC</i>	DXR 40mg/ m ² day1 CDDP 50mg/ m ² day1 VCR 0.6mg/ m ² (最大2mg/body) day3 CPA 700mg/ m ² day4 3週毎 副作用: 骨髓抑制、心毒性、末梢神経障害、肝障害、悪心・嘔吐、脱毛 腎障害、出血性膀胱炎
胸腺癌(C37) 進行胸腺癌2次治療以降	<i>AADC-0222</i>	<i>Lenvatinib</i>	用法・用量 1回24mg 1日1回 副作用: 高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労 口内炎、蛋白尿、手掌・足底発赤知覚不全症候群、出 動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔 可逆性後白質脳症症候群、心障害、骨髓抑制、創傷治癒遅延 低カルシウム血症

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
悪性胸膜中皮腫(C38)	AADC-0114	Pemetrexed+ CDDP療法	Pemetrexed CDDP 3週毎	500mg/m ² day1 75mg/m ² day1	副作用: 悪心・嘔吐、骨髓抑制、食欲不振、倦怠感、口内炎、神経障害
悪性胸膜中皮腫(C38)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ	240mg/body 2週間隔	副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
悪性胸膜中皮腫(C38)	AADC-0274	Ipilimumab+Nivolumab	Ipilimumab Nivolumab	1mg/kg 360mg/body 3週間隔	副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核
悪性胸膜中皮腫(C38)	AADC-0349	CBDCA+Pemetrexed	Pemetrexed CBDCA 3週毎	500mg/m ² day1 目標AUC=5 day1 4-6コース	副作用: 肝機能障害、発疹、骨髓抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり
骨髓腫(C42)	AADC-0161	Bortezomib	ボルテゾミブ	1.3mg/m ² 1日1回 day1.4.8.11 3週毎	副作用: 肺障害、心障害、末梢性ニューロパシー、イレウス 骨髓抑制、低血圧、腫瘍崩壊症候群、皮膚粘膜眼症候群 中毒性表皮壊死症、発熱、可逆性後白質脳症症候群 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、肝機能障害
骨髓腫(C42)	AADC-0165	Bortezomib+Dexamethasone	ボルテゾミブ デキサメタゾン 3週毎	1.3mg/m ² 1日1回 day1.4.8.11 20mg 1日1回 day1.2.4.5.8.9.11.12	副作用: 肺障害、心障害、末梢性ニューロパシー、イレウス 骨髓抑制、低血圧、腫瘍崩壊症候群、皮膚粘膜眼症候群 中毒性表皮壊死症、発熱、可逆性後白質脳症症候群 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、肝機能障害、血管浮腫 不眠症、無力症、疲労、錯覚症、筋痙攣、高血糖 誘発感染症、続発性副腎皮質機能不全、消化性潰瘍 骨粗鬆症、霧視、紅斑、味覚異常、血栓塞栓症、線内障、
骨髓腫(C42)	AADC-0218	DRC療法	デキサメタゾン リツキシマブ シクロホスファミド 3週毎6ヶ月間	20mg点滴 day1 375mg/m ² 点滴 day1 200mg/m ² 経口 day1~5	副作用: アナフィラキシー様症状、腫瘍崩壊症候群、肝機能障害、 皮膚粘膜症状、皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死融解症 骨髓抑制、間質性肺炎、心障害、消化管穿孔、イレウス、SIADH 横紋筋融解症、悪心・嘔吐、脱毛、色素沈着、食欲不振 口内炎、不眠、高血糖

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
悪性黒色腫(C43)	<i>AADC-0225</i>	<i>Nivolumab</i>	ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
悪性黒色腫(C43)	<i>AADC-0272</i>	<i>4週毎 Nivolumab</i>	ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
悪性軟部腫瘍(C49)	<i>AADC-0199</i>	<i>Pazopanib</i>	パゾパニブ 1日1回800mg 経口投与 副作用: 下痢、疲労、悪心、高血圧、毛髪変色、食欲減退、体重減少、味覚異常 肝機能障害、心機能障害、動脈血栓性事象、静脈血栓性事象、出血 甲状腺機能障害、ネフローゼ症候群、蛋白尿、感染症、創傷治癒遅延
悪性軟部腫瘍(C49)	<i>AADC-0265</i>	<i>doxorubicin</i>	doxorubicin 75mg/m ² day1 3週毎 total 6回施行(心毒性に対する用量制限) 副作用: 悪心・嘔吐、白血球減少、食欲不振、脱毛、肝機能異常、下痢・軟便 全身倦怠感、口内炎
乳癌(C50) 内分泌療法 閉経前	<i>AADC-0027</i>	<i>Tamoxifen</i>	TAM 1日1回20mg 副作用: 無月経、月経異常、悪心・嘔吐、食欲不振
乳癌(C50) 内分泌療法 閉経前	<i>AADC-0069</i>	<i>Zoladex</i>	ゴセレリン 4週に1回3.6mgを皮下投与 副作用: 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下
乳癌(C50) 内分泌療法 閉経前	<i>AADC-0070</i>	<i>Zoladex LA</i>	ゴセレリン 10.8mgを前腹部に12~13週毎に1回投与 副作用: 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下
乳癌(C50) 内分泌療法 閉経前	<i>AADC-0094</i>	<i>Leuprorelin</i>	リュープロレリン 4週に1回3.75mgを皮下投与 12週に1回11.25mgを皮下投与へ切り替え使用あり 副作用: 間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、肝機能障害、黄疸、うつ状態 熱感、ほてり、のぼせ、頭痛・頭重、発汗、寝汗、注射部位障害 悪心・嘔吐、体重増加
乳癌(C50) 内分泌療法 閉経前	<i>AADC-0095</i>	<i>Leuprorelin + TAM療法</i>	リュープロレリン 4週に1回3.75mgを皮下投与 12週に1回11.25mgを皮下投与へ切り替え使用あり TAM 1日1回20mg 副作用: 間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、肝機能障害、黄疸、うつ状態 熱感、ほてり、のぼせ、頭痛・頭重、発汗、寝汗、注射部位障害 悪心・嘔吐、体重増加、無月経、月経異常
乳癌(C50) 内分泌療法 閉経前	<i>AADC-0096</i>	<i>Leuprorelin + Femara療法</i>	リュープロレリン 4週に1回3.75mgを皮下投与 12週に1回11.25mgを皮下投与へ切り替え使用あり レトロゾール 1日1回2.5mg 副作用: 間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、肝機能障害、黄疸、うつ状態 熱感、ほてり、のぼせ、頭痛・頭重、発汗、寝汗、注射部位障害 悪心・嘔吐、体重増加、関節痛、発疹、搔痒感、血栓症、塞栓症
乳癌(C50) 内分泌療法 閉経前	<i>AADC-0097</i>	<i>Femara</i>	レトロゾール 1日1回2.5mg 副作用: ほてり、頭痛、関節痛、悪心、発疹、搔痒感、肝機能障害 塞栓症、血栓症

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
乳癌(C50) 内分泌療法 閉経後	AADC-0030	<i>Arimidex</i>	アナストロゾール 1日1回 1mg 副作用: ほてり、嘔気、脱毛、性器出血
乳癌(C50) 内分泌療法 閉経後	AADC-0031	<i>Aromasin</i>	エキセメスタン 1日1回 25mg 副作用: ほてり、多汗、高血圧、めまい、恶心、疲労
乳癌(C50) 内分泌療法 閉経後	AADC-0032	<i>Fareston</i>	トレミフェン 1日1回40mg 副作用: 肝機能障害、白血球減少
乳癌(C50) 内分泌療法 閉経後	AADC-0033	<i>high dose Fareston</i>	トレミフェン 1日1回120mg 副作用: 肝機能障害、白血球減少
乳癌(C50) 内分泌療法 閉経後	AADC-0034	<i>Hysron-H</i>	MPA 1日600から1200mg 分3 副作用: 体重増加、満月様顔貌、子宮出血、浮腫、血栓症、月経異常
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0001	<i>S-1(CG)</i>	用法 a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的) 用量 朝食後および夕食後の1日2回 体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回 1.25から1.5m ² 未満 50 mg/回 1.5m ² 以上 60mg/回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、恶心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0010	<i>UFT(UFTE)</i>	用法・用量 1日量としてテガフル300-600mgを1日2-3回に分割投与 副作用: 食欲不振、恶心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0035	<i>Xeloda</i>	カペシタビン 1日2回 3週連続投与 1週休薬 体表面積 1.31m ² 未満 900mg/回 1.31から1.64m ² 未満 1200mg/回 1.64m ² 以上 1500mg/回 副作用: 手足症候群、骨髄抑制
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0036	<i>weekly PTX</i>	PTX 100mg/m ² 6週投与2週休薬 副作用: 脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛、関節痛 恶心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0038	<i>tri-weekly DTX</i>	DTX 60～75mg/m ² day1 3週毎 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、恶心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0040	<i>FEC100療法</i>	5-FU 500mg/m ² day1 EPI 100mg/m ² day1 CPA 500mg/m ² day1 3週毎 副作用: 悪心・嘔吐、白血球減少、食欲不振、脱毛、肝機能異常、下痢・軟便 全身倦怠感、口内炎
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0042	<i>weekly Trastuzumab</i>	トラスツズマブ 初回 4mg/kg 2回目以降 2mg/kg 毎週投与 副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制
乳癌(C50) 化学療法	AADC-0043	<i>bi weekly Trastuzumab</i>	トラスツズマブ 4mg/kg day1

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等			
			2週毎			
			副作用:	発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制		
乳癌(C50)	AADC-0044	<i>bi weekly PTX + Trastuzumab</i> 療法				
化学療法			PTX	80mg/m ²	day1	
			トラスツズマブ [®]	4mg/kg	day1	
			2週毎			
			副作用:	脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛		
			関節痛、悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常、発熱、悪寒			
乳癌(C50)	AADC-0045	<i>VNR</i>				
化学療法			VNR	25mg/m ²	1週間間隔で2回投与	1週休薬
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、嘔気・嘔吐、静脈炎、発熱、口内炎		
			電解質異常			
乳癌(C50)	AADC-0046	<i>VNR + Trastuzumab</i> 療法				
化学療法			VNR	25mg/m ²	day1	2回投与1週休薬
			トラスツズマブ [®]	2mg/kg	day1	毎週投与 (初回は4mg/kg)
			3週毎			
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、嘔気・嘔吐、静脈炎、発熱、口内炎		
			電解質異常、悪寒			
乳癌(C50)	AADC-0087	<i>tri-weekly Trastuzumab</i>				
化学療法			トラスツズマブ [®]	初回8mg/kg	day1	
				2回目以降	6mg/kg	day1
			3週毎			
			副作用:	発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制		
乳癌(C50)	AADC-0088	<i>weekly trastuzumab + PTX</i> 療法				
化学療法			PTX	80mg/m ²	day1	
			トラスツズマブ [®]	2mg/kg	day1	
			毎週投与			
			副作用:	脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛		
			関節痛、悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常、発熱、悪寒			
乳癌(C50)	AADC-0129	<i>Tykerb + Xeloda</i> 療法				
化学療法			タイケルブ [®]	1回1250mg	1日1回	連日投与
			カペシタビン	1回1000mg/m ²	1日2回	2週連続投与 1週休薬
			副作用:	手足症候群、骨髄抑制、下痢、口内炎、倦怠感、嘔気・嘔吐		
乳癌(C50)	AADC-0130	<i>DTX+Cyclophosphamide</i> 療法				
化学療法			DTX	60～75mg/m ²	day1	
			CPA	500～600mg/m ²	day1	
			3週毎			
			副作用:	脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制		
			肝機能障害、腎機能障害			
乳癌(C50)	AADC-0131	<i>DTX +Xeloda</i> 療法				
化学療法			DTX	60～75mg/m ²	day1	3週毎
			カペシタビン	1回1250mg/m ²	1日2回	2週連続投与 1週休薬
			副作用:	脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制		
			肝機能障害、腎機能障害、手足症候群			
乳癌(C50)	AADC-0132	<i>DTX+tri-weekly Trastuzumab</i> 療法				
化学療法			DTX	60～75mg/m ²	day1	3週毎
			トラスツズマブ [®]	初回8mg/kg	2回目以降	6mg/kg day1 3週毎
			副作用:	脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制		
			肝機能障害、腎機能障害			
乳癌(C50)	AADC-0144	<i>XELODA + Trastuzumab</i> 療法				
化学療法			カペシタビン	1回1250mg/m ²	1日2回	2週連続投与 1週休薬
			トラスツズマブ [®]	6mg/kg	day1	3週毎
			副作用:	発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制、手足症候群		

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
乳癌(C50) トリプルネガティブ	AADC-0149	Bevacizumab based TC療法	PTX 200mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 ベバシズマブ 15mg/kg day1 3週ごと CBDCA+PTX+ベバシズマブを3週間間隔で4~6サイクル実施後、アバスチン単独を 3週間間隔で投与する 副作用: 脱毛、骨髓抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、恶心・嘔吐、 肝機能障害、高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、咯血、肺出血、血栓塞栓症
乳癌(C50) 進行・再発乳癌 化学療法	AADC-0150	tri-weekly Abraxane	アブラキサン 1回 260mg/m ² 3週毎 副作用: 脱毛、疲労、筋痛、末梢神経障害、骨髓抑制、下痢、恶心嘔吐
乳癌(C50) アントラサイクリン及びタキサンを含む抗がん剤治療後 再発・転移乳癌 化学療法	AADC-0166	Eribulin	ハラヴェン 1.4mg/m ² day1, 8 3週ごと 副作用: 骨髓抑制、脱毛、疲労、食欲減退、発熱、便秘、下痢、嘔吐 口内炎、味覚異常、末梢神経障害、肝機能障害、間質性肺炎
乳癌(C50) 内分泌療法 閉経後	AADC-0167	Fulvestrant	フルベストラント 1回2箇(1箇250mg) 左右の臀部に1箇ずつ筋肉内投与 初回、2週後、4週後、その後4週ごとに1回 副作用: 注射部位疼痛、注射部位硬結、ほてり、注射部位搔痒感 肝機能障害、血栓塞栓症、恶心、便秘、卵巣腫大、頭痛 感覺異常、不眠症、背部痛、筋肉痛、高TG血症、高コレステロール血症
乳癌(C50)	AADC-0172	CMF(経口法)	MTX 40mg/m ² day1, 8 5-FU 600mg/m ² day1, 8 CPA 1回50mg 1日2回 day1~15 4週ごと 副作用: 嘔気・嘔吐、食欲不振、脱毛、肝機能障害、口内炎、骨髓抑制
乳癌(C50)	AADC-0173	CMF(静注法)	MTX 40mg/m ² day1 5-FU 600mg/m ² day1 CPA 600mg/m ² day1 3週ごと 副作用: 嘔気・嘔吐、食欲不振、脱毛、肝機能障害、口内炎、骨髓抑制
乳癌(C50)	AADC-0174	Bevacizumab + PTX療法	PTX 90mg/m ² day1,8,15 ベバシズマブ 10mg/kg day1,15 4週ごと 副作用: 嘔気・嘔吐、食欲不振、脱毛、肝機能障害、口内炎、骨髓抑制 末梢神経障害、関節痛、筋肉痛、下痢、高血圧、蛋白尿 出血、消化管穿孔、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クリーゼ 可逆性後白質脳症症候群、創傷治癒遅延、味覚異常、爪の障害
乳癌(C50) 手術不能又は再発乳癌	AADC-0190	Gemcitabine	GEM 1250mg/m ² day1,8 3週ごと 副作用: 骨髓抑制、食欲不振、恶心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感 間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、心筋梗塞、うつ血性心不全 肺水腫、気管支痙攣、ARDS、腎不全、溶血性尿毒症症候群
乳癌(C50) 進行・再発乳癌 補助化学療法	AADC-0195	THP療法	用法・用量 1クール目 Pertuzumab 840mg/body day1 Trastuzumab 8mg/kg day1 DTX 75mg/m ² day1

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
			2クール目		
			Pertuzumab 420mg/body	day1	
			Trastuzumab 6mg/kg	day1	
			DTX 75mg/m ²	day1	
			1クール=3週間		
			DTX を6サイクルまで投与し、7サイクル以降が主治医の判断で継続		
			副作用	下痢、脱毛、爪の異常、倦怠感、嘔気・嘔吐、しづれ、発疹、骨髄抑制	
				インフュージョンリアクション、うつ血性心不全	
乳癌(C50)	AADC-0203	<i>Everolimus</i>	Everolimus	1日1回10mgを経口投与 (ホルモン療法併用)	
			副作用:	口内炎、発疹、疲労、食欲減退、下痢、味覚異常、恶心	
				感染症、体重減少、貧血、鼻出血、高血糖、血小板減少	
				搔痒症	
乳癌(C50)	AADC-0207	<i>P/T+Eribulin</i>	Pertuzumab	初回840mg/body	2回目以降420mg/body
			Trastuzumab	初回8mg/kg	2回目以降6mg/kg
			Eribulin	1.4mg/m ²	day1、day8
			3週ごと		
			副作用:	インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、脱毛、倦怠感	
				骨髄抑制、恶心、爪の異常、ニューロパチー、発疹、間質性肺炎	
				流涙増加、肝機能障害、アナフィラキシー、浮腫、疼痛	
乳癌(C50)	AADC-0209	<i>T-DM1(手術不能または再発乳癌)</i>	T-DM1	3.6mg/kg	day1
			3週ごと		
			副作用:	倦怠感、鼻出血、恶心、発熱、食欲減退、骨髄抑制、肝機能障害	
				間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション	
				末梢神経障害	
乳癌(C50)	AADC-0217	<i>EC療法</i>	EPI	100mg/m ²	day1
			CPA	600mg/m ²	day1
			3週毎		
			副作用:	骨髄抑制、恶心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎	
				出血性膀胱炎、下痢、口内炎、アナフィラキシー、排尿障害	
				イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、	
乳癌(C50)	AADC-0221	<i>AC療法</i>	ADM	60mg/m ²	day1
			CPA	600mg/m ²	day1
			3週毎		
			副作用:	骨髄抑制、恶心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎	
				口内炎、心電図異常、出血性膀胱炎、下痢、肝機能障害	
				イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、急性腎不全	
				アナフィラキシー、排尿障害	
乳癌(C50)	AADC-0226	<i>Leuprorerin Pro</i>	Leuprorerin Pro	22.5mg	24週毎皮下注射
			副作用:	注射部位硬結、注射部位紅斑、注射部位疼痛、糖尿病、ほてり	
				間質性肺炎、アナフィラキシー、肝機能障害、血栓塞栓症	
乳癌(C50)	AADC-0234	<i>TC+tri weekly Trastuzumab</i>	DTX	75mg/m ²	day1
化学療法			CPA	600mg/m ²	day1
			トラスツズマブ	初回8mg/kg	2回目以降 6mg/kg
			3週毎		
			副作用:	脱毛、食欲不振、全身倦怠感、恶心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制	
				肝機能障害、腎機能障害	

がん治療薬剤承認レジメン一覧

2025/8/13

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
乳癌(C50)	AADC-0238	<i>Palbociclib + Letrozole</i>	パルボシクリブ レトロゾール 4週毎	1日1回125mg 1日1回2.5mg	3週連続投与1週休薬 連続投与
			副作用:	ほてり、頭痛、関節痛、悪心、発疹、搔痒感、肝機能障害 塞栓症、血栓症 骨髄抑制、脱毛、疲労、感染症、口内炎、下痢、間質性肺炎	
乳癌(C50)	AADC-0239	<i>Palbociclib + fulvestrant</i>	パルボシクリブ フルベストラント	1日1回125mg 1回2箇(1箇250mg) 左右の臀部に1箇ずつ筋肉内投与 day1,day15 その後はサイクル1の1日目から換算して18日(±7日)毎	3週連続投与1週休薬 注射部位疼痛、注射部位硬結、ほてり、注射部位搔痒感 肝機能障害、血栓塞栓症、悪心、便秘、卵巣腫大、頭痛 感覺異常、不眠症、背部痛、筋肉痛、高TG血症、高コレステロール血症 骨髄抑制、脱毛、疲労、感染症、口内炎、下痢、間質性肺炎
乳癌(C50)	AADC-0244	<i>Abemaciclib</i>	アベマシクリブ	1回150mgを1日2回経口投与(フルベストラントorレトロゾールorアナストロゾールと併用)	
			副作用:	肝機能障害、骨髄抑制、下痢、間質性肺炎 静脈血栓塞栓症、感染症、悪心、嘔吐 疲労、脱毛症 血清クレアチニン上昇	
乳癌(C50)	AADC-0248	<i>Olaparib</i>	オラバリブ	1回300mgを1日2回経口投与	
			副作用:	悪心、嘔吐、味覚異常 貧血、好中球減少、血小板減少、リンパ球減少 疲労、無力症、間質性肺炎 下痢、頭痛	
乳癌(C50)	AADC-0249	<i>nab-PTX+trasutuzumab</i>	nab-PTX トラスツズマブ	1回 260mg/m ² 初回8mg/kg day1 2回目以降 6mg/kg day1 3週毎	3週毎
			副作用:	発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制 脱毛、筋痛、末梢神経障害、下痢	
乳癌(C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行	AADC-0255	<i>nab-PTX+Atezolizumab</i>	Atezolizumab nab-PTX	840mg/回点滴静注 day1, day15 100mg/m ² 点滴静注 day1, day8, day15 その後13日間休薬 28日で1コース	
			副作用:	発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制 脱毛、筋痛、末梢神経障害、下痢 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害	
乳癌(C50)	AADC-0258	<i>DD-EC</i>	EPI CPA ペグフィルグラスチム	90mg/m ² day1 600mg/m ² day1 3.6mg day2 2週毎	
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎 出血性膀胱炎、下痢、口内炎、アナフィラキシー、排尿障害 イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、	
乳癌(C50)	AADC-0263	<i>DD-PTX</i>	PTX	175mg/m ² day1	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
			ペグフィルグラストム	3.6mg	day2
			2週毎		
			副作用:	脱毛、疲労、筋痛、末梢神経障害、骨髓抑制、下痢、恶心嘔吐	
乳癌(C50) 化学療法歴のあるHER2陽性乳癌	<i>AADC-0264</i>	<i>Trastuzumab Deruxtecan</i>	Trastuzumab Deruxtec	5.4mg/kg	day1
			3週ごと		
			副作用:	間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション 骨髓抑制、脱毛、疲労、恶心・嘔吐、下痢、便秘、口内炎	
乳癌(C50)	<i>AADC-0269</i>	<i>T-DM1(術後)</i>	T-DM1	3.6mg/kg	day1
			3週ごと (投与回数は14回まで)		
			副作用:	倦怠感、鼻出血、恶心、発熱、食欲減退、骨髓抑制、肝機能障害 間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション	
				末梢神経障害	
乳癌(C50)	<i>AADC-0286</i>	<i>CBDCA+GEM</i>	GEM	1000mg/m ²	day1.8
			CBDCA	AUC2	day1.8
			3週毎		
			副作用:	恶心・嘔吐、骨髓抑制、食欲不振、口内炎、発熱、皮疹	
乳癌(C50)	<i>AADC-0287</i>	<i>Pembrolizumab+ CBDCA+GEM</i>	Pembrolizumab	200mg/body	day1
			GEM	1000mg/m ²	day1.8
			CBDCA	AUC2	day1.8
			3週毎		
			副作用:	恶心・嘔吐、骨髓抑制、食欲不振、口内炎、発熱、皮疹 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、脾炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害	
乳癌(C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行	<i>AADC-0288</i>	<i>Pembrolizumab+ CBDCA+GEM</i>	Pembrolizumab	200mg/body	day1
			GEM	1000mg/m ²	day1.8 day22.29
			CBDCA	AUC2	day1.8 day22.29
			6週毎		
			副作用:	AADC-0287と同様	
乳癌(C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行	<i>AADC-0289</i>	<i>Pembrolizumab+ nab-PTX</i>	Pembrolizumab	200mg/body	day1 3週毎
			nab-PTX	100mg/m ² 点滴静注	day1,8,15 4週毎
			副作用:	発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髓抑制 脱毛、筋痛、末梢神経障害、下痢 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、脾炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害	
乳癌(C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行	<i>AADC-0290</i>	<i>Pembrolizumab+ nab-PTX</i>	Pembrolizumab	200mg/body	day1 6週毎
			nab-PTX	100mg/m ² 点滴静注	day1,8,15 4週毎
			副作用:	AADC-0289と同様	
乳癌(C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行	<i>AADC-0291</i>	<i>Pembrolizumab+PTX 3週</i>	Pembrolizumab	200mg/body	day1 3週毎
			PTX	90mg/m ² 点滴静注	day1,8,15 4週毎
			副作用:	脱毛、骨髓抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛、関節痛 恶心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等			
			間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病			
			甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎			
			髄膜炎、神經障害			
乳癌(C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行	<i>AADC-0292</i>	<i>Pembrolizumab+PTX 6週</i>	Pembrolizumab PTX 副作用:	200mg/body 90mg/ m ² 点滴静注 AADC-0291と同様	day1 day1,8,15	6週毎 4週毎
乳癌(C50) トリプルネガティブ進行乳癌 術前	<i>AADC-0311</i>	<i>Pembrolizumab+CBDCA+PTX</i>	Pembrolizumab CBDCA PTX 副作用:	200mg/body 目標AUC=5/1 80mg/ m ² 3週毎 術前4コース	day1 day1 day1,8,15	
				脱毛、末梢神經障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹 食欲不振、恶心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー 間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うつ血性心不全 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、 大腸炎、皮膚障害、神經障害、内分泌障害、1型糖尿病 膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎		
乳癌(C50) トリプルネガティブ進行乳癌 術前	<i>AADC-0312</i>	<i>Pembrolizumab+EC</i>	Pembrolizumab EPI CPA 副作用:	200mg/body 90mg/ m ² 600mg/ m ² 3週毎 術前4コース	day1 day1 day1	
				骨髄抑制、恶心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎 出血性膀胱炎、下痢、口内炎、アナフィラキシー、排尿障害 イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、 大腸炎、皮膚障害、神經障害、内分泌障害、1型糖尿病 膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎		
乳癌(C50) トリプルネガティブ進行乳癌 術後 9回まで	<i>AADC-0313</i>	<i>Pembrolizumab 200mg 3週毎</i>	ペムブロリズマブ 副作用:	1回200mg 3週毎 術後9コースまで	day1	
				骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、恶心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神經障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎		
乳癌(C50) トリプルネガティブ進行乳癌 術後 5回まで	<i>AADC-0314</i>	<i>Pembrolizumab 400mg 6週毎</i>	ペムブロリズマブ 副作用:	1回400mg 6週毎 術後5コースまで	day1	
				AADC-0313と同様		
乳癌(C50) HER2陽性乳癌	<i>AADC-0326</i>	<i>PT+PTX</i>	用法・用量 Pertuzumab Trastuzumab PTX 2クール目以降 Pertuzumab Trastuzumab PTX 1クール=3週間	1クール目 840mg/body 8mg/kg 80mg/ m ² day1 420mg/body 6mg/kg 80mg/ m ² day1, 8, 15 day1 day1 day1, 8, 15	day1 day1 day1, 8, 15 day1 day1 day1, 8, 15	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			副作用 下痢、脱毛、倦怠感、しびれ、骨髓抑制 インフュージョンリアクション、うつ血性心不全
乳癌(C50) HER2陽性乳癌	AADC-0339	P/T+nab-PTX	用法・用量 1クール目 Pertuzumab 840mg/body day1 Trastuzumab 8mg/kg day1 nab-PTX 260mg/m ² day1 2クール目以降 Pertuzumab 420mg/body day1 Trastuzumab 6mg/kg day1 nab-PTX 260mg/m ² day1 1クール=3週間 副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髓抑制 脱毛、筋痛、末梢神経障害、下痢 インフュージョンリアクション、うつ血性心不全
乳癌(C50) HER2陽性乳癌	AADC-0340	PHESGO+DTX	ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として 初回(IN) それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1 2回目以降(MA) それぞれ 600mg、600mg、20000U day1 初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与 DTX 75mg/m ² day1 3週ごと ¹ 副作用: インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感 間質性肺炎、悪心、口内炎 脱毛、筋痛、末梢神経障害、爪の異常
乳癌(C50) HER2陽性乳癌	AADC-0341	PHESGO+Eribulin	ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として 初回(IN) それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1 2回目以降(MA) それぞれ 600mg、600mg、20000U day1 初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与 Eribulin 1.4mg/m ² day1、8 3週ごと ¹ 副作用: インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感 間質性肺炎、悪心、口内炎、末梢神経障害
乳癌(C50) HER2陽性乳癌	AADC-0342	PHESGO+PTX	ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として 初回(IN) それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1 2回目以降(MA) それぞれ 600mg、600mg、20000U day1 初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与 PTX 80mg/m ² day1、8、15 3週ごと ¹ 副作用: インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感 間質性肺炎、悪心、口内炎 脱毛、筋痛、末梢神経障害
乳癌(C50) HER2陽性乳癌	AADC-0343	PHESGO+nab-PTX	ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として 初回(IN) それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1 2回目以降(MA) それぞれ 600mg、600mg、20000U day1 初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与 nab-PTX 260mg/m ² day1 3週ごと ¹ 副作用: インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感 間質性肺炎、悪心、口内炎 脱毛、筋痛、末梢神経障害

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
乳癌(C50) HER2陽性乳癌 術前・術後の場合は投与期間は12ヶ月まで	AADC-0344	<i>PHESGO</i>	ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として 初回(IN) それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1 2回目以降(MA) それぞれ 600mg、600mg、20000U day1 初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与 3週ごと		
			副作用: インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感 間質性肺炎、悪心、口内炎		
乳癌(C50)	AADC-0351	<i>Capivasertib</i>	カピバセルチブ 副作用: 高血糖、下痢、皮膚障害 悪心・嘔吐、口内炎、発疹、疲労 味覚不全、腎機能障害	1回400mgを1日2回 経口投与 4日間服用3日間休薬	
乳癌(C50) BRCA遺伝子変異陽性かつHER2陰性乳癌	AADC-0358	<i>Talazoparib</i>	タラゾパリブ 副作用: 骨髄抑制、間質性肺疾患、血栓塞栓症、二次性悪性腫瘍 口内炎、倦怠感、悪心、脱毛 下痢、頭痛	1回1mgを1日1回 経口投与	
乳癌(C50) 化学療法歴のあるホルモン受容体陰性かつHER2陰性乳癌	AADC-0363	<i>Sacituzumab Govitecan</i>	サシツズマブ ゴビテカ 3週ごと	10mg/kg day1、8 副作用: 骨髄抑制、下痢・腸炎、悪心・嘔吐、インフュージョンリアクション 間質性肺疾患、肝機能障害、脱毛、倦怠感	
乳癌(C50) 化学療法歴のあるホルモン受容体陽性かつHER2陰性乳癌	AADC-0365	<i>Datopotamab Deruxtecan</i>	Datopotamab Deruxtecan 3週ごと	6mg/kg day1 副作用: 間質性肺疾患、角膜障害、口内炎、過敏症、インフュージョンリアクション 骨髄抑制、脱毛、疲労、悪心・嘔吐、下痢、便秘	
子宮頸癌(C53)	AADC-0082	NDP+CPT-II療法	CPT-11 ネダプラチン 3週毎	60mg/m ² day1、8 100mg/m ² day1 副作用: 下痢、悪心・嘔吐、骨髄抑制、腎機能障害、肝機能障害	
子宮体癌(C54)	AADC-0019	PTX + CBDCA療法(TC)	PTX CBDCA 3~4週ごと	180mg/m ² day1 目標AUC=5 day1 副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振 悪心・嘔吐、肝機能障害	
子宮体癌(C54)	AADC-0080	DTX+CBDCA療法(DC)	DTX CBDCA 副作用:	60~75mg/m ² day1 目標AUC=5 day1 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害	
子宮体癌(C54)	AADC-0081	CPA+ADM+CDDP療法(CAP)	CPA DXR CDDP 4週ごと	500mg/m ² day1 50mg/m ² day1 50mg/m ² day1 副作用: 脱毛、骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、口内炎、全身倦怠感	
卵巣癌(C56)	AADC-0019	PTX + CBDCA療法(TC)	PTX CBDCA 副作用:	180mg/m ² day1 目標AUC=5 day1 脱毛、骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、口内炎、全身倦怠感	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			3～4週ごと
			副作用: 脱毛、骨髓抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振
			悪心・嘔吐、肝機能障害
卵巣癌(C56)	AADC-0080	DTX+CBDCA療法(DC)	DTX 60～75mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=5 day1 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髓抑制 肝機能障害
卵巣癌(C56)	AADC-0081	CPA+ADM+CDDP療法(CAP)	CPA 500mg/m ² day1 DXR 50mg/m ² day1 CDDP 50mg/m ² day1 4週ごと ¹ 副作用: 脱毛、骨髓抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、口内炎、全身倦怠感
卵巣癌(C56)	AADC-0133	DOXIL	DXR 50mg/m ² を1mg/分で静注 day1 4週ごと ¹ 副作用: 骨髓抑制、アナフィラキシー用症状、手足症候群、口内炎、肝機能障害 悪心、食欲不振、発疹、疲労、体重減少、心筋障害
卵巣杯細胞性悪性腫瘍(C56)	AADC-0075	EP療法	VP-16 100mg/m ² day1～5 CDDP 20mg/m ² day1～5 1クール:3週 副作用: 骨髓抑制、食欲不振、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、
卵巣杯細胞性悪性腫瘍(C56)	AADC-0083	BEP療法	BLM 30mg/body day2,9,16 VP-16 100mg/m ² day1～5 CDDP 20mg/m ² day1～5 1クール:3週 副作用: 間質性肺炎、肺纖維症、皮膚の硬化、色素沈着、発熱・悪寒、脱毛、食欲不振 体重減少、全身倦怠感、悪心・嘔吐、骨髓抑制、
前立腺癌(C61)	AADC-0038	tri-weekly DTX	DTX 60～75mg/m ² day1 3週毎 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髓抑制 肝機能障害、腎機能障害
前立腺癌(C61)	AADC-0064	Prostal	クロルマジノン 1回50mg1日2回 副作用: インボテンツ、浮腫、体重増加、女性化乳房
前立腺癌(C61)	AADC-0065	Casodex	ビカルタミド 1回80mg1日1回 副作用: 乳房腫脹、乳房圧痛、肝機能障害、勃起力低下
前立腺癌(C61)	AADC-0066	Odyne	フルタミド 1回125mg 1日3回 副作用: 肝機能障害、女性型乳房、悪心・嘔吐
前立腺癌(C61)	AADC-0067	Estracyt	エストラムスチン 1回280mg 1日2回 副作用: 女性化乳房、食欲不振、浮腫、貧血、肝機能異常
前立腺癌(C61)	AADC-0068	Leuplin	リュープロレリン 4週に1回3.75mgを皮下投与 副作用: 肝機能障害、ほてり、熱感
前立腺癌(C61)	AADC-0070	Zoladex LA	ゴセレリン 10.8mgを前腹部に12～13週毎に1回投与

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
前立腺癌(C61)	AADC-0103	多剤ホルモン療法無効前立腺癌 <i>Prosexol</i>	副作用: 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下 エチニルエストラジオール 1回0.5～1.0mg 1日3回 副作用: 血栓症、心不全、狭心症、発疹、肝機能障害、血圧上昇、電解質異常
前立腺癌(C61)	AADC-0124	<i>Casodex + ZoladexLA</i> 療法	ビカルタミド 1回80mg1日1回 ゴセレリン 10.8mgを前腹部に12～13週毎に1回投与 副作用: 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下 乳房腫脹、乳房圧痛、肝機能障害
前立腺癌(C61)	AADC-0125	<i>Casodex + Leuplin</i> 療法	ビカルタミド 1回80mg1日1回 リュープロレリン 4週ごとに3.75mgまたは12週ごとに11.25mgを皮下投与 副作用: 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下 ほてり、熱感
前立腺癌(C61)	AADC-0127	<i>Odyne + ZoladexLA</i> 療法	フルタミド 1回125mg 1日3回 ゴセレリン 10.8mgを前腹部に12～13週毎に1回投与 副作用: 肝機能障害、女性型乳房、恶心・嘔吐 代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下
前立腺癌(C61)	AADC-0187	<i>Degarelix</i>	デガレリクス 初回240mgを1箇所あたり120mgずつ腹部2箇所に皮下投与 2回目以降80mgを腹部1箇所に皮下投与 4週毎 副作用: 注射部位疼痛、注射部位硬結、注射部位紅斑、ほてり、体重増加 発熱、高血圧、注射部位熱感、間質性肺炎、肝機能障害、糖尿病憎悪 心不全、血栓塞栓症、アナフィラキシー
前立腺癌(C61)	AADC-0128	<i>Odyne + Leuplin</i> 療法	フルタミド 1回125mg 1日3回 リュープロレリン 4週ごとに3.75mgまたは12週ごとに11.25mgを皮下投与 副作用: 肝機能障害、女性型乳房、恶心・嘔吐、ほてり、熱感
前立腺癌(C61) 去勢抵抗性前立腺癌	AADC-0205	<i>Enzalutamide</i>	エンザルタミド 1回160mg 1日1回 経口投与 連日 副作用: 疲労、恶心、食欲減退、無力症、痙攣発作、下痢、
前立腺癌(C61) 去勢抵抗性前立腺癌	AADC-0208	<i>Abiraterone</i>	Abiraterone 1回1000mg 1日1回 経口投与 連日 アンドロゲン 1回5mg 1日2回 経口投与 連日 副作用: 肝機能障害、心障害、疲労、ほてり、恶心・嘔吐、低カリウム血症 高血圧、消化器症状、高脂血症
前立腺癌(C61) 去勢抵抗性前立腺癌	AADC-0224	<i>Cabazitaxel</i>	Cabazitaxel 20～25mg/m ² day1 Pegfilgrastin 3.6mg day2 3週毎 副作用: 好中球減少症、骨髓抑制、疲労、恶心、下痢、食欲減退 貧血、腎不全、消化管出血、アナフィラキシーショック 心不全、末梢神経障害、DIC、皮膚粘膜眼症候群、心タンポナーデ 心筋梗塞、静脈血栓塞栓症、間質性肺炎、口内炎、SIADH
前立腺癌(C61)	AADC-0226	<i>Leuprorerin Pro</i>	Leuprorerin Pro22.5mg 24週毎皮下注射 副作用: 注射部位硬結、注射部位紅斑、注射部位疼痛、糖尿病、ほてり 間質性肺炎、アナフィラキシー、肝機能障害、血栓塞栓症

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
前立腺癌(C61)	AADC-0250	Degarelix(12週毎)	デガリекс	初回240mgを1箇所あたり120mgずつ腹部2箇所に皮下投与 2回目以降は初回投与4週間後より480mgを維持用量として 腹部2箇所に皮下投与し、12週間間隔で投与を繰り返す。	
			副作用:	注射部位疼痛、注射部位硬結、注射部位紅斑、ほてり、体重増加 発熱、高血圧、注射部位熱感、間質性肺炎、肝機能障害、糖尿病憎悪 心不全、血栓塞栓症、アナフィラキシー	
前立腺癌(C61)	AADC-0251	Apalutamide	アパルタミド	1回240mg 1日1回 経口投与 連日 副作用: 疲労、皮疹、甲状腺機能低下症、搔痒症、体重減少 痙攣発作、心房細動、心筋梗塞、悪心、下痢	
前立腺癌(C61) 遠隔転移を有しない去勢抵抗性前立腺癌	AADC-0266	Darolutamide	ダロルタミド	1回600mg(300mgを2錠) 1日2回 食後経口投与 連日 副作用: 心臓障害、間質性肺疾患、疲労、皮疹、頭痛、めまい 悪心、下痢、ほてり、高血圧、女性化乳房	
前立腺癌(C61) BRCA遺伝子変異陽性の遠隔転移を有する去勢抵抗性前立腺癌	AADC-0248	Olaparib	オラバリブ	1回300mgを1日2回経口投与 副作用: 悪心、嘔吐、味覚異常 貧血、好中球減少、血小板減少、リンパ球減少 疲労、無力症、間質性肺炎 下痢、頭痛	
前立腺癌(C61) CDK12陽性の前立腺癌	AADC-0367	Cisplatin (CDK12陽性)	CDDP	75mg/m ² day2	
			3週毎		
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髓抑制、食欲不振、口内炎、腎機能障害	
精巣腫瘍(C63)	AADC-0074	BEP療法	BLM	30mg/body day1.8.15	
			VP-16	100mg/m ² day1~5	
			CDDP	20mg/m ² day1~5	
			1クール:3週		
			副作用:	間質性肺炎、肺纖維症、皮膚の硬化、色素沈着、発熱・悪寒、脱毛、食欲不振 体重減少、全身倦怠感、悪心・嘔吐、骨髓抑制、	
精巣腫瘍(C63)	AADC-0075	EP療法	VP-16	100mg/m ² day1~5	
			CDDP	20mg/m ² day1~5	
			1クール:3週		
			副作用:	骨髓抑制、食欲不振、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、	
精巣腫瘍(C63) セノーマ	AADC-0171	CBDCA	CBDCA	AUC=7 単回投与	
			副作用:	嘔気・嘔吐、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、発熱、骨髓抑制、肝機能障害	
腎癌(C64)	AADC-0076	Sumiferon	IFN- α	1日1回300万~600万IU 連日または週1~3回	
			副作用:	発熱、全身倦怠感、食欲不振、骨髓抑制、肝機能障害	
腎癌(C64)	AADC-0077	Imunace	テセロイキン	1日1回70万単位 連日	
			副作用:	発熱、悪寒、倦怠感、食欲不振、悪心・嘔吐、好酸球增多、肝機能障害、浮腫	
腎癌(C64)	AADC-0112	Sutent	スニチニブ	1日1回50mg 4週間連続投与2週間休薬	
			副作用:	骨髓抑制、皮膚変色、手足症候群、食欲不振、肝機能異常、疲労感 味覚異常、口内炎、下痢、悪心、歯肉炎、代謝異常、浮腫、発熱、高血圧	
腎癌(C64) 根治切除不能または転移性の腎細胞癌	AADC-0160	Sorafenib	用法・用量	1回400mg 1日2回 経口投与 適宜増減	
			副作用:	手足症候群。剥脱性皮膚炎、発疹、脱毛、下痢、高血圧、疲労	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			食欲不振、うっかり感、体重減少、肝機能障害、出血 間質性肺炎、急性肺障害、高血圧クリーゼ、可逆性後白室脳症 皮膚粘膜眼症候群、消化管穿孔、心筋虚血・心筋梗塞
腎癌(C64) 根治切除不能または転移性の腎細胞癌	<i>AADC-0169</i>	<i>Everolimus</i>	Everolimus 10mg/day 連日経口投与 副作用: 口内炎、発疹、貧血、疲労、下痢、無力症、食欲減退、高コレステロール血症 悪心、粘膜の炎症、嘔吐、末梢性浮腫、高トリグリセリド血症、咳嗽、搔痒症 感染症、皮膚乾燥、鼻出血、呼吸困難、味覚異常、間質性肺炎、腎不全 高血糖、アナフィラキシー様症状、急性呼吸窮迫症候群、肺塞栓症、心嚢液貯留 進行性多巣性白質脳症、BKウイルス腎症、血栓性微小血管障害、肺胞蛋白症
腎癌(C64)	<i>AADC-0178</i>	<i>Temsirolimus</i>	テムシロリムス 25mgを1週間に1回点滴 副作用: 発疹、口内炎、食欲不振、肝機能障害、高血糖、間質性肺疾患 infusion reaction、脂質代謝異常、創傷治癒遅延、腎不全 消化管穿孔、心嚢液貯留、胸水、瘤巣、脳出血、感染症 皮膚粘膜眼症候群、横紋筋融解症、骨髄抑制
腎癌(C64) 進行再発腎癌	<i>AADC-0183</i>	<i>Axitinib</i>	アキシチニブ 1回5mg1日2回経口投与 患者の状態により増減可、增量は1回10mgまで 副作用: 高血圧、甲状腺機能障害、創傷治癒遅延、蛋白尿、手足症候群 肝機能障害、下痢、疲労、悪心嘔吐、発声障害、無力症、体重減少 粘膜炎症、口内炎、味覚異常、鼻出血、
腎癌(C64)	<i>AADC-0199</i>	<i>Pazopanib</i>	パゾパニブ 1日1回800mg 経口投与 副作用: 下痢、疲労、悪心、高血圧、毛髪変色、食欲減退、体重減少、味覚異常 肝機能障害、心機能障害、動脈血栓性事象、静脈血栓性事象、出血 甲状腺機能障害、ネフローゼ症候群、蛋白尿、感染症、創傷治癒遅延
腎癌(C64)	<i>AADC-0225</i>	<i>Nivolumab</i>	ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
腎癌(C64)	<i>AADC-0252</i>	<i>Nivolumab+Ipilimumab</i>	Nivolumab 240mg/body Ipilimumab 1mg/kg 3週毎4コースまで 5コースから Nivolumab 240mg/body 2週毎継続 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核
腎癌(C64)	<i>AADC-0272</i>	<i>4週毎 Nivolumab</i>	ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
腎癌(C64)	<i>AADC-0268</i>	<i>Pembrolizumab(6週間)</i>	ペムブロリズマブ 1回400mg 6週間隔 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
			肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害		
			膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎		
腎癌(C64)	AADC-0278	<i>Cabozantinib</i>	カボザンチニブ 副作用:	1回60mg 1日1回空腹時 高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、恶心、疲労 口内炎、蛋白尿、手足症候群、横紋筋融解症 動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔 可逆性後白質脳症症候群、心障害、骨髓抑制、創傷治癒遅延 低カルシウム血症	
腎う癌(C65)	AADC-0121	<i>GC療法</i>	GEM CDDP 1クール:4週 副作用:	1000mg/m ² 70mg/m ² day1.8.15 day2 悪心・嘔吐、骨髓抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱	
腎う癌(C65)	AADC-0268	<i>Pembrolizumab(6週間)</i>	ペムブロリズマブ 副作用:	1回400mg 6週間隔 骨髓抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、恶心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎	
腎う癌(C65) 根治切除不能尿路上皮癌における化学療法後の維持療法	AADC-0283	<i>Avelumab</i>	Avelumab 2週毎 副作用:	10mg/kg day1 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー	
腎う癌(C65) がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌	AADC-0294	<i>Enfortumab Vedotin</i>	Enfortumab Vedotin 4週毎 副作用:	1.25mg/kg day1.8.15 皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髓抑制、腎機能障害、間質性肺疾患 肝機能障害、Infusion reaction	
腎う癌(C65) 筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで	AADC-0225	<i>Nivolumab</i>	ニボルマブ 副作用:	240mg/body 2週間隔 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
腎う癌(C65) 筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで	AADC-0272	<i>4週毎 Nivolumab</i>	ニボルマブ 副作用:	480mg/body 4週間隔 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
腎う癌(C65) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌	AADC-0336	<i>GEM+PTX</i>	GEM PTX 4週毎 副作用:	1000mg/m ² day1.8.15 200mg/m ² day1 悪心・嘔吐、骨髓抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 関節痛、筋肉痛、末梢神経障害	
腎う癌(C65) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌	AADC-0337	<i>GEM+CBDCA</i>	GEM CBDCA 3週毎 副作用:	1000mg/m ² day1.8 目標AUC=5 day1 悪心・嘔吐、骨髓抑制、食欲不振、口内炎、発熱	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
腎う癌(C65) 根治切除不能な尿路上皮癌の一次治療	AADC-0360	Pembrolizumab+Enfortumab Vedotin	Pembrolizumab Enfortumab Vedotin	200mg/body 1.25mg/kg	day1 day1.8
			3週毎		
			副作用:	皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髓抑制、腎機能障害、間質性肺疾患 肝機能障害、Infusion reaction 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、静脈血栓塞栓症	
尿管癌(C66)	AADC-0121	GC療法	GEM CDDP	1000mg/m ² 70mg/m ²	day1.8.15 day2
			1クール:4週		
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髓抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱	
尿管癌(C66)	AADC-0268	Pembrolizumab(6週間)	ペムブロリズマブ	1回400mg	6週間隔
			副作用:	骨髓抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎	
尿管癌(C66) 根治切除不能尿路上皮癌における化学療法後の維持療法	AADC-0283	Avelumab	Avelumab	10mg/kg	day1
			2週毎		
			副作用:	間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー	
尿管癌(C66) がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌	AADC-0294	Enfortumab Vedotin	Enfortumab Vedotin	1.25mg/kg	day1.8.15
			4週毎		
			副作用:	皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髓抑制、腎機能障害、間質性肺疾患 肝機能障害、Infusion reaction	
尿管癌(C66) 筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ	240mg/body	2週間隔
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
尿管癌(C66) 筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ	480mg/body	4週間隔
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
尿管癌(C66) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌	AADC-0336	GEM+PTX	GEM PTX	1000mg/m ² 200mg/m ²	day1.8.15 day1
			4週毎		
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髓抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 関節痛、筋肉痛、末梢神経障害	
尿管癌(C66) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌	AADC-0337	GEM+CBDCA	GEM CBDCA	1000mg/m ² 目標AUC=5	day1.8 day1
			3週毎		
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髓抑制、食欲不振、口内炎、発熱	
尿管癌(C66)	AADC-0360	Pembrolizumab+Enfortumab Vedotin	Pembrolizumab	200mg/body	day1

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
根治切除不能な尿路上皮癌の一次治療			Enfortumab Vedotin	1.25mg/kg	day1.8
			3週毎		
			副作用:	皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髓抑制、腎機能障害、間質性肺疾患 肝機能障害、Infusion reaction	
				発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、静脈血栓塞栓症	
膀胱癌(C67)	AADC-0012	Furtulon	5'-DFUR	800-1200mgを3-4回に分けて服用	
			副作用:	食欲不振、下痢、白血球減少	
膀胱癌(C67)	AADC-0071	Epirubicin 膀胱内注入	EPI	40mgを週1回膀胱内へ注入 10回	
			副作用:	悪心・嘔吐、白血球減少、食欲不振、脱毛	
膀胱癌(C67)	AADC-0072	Immunobladder 膀胱内注入	BCG	40mgまたは80mgを週1回膀胱内へ注入 10回	
			副作用:	BCG感染、排尿痛、頻尿、肉眼的血尿、肝機能障害、発熱、	
膀胱癌(C67)	AADC-0121	GC療法	GEM	1000mg/m ²	day1.8.15
			CDDP	70mg/m ²	day2
			1クール:4週		
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髓抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱	
膀胱癌(C67)	AADC-0268	Pembrolizumab(6週間)	ペムブロリズマブ	1回400mg	6週間隔
			副作用:	骨髓抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症	
				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐	
				口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害	
				肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害	
				肺炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎	
膀胱癌(C67)	AADC-0283	Avelumab	Avelumab	10mg/kg	day1
根治切除不能尿路上皮癌における化学療法後の維持療法			2週毎		
			副作用:	間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病	
				肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー	
膀胱癌(C67)	AADC-0294	Enfortumab Vedotin	Enfortumab Vedotin	1.25mg/kg	day1.8.15
がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌			4週毎		
			副作用:	皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髓抑制、腎機能障害、間質性肺疾患 肝機能障害、Infusion reaction	
膀胱癌(C67)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ	240mg/body	2週間隔
筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
膀胱癌(C67)	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ	480mg/body	4週間隔
筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
膀胱癌(C67)	AADC-0336	GEM+PTX	GEM	1000mg/m ²	day1.8.15
切除不能または転移を有する尿路上皮癌			PTX	200mg/m ²	day1
			4週毎		

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髓抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 関節痛、筋肉痛、末梢神経障害	
膀胱癌(C67) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌	AADC-0337	GEM+CBDCA	GEM CBDCA 3週毎	1000mg/m ² 目標AUC=5 day1.8 day1	
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髓抑制、食欲不振、口内炎、発熱	
膀胱癌(C67) 根治切除不能な尿路上皮癌の一次治療	AADC-0360	Pembrolizumab+Enfortumab Vedotin	Pembrolizumab Enfortumab Vedotin 3週毎	200mg/body 1.25mg/kg day1 day1.8	
			副作用:	皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髓抑制、腎機能障害、間質性肺疾患 肝機能障害、Infusion reaction 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、静脈血栓塞栓症	
悪性膠芽腫、乏突起神経膠腫(C71)	AADC-0078	IFN β +MCNU+IMRT(IMR療法)	IFN β またはフェロン サイメリン 放射線照射	300万単位 1mg/kg day1 2ヶ月に1回	5投2休(5週間)、1回/週(6週目以降)
			副作用:	発熱、骨髓抑制、蛋白尿、食欲不振、悪心嘔吐	
悪性神経膠腫(C71)	AADC-0104	Temodal	テモダール 放射線照射 再発	経口又は点滴静注 初発)放射線照射との併用 テモゾロミドとして1回75mg/m ² 1日1回連日42日間投与し4週間休薬 その後に本剤単独にて、テモゾロミドとして1回150mg/m ² を1日1回連日5日間 投与し、23日間休薬。28日間1クール テモゾロミドとして1回150mg/m ² 1日1回連日5日間投与し23日間休薬 28日間1クール	
			副作用:	放射線照射との併用 脱毛、悪心・嘔吐、疲労 併用後の単独投与時 疲労、脱毛、悪心・嘔吐、食欲不振、頭痛、便秘	
悪性神経膠腫(C71)	AADC-0197	BV+RT/TMZ 療法	ベバシズマブ テモダール 放射線照射 その後 ベバシズマブ テモダール その後 ベバシズマブ	1回10mg/kgを2週間間隔で計4回点滴静注 1回75mg/m ² 1日1回連日経口投与 2Gy/日 週5日 総線量60Gy 1回10mg/kgを2週間間隔点滴静注 1回150mg~200mg/m ² 1日1回連日5日間経口投与し23日間休薬 28日間1クール 1回15mg/kgを3週間間隔点滴静注 PDになるまで	1回2休(5週間)、1回/週(6週目以降) 経口又は点滴静注 初発)放射線照射との併用 テモゾロミドとして1回75mg/m ² 1日1回連日42日間投与し4週間休薬 その後に本剤単独にて、テモゾロミドとして1回150mg/m ² を1日1回連日5日間 投与し、23日間休薬。28日間1クール テモゾロミドとして1回150mg/m ² 1日1回連日5日間投与し23日間休薬 28日間1クール PDになるまで
			副作用:	脳出血、粘膜皮膚出血、動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、創傷治癒遅延 骨髓抑制、感染症、高血圧、蛋白尿、可逆性後白質脳症症候群、消化管穿孔 うつ血性心不全、疲労、脱毛、悪心・嘔吐、食欲不振、頭痛、便秘	
悪性神経膠腫(C71)	AADC-0198	Gliadel	ギリアデル	腫瘍切除腔の大きさや形状に応じて、8枚または適宜減じた枚数を 脳腫瘍切除術時の切除面を被覆するように留置	
			副作用:	脳浮腫、発熱、リンパ球数減少、片麻痺、悪心、嘔吐、食欲減退 頭痛、肝機能異常、痙攣、創傷治癒不良、血栓塞栓症	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
悪性リンパ腫(C72)	AADC-0116	髓注MTX+PSL療法	MTX 15mg PSL 20mg 髓液中悪性リンパ腫細胞が陰性化するまで2回／週 繰り返し施行 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、口内炎、下痢、腎機能障害、
悪性リンパ腫(C72)	AADC-0118	high dose MTX	MTX 3.5g/ m ² 24時間点滴 LV 15mg/body 静注 LVはMTX終了12時間後から6時間毎に投与 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、口内炎、下痢、腎機能障害、 肝機能障害、食欲不振
悪性リンパ腫(C72)	AADC-0267	Tirabrutinib	チラブルチニブ 1回480mg (80mgを6錠) 1日1回 空腹時経口投与 連日 副作用: 感染症、皮膚障害、骨髄抑制、過敏症、間質性肺疾患 肝機能障害、出血、下痢、悪心嘔吐 高カリウム血症、高トリグリセリド血症
甲状腺癌(C73)	AADC-0160	Sorafenib	用法・用量 1回400mg 1日2回 経口投与 適宜増減 副作用: 手足症候群、剥脱性皮膚炎、発疹、脱毛、下痢、高血圧、疲労 食欲不振、そう痒感、体重減少、肝機能障害、出血 間質性肺炎、急性肺障害、高血圧クリーゼ、可逆性後白室脳症 皮膚粘膜眼症候群、消化管穿孔、心筋虚血・心筋梗塞
甲状腺癌(C73)	AADC-0222	Lenvatinib	用法・用量 1回24mg 1日1回 副作用: 高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労 口内炎、蛋白尿、手掌・足底発赤知覚不全症候群、出 動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔 可逆性後白質脳症症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延 低カルシウム血症
甲状腺癌(C73) BRAF遺伝子変異陽性	AADC-0357	Encorafenib+Binimetinib	Encorafenib 1回450mg 1日1回経口投与 Binimetinib 1回45mg 1日2回経口投与 副作用: 手足症候群、眼障害、心機能障害、肝障害、横紋筋融解症 高血圧、出血、腫瘍崩壊症候群
悪性リンパ腫(C77) 非ホジキンリンパ腫	AADC-0048	CHOP療法	CPA 750mg/ m ² day1 DXR 50mg/ m ² day1 VCR 1.4mg/ m ² day1 PSL 100mg/body day1～5 1クール:3週 副作用: 骨髄抑制、心毒性、末梢神経障害、肝障害、悪心・嘔吐、脱毛、出血性膀胱炎
悪性リンパ腫(C77) 非ホジキンリンパ腫	AADC-0049	R-CHOP療法	リツキシマブ 375mg/ m ² (CHOP療法の前日) CPA 750mg/ m ² day1 DXR 50mg/ m ² day1 VCR 1.4mg/ m ² day1 PSL 100mg/body day1～5 1クール:3週 副作用: 全身浮腫、呼吸障害、発熱、悪寒、頭痛、血圧上昇、発疹、骨髄抑制、悪心・嘔吐 出血性膀胱炎、心毒性、末梢神経障害、肝障害、脱毛、下肢深部反射減弱・消失、

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
悪性リンパ腫(C77) 非ホジキンリンパ腫	AADC-0236	High dose MTX + High dose Ara-C	MTX MTX ソル・メルコート キロサイト 1クール:3週	200mg/m ² 800mg/m ² 持続 50mg/body 6000mg/m ² /日	day1 day1 day1~3 day2~3
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、口内炎、下痢、腎機能障害、肝機能障害、食欲不振、間質性肺炎、急性呼吸促迫症候群 中枢神経障害、代謝異常	
原発不明癌(C80)	AADC-0015	GEM	GEM	1000 mg/m ² を週1回 3回投与 1000 mg/m ² を2週間に1回	1週休薬 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感
原発不明癌(C80)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ	240mg/body 2週間隔	副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
原発不明癌(C80)	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ	480mg/body 4週間隔	副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
リンパ性白血病(C91) 再発又は難治性の慢性リンパ性白血病	AADC-0319	Acalabrutinib	用法・用量 副作用:	1回100mg 1日2回 経口投与 下痢、悪心・嘔吐、頭痛 骨髄抑制、感染症、出血 不整脈、虚血性心疾患、間質性肺疾患 腫瘍崩壊症候群、二次性悪性腫瘍	
骨髄異形成症候群(D46)	AADC-0301	Azacitidine 皮下注	アザシチジン 副作用:	75mg/m ² day1-7 皮下注 21日間休薬 骨髄抑制、感染症、出血、腎尿細管アシドーシス、低血圧 食欲不振、便秘、悪心、口内炎、下痢 発疹、搔痒、倦怠感、発熱、注射部位反応、注射部位紅斑	
骨髄異形成症候群(D46)	AADC-0302	Azacitidine 点滴静注	アザシチジン 副作用:	75mg/m ² day1-7 10分かけて点滴静注 21日間休薬 骨髄抑制、感染症、出血、腎尿細管アシドーシス、低血圧 食欲不振、便秘、悪心、口内炎、下痢 発疹、搔痒、倦怠感、発熱	
固形癌(MSI-High)	AADC-0235	Pembrolizumab	ペムブロリズマブ 副作用:	1回200mg 3週間隔 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎	
固形癌(MSI-High)	AADC-0268	Pembrolizumab(6週間)	ペムブロリズマブ 副作用:	1回400mg 6週間隔 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害
			膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
固体癌(NTRK融合遺伝子陽性)	AADC-0346	<i>Larotrectinib</i>	ラロトレクチニブ 副作用: 1回 100mg、1日2回、連日経口投与 浮動性めまい、頭痛、末梢性感覺ニューロパシー 肝機能障害、骨髄抑制 疲労、筋肉痛、関節痛
小細胞癌(臓器横断的)	AADC-0023	<i>CBDCA+ETP療法(CE)</i>	VP-16 80mg/m ² day1~3 CBDCA 目標AUC=5/body day1 3~4週ごと 副作用: 骨髄抑制、脱毛、恶心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振