

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
頭頸部癌 (C00)	AADC-0001	S-1(CG)	用法	a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法 (副作用の軽減を目的)
			用量	朝食後および夕食後の1日2回
			体表面積	1.25㎡未満 40mg/回
				1.25から1.5㎡未満 50mg/回
				1.5㎡以上 60mg/回
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、
頭頸部癌 (C00)	AADC-0091	tri-weekly DTX	DTX	60mg/㎡ day1
			3週ごと	
			副作用:	脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害
頭頸部癌 (C00)	AADC-0008	DCF 療法	CDDP 80 mg/㎡	day1
			TXT 70mg/㎡	day1
			5Fu 800 mg/㎡	day1からday5
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、発熱、
頭頸部癌 (C00)	AADC-0182	Cetuximab + FP	セツキシマブ	初回400 mg/㎡、2回目以降250 mg/㎡ 毎週点滴静注
			CDDP	100 mg/㎡ day1 3週に1回
			5Fu	1000 mg/㎡/day day1～day4 3週に1回
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛 ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、低マグネシウム血症、間質性肺炎、 掻痒感、infusion reaction、食欲不振、疲労感、心不全、血栓塞栓症
頭頸部癌 (C00)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ	240mg/body 2週間隔
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
頭頸部癌 (C00)	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ	480mg/body 4週間隔
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
頭頸部癌 (C00)	AADC-0235	Pembrolizumab	ペムブロリズマブ	1回200mg 3週間隔
			副作用:	骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
頭頸部癌 (C00)	AADC-0268	Pembrolizumab(6週間)	ペムブロリズマブ	1回400mg 6週間隔
			副作用:	骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
食道癌 (C15)	AADC-0007	CDDP+5-FU 療法(FP)	CDDP	10 mg/body	day1からday5
			5Fu	500 mg/ m ²	day1からday5
			副作用： 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛		
食道癌 (C15)	AADC-0008	DCF 療法	CDDP 80 mg/ m ²	day1	
			TXT 70mg/ m ²	day1	
			5Fu 800 mg/ m ²	day1からday5	
			副作用： 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛、食欲不振、全身倦怠感、発熱、		
食道癌 (C15)	AADC-0105	FP+IMRT療法	5-FU	500 mg/body	day1からday5
			CDDP	5 mg/body	day1からday5
			トモセラピー	2Gy/body	day1からday5
			day6,7は休薬 6週連続 (到達目標60Gy) 副作用： 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛		
食道癌 (C15)	AADC-0164	DTX	DTX	70mg/ m ²	day1
			3週ごと		
			副作用： 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害		
食道癌 (C15)	AADC-0184	IMRT+FP	CDDP	70 mg/ m ²	day1
			5Fu	700 mg/ m ²	day1からday5
			IMRT	50Gy 25分割	
			副作用： 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛、食道炎、心嚢水貯留、胸水貯留、肺臓炎		
食道癌 (C15)	AADC-0185	FP	化学療法は4週毎に繰り返す		
			CDDP	80 mg/ m ²	day1
			5Fu	800 mg/ m ²	day1からday5
			4週毎 副作用： 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛		
食道癌 (C15)	AADC-0227	PTX(6投2休)	PTX	100 mg/ m ²	day1.8.15.22.29.36 少なくとも2週休薬
			副作用： 脱毛、発疹、爪の障害、感覚減退、味覚異常、浮動性めまい、疲労、浮腫、発熱、悪心、嘔吐、下痢、便秘、食欲不振、口内炎、筋痛、関節痛、骨髄抑制、末梢神経障害、間質性肺炎		
食道癌 (C15)	AADC-0233	Nedaplatin + 5-FU	Nedaplatin	90 mg/ m ²	day1
			5Fu	800 mg/ m ² /day	day1からday5
			4週毎		
			副作用： 骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、腎機能障害、口内炎、脱毛、肝機能異常、色素沈着、ショック、アナフィラキシー、電解質異常、間質性肺炎		
食道癌 (C15)	AADC-0014	mFOLFOX6療法	L-OHP	85mg/ m ²	day1
			5-FU (bolus)	400mg/ m ²	day1
			5-FU (infusion)	2400mg/ m ²	46～48hr
			l-LV	200mg/ m ²	day1
食道癌 (C15)			2週ごと		
			副作用： 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢、発熱		
食道癌 (C15)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ	240mg/body 2週間隔	(術後補助の場合投与は1年間)

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発 術前治療でpCRでなかったStageⅡ／Ⅲの術後補助			副作用：	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
食道癌 (C15) がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発 術前治療でpCRでなかったStageⅡ／Ⅲの術後補助	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ	480mg/body 4週間隔 (術後補助の場合投与は1年間)
			副作用：	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
食道癌 (C15)	AADC-0298	Pembrolizumab+5-FU+CDDP	ペムブロリズマブ	1回200mg day1
			CDDP	80 mg/m ² day1
			5FU	800 mg/m ² day1からday5
			3週毎	
			副作用：	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎
				インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症
				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感
				肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害
				下垂体機能障害、1型糖尿病
				膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
食道癌 (C15) 切除可能、局所進行食道扁平上皮癌(cT1N1-3M0,cT2-3N0-3M0) 年齢20歳以上75歳以下mECOG PS 0-1	AADC-0300	DCF療法(術前)	CDDP 70 mg/m ²	day1
			DTX 70mg/m ²	day1
			5Fu 750 mg/m ²	day1からday5
			3週毎に3回施行	
			副作用：	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎
				脱毛、食欲不振、全身倦怠感、発熱、
食道癌 (C15)	AADC-0309	Nivolumab+ipilimumab	Nivolumab	240mg/body 2週間隔
			Ipilimumab	1mg/kg 6週間隔
			副作用：	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
				血球貪食症候群、結核
食道癌 (C15)	AADC-0310	Nivolumab+FP	ニボルマブ	240mg/body 2週間隔
			CDDP	80 mg/m ² day1
			5Fu	800 mg/m ² day1からday5
			4週毎	
			副作用：	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎
				インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症
				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感
				肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害
				下垂体機能障害、1型糖尿病
				膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
食道癌 (C15) 根治切除不能な進行・再発	AADC-0373	Tislelizumab+FP	Tislelizumab	200mg/body day1
			CDDP	80 mg/m ² day1
			5FU	800 mg/m ² day1からday5
			3週毎	
			副作用：	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎
				インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症
				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感
				肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
			下垂体機能障害、1型糖尿病		
			膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎		
食道癌 (C15)	AADC-0374	Tislelizumab	Tislelizumab	200mg/body 3週間隔	
がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
胃癌 (C16)	AADC-0001	S-1(CG)			
			用法	a.4週投与 2週休薬法	
				b.2週投与 1週休薬法 (副作用の軽減を目的)	
			用量	朝食後および夕食後の1日2回	
			体表面積	1.25㎡未満	40mg/回
				1.25から1.5㎡未満	50mg/回
				1.5㎡以上	60mg/回
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹	
				流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、	
胃癌 (C16)	AADC-0002	S-1+CDDP 療法	TS-1 3週投与2週休薬		
			TS-1開始8日目にCDDP60 mg/㎡		
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹	
				流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、	
胃癌 (C16)	AADC-0003	PTX	a. 70 mg/㎡を1週に1回 3回投与 1週休薬		
			b. 80 mg/㎡を2週に1回 もしくは 3週に1回		
			副作用:	脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害	
				筋肉痛、関節痛、悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常	
胃癌 (C16)	AADC-0006	CPT-11+ CDDP療法(IP)			
			CDDP	80 mg/㎡	day1
			CPT-11	70 mg/㎡	day1,15
			4週毎		
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、全身倦怠感	
				末梢神経障害、脱毛	
胃癌 (C16)	AADC-0014	mFOLFOX6療法			
			L-OHP	85mg/㎡	day1
			5-FU (bolus)	400mg/㎡	day1
			5-FU (infusion)	2400mg/㎡	46～48hr
			l-LV	200mg/㎡	day1
				2週ごと	
			副作用:	末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢	
				発熱	
胃癌 (C16)	AADC-0085	CPT-11			
			CPT-11	150 mg/㎡	2週に1回
			副作用:	下痢、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、骨髄抑制、肝機能障害	
胃癌 (C16)	AADC-0101	外来 CPT-11+CDDP療法(IP)			
			CDDP	30 mg/㎡	day1,15
			CPT-11	60 mg/㎡	day1,15
			4週毎		
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、全身倦怠感	
				末梢神経障害、脱毛	
胃癌 (C16)	AADC-0122	S-1+DTX 療法			
			TS-1	2週投与1週休薬	

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			朝食後および夕食後の1日2回
			80 mg/m ² /day
			DTX 40 mg/m ² day1
			3週毎
			副作用： 骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、色素沈着、神経障害、脱毛
			浮腫、悪心・嘔吐、流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、
胃癌 (C16)	AADC-0134	XELOX 療法	カペシタビン 1日2回 14日間内服7日間休薬
			体表面積 1.36m ² 未満 1200mg/回
			1.36以上1.66m ² 未満 1500mg/回
			1.66以上1.96m ² 未満 1800mg/回
			1.96m ² 以上 2100mg/回
			L-OHP 130mg/m ² day1 3週ごと
			副作用： 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加
			口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着
胃癌 (C16)	AADC-0150	tri-weekly Abraxane	アブラキサン 1回 260mg/m ² 3週毎
			副作用： 脱毛、疲労、筋痛、末梢神経障害、骨髄抑制、下痢、悪心嘔吐
胃癌 (C16)	AADC-0153	tri weekly Trastuzumab + XP療法	トラスツズマブ [®] 8mg/kg day1 (2回目からは6mg/kg)
			CDDP 80 mg/m ² day1
			カペシタビン 1日2回1回1000mg/m ² day1夕からday15朝まで内服その後7日間休薬
			3週毎
			副作用： 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制、下痢、口内炎、色素沈着
			手足症候群、血中ビリルビン増加、腎機能障害、脱毛、末梢神経障害
胃癌 (C16)	AADC-0154	DCS療法	TS-1 朝食後および夕食後の1日2回
			80 mg/m ² /day day1夕からday15朝まで内服その後14日間休薬
			DTX 35 mg/m ² day1、day15
			CDDP 35 mg/m ² day1、day15
			副作用： 骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、色素沈着、神経障害、脱毛
			浮腫、悪心・嘔吐、腎機能障害、下痢
胃癌 (C16)	AADC-0179	DTX	DTX 75mg/m ² day1
			3週ごと
			副作用： 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制
			肝機能障害、腎機能障害、間質性肺炎
胃癌 (C16)	AADC-0213	SOX	L-OHP 130mg/m ² day1 3週ごと
			TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14 3週ごと
			体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回
			1.25から1.5m ² 未満 50mg/回
			1.5m ² 以上 60mg/回
			副作用： 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
			末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック
胃癌 (C16)	AADC-0219	RAM療法	RAM 8mg/kg day1 2週ごと
一次治療が無効の治癒切除不能胃癌			副作用： 腹痛、高血圧、下痢、
			動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害
			インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血
			骨髄抑制、低カリウム血症、低ナトリウム血症
胃癌 (C16)	AADC-0220	PTX+RAM療法	RAM 8mg/kg day1 2週ごと
一次治療が無効の治癒切除不能胃癌			PTX 70mg/m ² day1、8 2週ごと

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
			副作用:	腹痛、高血圧、下痢、疲労、無力症、末梢性浮腫 口内炎、肝機能障害、呼吸困難、蛋白尿、発疹、皮膚乾燥 動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害 インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血 骨髄抑制、低アルブミン血症、低ナトリウム血症、ざ瘡様皮膚炎 眼瞼浮腫、顔面浮腫、鼻出血
胃癌 (C16)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ	240mg/body 2週間隔
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
胃癌 (C16)	AADC-0253	Weekly nab-PTX	nab-PTX	100mg/m ² 週1回投与 3週連続投与1週休薬
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感 脱毛、末梢神経障害、発疹、下痢
胃癌 (C16)	AADC-0206	Trifluridine	トリフルリジン	1回35mg/m ² を1日2回 5日間連続経口投与した後2日間休薬し、これを2回繰り返した後 14日間休む 1コース28日間
			副作用:	骨髄抑制、悪心、食欲減退、疲労、下痢、嘔吐、口内炎、感染症、間質性肺炎
胃癌 (C16)	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ	480mg/body 4週間隔
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
胃癌 (C16) HER2陽性切除不能進行再発	AADC-0273	Trastuzumab Deruxtec	Trastuzumab Deruxtec	6.4mg/kg day1 3週ごと
			副作用:	間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション 骨髄抑制、脱毛、疲労、悪心・嘔吐、下痢、便秘、口内炎
胃癌 (C16)	AADC-0295	Nivolumab+CAPOX	ニボルマブ カペシタビン	360mg/body day1 3週ごと 1日2回 14日間内服7日間休薬 体表面積 1.36m ² 未満 1200mg/回 1.36以上1.66m ² 未満 1500mg/回 1.66以上1.96m ² 未満 1800mg/回 1.96m ² 以上 2100mg/回
			L-OHP	130mg/m ² day1 3週ごと
			副作用:	手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着 発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
胃癌 (C16)	AADC-0296	Nivolumab+SOX	ニボルマブ	360mg/body day1 3週ごと
			L-OHP	130mg/m ² day1 3週ごと
			TS-1	朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14 3週ごと
			体表面積 1.25m ² 未満	40mg/回
			1.25から1.5m ² 未満	50mg/回
			1.5m ² 以上	60mg/回
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック 発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等					
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション					
胃癌 (C16)	AADC-0297	Nivolumab+mFOLFOX6	ニボルマブ	240mg/body	day1			
			L-OHP	85mg/ m ²	day1			
			5-FU (bolus)	400mg/ m ²	day1			
			5-FU (infusion)	2400mg/ m ²	46～48hr			
			l-LV	200mg/ m ²	day1			
					2週ごと			
			副作用:	末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢 発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症				
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション				
胃癌 (C16)	AADC-0353	Pembrolizumab+CAPOX	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1 3週ごと			
			カペシタビン	1日2回	14日間内服7日間休薬			
			体表面積	1.36m ² 未満	1200mg/回			
				1.36以上1.66m ² 未満	1500mg/回			
				1.66以上1.96m ² 未満	1800mg/回			
				1.96m ² 以上	2100mg/回			
			L-OHP	130mg/ m ²	day1 3週ごと			
			副作用:	手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着 発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症				
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション				
			胃癌 (C16)	AADC-0354	Zolbetuximab+CAPOX	ゾルベツキシマブ	初回 800mg/ m ² (2回目以降は600mg/	3週ごと
カペシタビン	1日2回	14日間内服7日間休薬						
体表面積	1.36m ² 未満	1200mg/回						
	1.36以上1.66m ² 未満	1500mg/回						
	1.66以上1.96m ² 未満	1800mg/回						
	1.96m ² 以上	2100mg/回						
L-OHP	130mg/ m ²	day1 3週ごと						
副作用:	重度の悪心・嘔吐、過敏症、インフュージョンリアクション 手足症候群、骨髄抑制、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着							
胃癌 (C16)	AADC-0355	Zolbetuximab+mFOLFOX6				ゾルベツキシマブ	初回 800mg/ m ² (2回目以降は600mg/	3週ごと
						L-OHP	85mg/ m ²	day1
			5-FU (bolus)	400mg/ m ²	day1			
			5-FU (infusion)	2400mg/ m ²	46～48hr			
			l-LV	200mg/ m ²	day1			
					2週ごと			
			副作用:	重度の悪心・嘔吐、過敏症、インフュージョンリアクション 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、倦怠感、下痢 発熱、高血圧				
			胃癌 (C16) HER2陽性かつCPS≧1の進行再発胃癌	AADC-0370	Pembrolizumab+Trastuzumab+CAPOX	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1
トラスツズマブ	8mg/kg	day1 (2回目からは6mg/kg)						
カペシタビン	1日2回	14日間内服7日間休薬						
体表面積	1.36m ² 未満	1200mg/回						
	1.36以上1.66m ² 未満	1500mg/回						
	1.66以上1.96m ² 未満	1800mg/回						

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
				1.96㎡以上	2100mg/回
			L-OHP	130mg/㎡	day1
			3週ごと		
			副作用:	手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加	
				口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着	
				発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
胃癌 (C16)	AADC-0371	Pembrolizumab+Trastuzumab+FP	ペムブロリズマブ	1回200mg	day1
HER2陽性かつCPS≥1の進行再発胃癌			トラスツズマブ	8mg/kg (2回目からは6mg/k	day1
			CDDP	80 mg/㎡	day1
			5FU	800 mg/㎡	day1からday5
			3週毎		
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎	
				インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症	
				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感	
				肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害	
				下垂体機能障害、1型糖尿病	
				膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎	
GIST (C16～C17)	AADC-0009	Glivec	イマチニブ 1日1回400mgを食後に投与		
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、浮腫、発疹、倦怠感、電解質異常	
				肝機能障害、血中アルブミン減少	
GIST (C16～C17)	AADC-0112	Sutent	スニチニブ 1日1回50mg		
			4週間連続投与2週間休薬		
			副作用:	骨髄抑制、皮膚変色、手足症候群、食欲不振、肝機能異常、疲労感	
				味覚異常、口内炎、下痢、悪心、歯肉炎、代謝異常、浮腫、発熱、高血圧	
GIST (C16～C17)	AADC-0316	Pimipib	ピミテスピブ 1日1回 160mg 空腹時		
			5日間連続経口投与後2日間休薬		
			副作用:	下痢、食欲不振、倦怠感、悪心、血清クレアチニン上昇	
				腎機能低下、夜盲症、貧血	
大腸癌 (C18)	AADC-0001	S-1 (CG)			
			用法	a.4週投与 2週休薬法	
				b.2週投与 1週休薬法 (副作用の軽減を目的)	
			用量	朝食後および夕食後の1日2回	
			体表面積	1.25㎡未満	40mg/回
				1.25から1.5㎡未満	50mg/回
				1.5㎡以上	60mg/回
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹	
大腸癌 (C18)	AADC-0010	UFT (UFTE)			
			用法・用量	1日量としてテガフル300-600mgを1日2-3回に分割投与	
			副作用:	食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害	
大腸癌 (C18)	AADC-0011	UFT (UFT-E) / LV 療法			
			UFT-E 300mg/㎡/日 1日3回に分けて		
			LV 75mg/日 1日3回に分けて 食間に服用		
			4週投与 1週休薬		
			副作用:	食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害	

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
大腸癌 (C18)	AADC-0014	mFOLFOX6療法			
			L-OHP	85mg/㎡	day1
			5-FU (bolus)	400mg/㎡	day1
			5-FU (infusion)	2400mg/㎡	46～48hr
			I-LV	200mg/㎡	day1
			2週ごと		
			副作用:	末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢発熱	
大腸癌 (C18)	AADC-0084	FOLFIRI療法			
			5-FU (bolus)	400mg/㎡	day1
			5-FU (infusion)	2400mg/㎡	46～48hr
			I-LV	200mg/㎡	day1
			CPT-11	150mg/㎡	day1
			2週ごと		
			副作用:	食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛	
大腸癌 (C18)	AADC-0092	Bevacizumab based mFOLFOX6療法			
			ベバシズマブ	1回5mg/kgまたは10mg/kg	day1
			L-OHP	85mg/㎡	day1
			5-FU (bolus)	400mg/㎡	day1
			5-FU (infusion)	2400mg/㎡	46～48hr
			I-LV	200mg/㎡	day1
			2週ごと		
			副作用:	末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢発熱、消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症	
大腸癌 (C18)	AADC-0093	Bevacizumab based FOLFIRI療法			
			ベバシズマブ	1回5mg/kgまたは10mg/kg	day1
			5-FU (bolus)	400mg/㎡	day1
			5-FU (infusion)	2400mg/㎡	46～48hr
			I-LV	200mg/㎡	day1
			CPT-11	150mg/㎡	day1
			2週ごと		
			副作用:	食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛、発熱	
大腸癌 (C18)	AADC-0099	5-FU/LV療法			
			5-FU (bolus)	400mg/㎡	day1
			5-FU (infusion)	2400mg/㎡	46～48hr
			I-LV	200mg/㎡	day1
			2週ごと		
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、口内炎、手足症候群、脱毛	
大腸癌 (C18)	AADC-0102	Xeloda			
			カペシタビン	1日2回	2週連続投与 1週休薬
			体表面積	1.33㎡未満	1500mg/回
				1.33から1.57㎡未満	1800mg/回
				1.57から1.81㎡未満	2100mg/回
				1.81㎡以上	2400mg/回
			副作用:	手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加	
大腸癌 (C18)	AADC-0107	Bevacizumab based 5-FU/LV療法			
			ベバシズマブ	1回5mg/kgまたは10mg/kg	day1

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等			
			5-FU (bolus)	400mg/㎡	day1	
			5-FU (infusion)	2400mg/㎡	46～48hr	
			l-LV	200mg/㎡	day1	
			2週ごと			
			副作用：	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、口内炎、手足症候群、脱毛		
				全身倦怠感、肝機能障害、下痢、高血圧性クレーゼ		
				消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症		
大腸癌 (C18)	AADC-0108	UFT/LV+IMRT療法				
			UFT 300mg/㎡/日	1日3回に分けて		
			LV 75mg/日	1日3回に分けて	食間に服用	
				トモセラピー実施日	day1～5	
			トモセラピー	2Gy/day	(day1～5まで行い、day6,7は中止)	
			4週連続投与 (到達目標40Gy)			
			副作用：	食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害		
大腸癌 (C18)	AADC-0109	Cetuximab + FOLFIRI 療法				
			セツキシマブ	初回 400mg/㎡ (2回目以降は250mg/㎡)	day1	週1回
			CPT-11	150mg/㎡ (75歳以上は120mg/㎡)	day1	2週ごと
			l-LV	200mg/㎡	day1	2週ごと
			5-FU (bolus)	400mg/㎡	day1	2週ごと
			5-FU (infusion)	2400mg/㎡	46～48hr	2週ごと
			副作用：	食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛、発熱		
				ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、		
				掻痒感、infusion reaction		
大腸癌 (C18)	AADC-0110	Cetuximab + CPT-11 療法				
			セツキシマブ	初回 400mg/㎡ (2回目以降は250mg/㎡)	day1	週1回
			CPT-11	150mg/㎡ (75歳以上は120mg/㎡)	day1	2週ごと
			副作用：	ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、		
				掻痒感、infusion reaction、食欲不振、下痢、悪心・嘔吐		
				脱毛、疲労感、骨髄抑制		
大腸癌 (C18)	AADC-0115	Cetuximab				
			セツキシマブ	初回 400mg/㎡ (2回目以降は250mg/㎡)	day1	
			週1回			
			副作用：	ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、		
				掻痒感、infusion reaction、下痢		
大腸癌 (C18)	AADC-0134	XELOX 療法				
			カペシタビン	1日2回	14日間内服7日間休薬	
			体表面積	1.36㎡未満	1200mg/回	
				1.36以上1.66㎡未満	1500mg/回	
				1.66以上1.96㎡未満	1800mg/回	
				1.96㎡以上	2100mg/回	
			L-OHP	130mg/㎡	day1 3週ごと	
			副作用：	手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加		
				口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着		
大腸癌 (C18)	AADC-0135	Bevacizumab based XELOX 療法				
			ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1 3週ごと	
			カペシタビン	1日2回	14日間内服7日間休薬	
			体表面積	1.36㎡未満	1200mg/回	
				1.36以上1.66㎡未満	1500mg/回	
				1.66以上1.96㎡未満	1800mg/回	
				1.96㎡以上	2100mg/回	
			L-OHP	130mg/㎡	day1 3週ごと	
			副作用：	手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加		
				口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着		
				消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症		

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等			
			高血圧性クリーゼ			
大腸癌 (C18)	AADC-0136	IRIS(大腸)	CPT-11	125 mg/㎡	2週ごと	
			TS-1	80～120mg/body	2週投与2週休薬	
			副作用：	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹、脱毛		
大腸癌 (C18)	AADC-0140	Bevacizumab based XELODA 療法	ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1	3週ごと
			カペシタビン	1日2回	14日間内服7日間休薬	
				体表面積	1.36㎡未満	1200mg/回
					1.36以上1.66㎡未満	1500mg/回
					1.66以上1.96㎡未満	1800mg/回
					1.96㎡以上	2100mg/回
			副作用：	手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着 消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症 高血圧性クリーゼ		
大腸癌 (C18)	AADC-0146	Panitumumab	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	2週毎
			副作用：	infusion reaction、ざ瘡、皮膚乾燥、発疹、掻痒、爪周炎、低マグネシウム血症 疲労、口内炎、食欲不振、下痢、間質性肺疾患		
大腸癌 (C18)	AADC-0147	Panitumumab based FORFIRI療法	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	
			5-FU (bolus)	400mg/㎡	day1	
			5-FU (infusion)	2400mg/㎡	46～48hr	
			l-LV	200mg/㎡	day1	
			CPT-11	150mg/㎡ (76才以上は120mg/㎡)	day1	
			2週毎			
			副作用：	infusion reaction、ざ瘡、皮膚乾燥、発疹、掻痒、爪周炎、低マグネシウム血症 疲労、口内炎、食欲不振、下痢、間質性肺疾患、悪心・嘔吐、骨髄抑制 肝機能障害、脱毛		
大腸癌 (C18)	AADC-0148	Panitumumab based FOLFOX療法	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	
			L-OHP	85mg/㎡	day1	
			5-FU (bolus)	400mg/㎡	day1	
			5-FU (infusion)	2400mg/㎡	46～48hr	
			l-LV	200mg/㎡	day1	
			2週毎			
			副作用：	infusion reaction、ざ瘡、皮膚乾燥、発疹、掻痒、爪周炎、低マグネシウム血症 疲労、口内炎、食欲不振、下痢、間質性肺疾患、発熱 末梢神経障害、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐、倦怠感、		
大腸癌 (C18)	AADC-0168	Cetuximab based mFOLFOX6 療法	セツキシマブ	初回 400mg/㎡ (2回目以降は250mg/㎡)	day1	週1回
			L-OHP	85mg/㎡	day1	2週ごと
			5-FU (bolus)	400mg/㎡	day1	2週ごと
			5-FU (infusion)	2400mg/㎡	46～48hr	2週ごと
			l-LV	200mg/㎡	day1	2週ごと
			副作用：	ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、食欲不振、下痢、悪心・嘔吐、発熱 脱毛、疲労感、骨髄抑制、 末梢神経障害、注射部位反応、		
大腸癌 (C18) 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	AADC-0191	Regorafenib	レゴラフェニブ	1日1回160mgを3週間連日経口投与、その後1週間休薬 これを繰り返す		
			副作用：	手足症候群、TEN、Stevens-Johnson症候群、多形紅斑 肝機能障害、出血、血栓塞栓症、高血圧、高血圧クリーゼ、可逆性後白質脳症 消化管穿孔、下痢、食欲不振、口内炎、悪心・嘔吐、頻脈、発声障害、骨髄抑制		

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等			
			脱毛、掻痒、多汗症			
大腸癌 (C18) 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	AADC-0192	BV/SOX				
			ベバシズマブ	5mg/kg	day1	3週ごと
			L-OHP	130mg/m ²	day1	3週ごと
			TS-1	朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14 3週ごと		
			体表面積	1.25m ² 未満	40mg/回	
				1.25から1.5m ² 未満	50mg/回	
				1.5m ² 以上	60mg/回	
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック、消化管穿孔 創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ 可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、間質性肺炎 肝機能障害、脱毛、		
大腸癌 (C18)	AADC-0206	Trifluridine	トリフルリジン	1回35mg/m ² を1日2回		
			5日間連続経口投与した後2日間休薬し、これを2回繰り返した後 14日間休む			
			1コース28日間			
			副作用:	骨髄抑制、悪心、食欲減退、疲労、下痢、嘔吐、口内炎、感染症、間質性肺炎		
大腸癌 (C18)	AADC-0213	SOX	L-OHP	130mg/m ²	day1	3週ごと
			TS-1	朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14 3週ごと		
			体表面積	1.25m ² 未満	40mg/回	
				1.25から1.5m ² 未満	50mg/回	
				1.5m ² 以上	60mg/回	
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック		
大腸癌 (C18)	AADC-0214	Panitumumab+5-FU/LV	パニツムマブ	6mg/kg	day1	
			5-FU (bolus)	400mg/m ²	day1	
			5-FU (infusion)	2400mg/m ²	46～48hr	
			l-LV	200mg/m ²	day1	
			2週毎			
			副作用:	Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、低マグネシウム血症、口内炎 ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎 骨髄抑制、感染症、肝機能障害、手足症候群		
大腸癌 (C18)	AADC-0215	Cetuximab+5-FU/LV	セツキシマブ	初回 400mg/m ² (2回目以降は250mg/m ²)	day1	週1回
			5-FU (bolus)	400mg/m ²	day1	2週ごと
			5-FU (infusion)	2400mg/m ²	46～48hr	2週ごと
			l-LV	200mg/m ²	day1	2週ごと
			副作用:	Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、心不全、血栓塞栓症、口内炎 ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎 骨髄抑制、感染症、肝機能障害、手足症候群、低マグネシウム血症 末梢神経障害		
大腸癌 (C18)	AADC-0216	Panitumumab+CPT-11	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	
			CPT-11	150mg/m ² (76才以上は120mg/m ²)	day1	
			2週毎			
			副作用:	Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、低マグネシウム血症、口内炎 ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎 骨髄抑制、腸管穿孔、消化管出血、腸閉塞、末梢神経障害、脱毛 腎機能障害、血栓塞栓症		

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
大腸癌 (C18)	AADC-0223	bevacizumab+XELIRI	ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1
			CPT-11	200mg/㎡	day1
			XELODA	1600mg/㎡/日	day1～14
			3週毎		
			副作用:	infusion reaction、消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、高血圧性脳症	
				可逆性後白質脳症症候群、ネフローゼ症候群、骨髄抑制、感染症	
				うつ血性心不全、間質性肺炎、神経障害、食欲減退、悪心、口内炎	
				脱毛、下痢、手足症候群、腎障害、色素沈着	
大腸癌 (C18)	AADC-0228	Bevacizumab + FOLFOXIRI	ベバシズマブ	5mg/kg	day1
			5-FU (infusion)	3200mg/㎡	46hr
			I-LV	200mg/㎡	day1
			L-OHP	85mg/㎡	day1
			CPT-11	165mg/㎡	day1
			2週毎		
			副作用:	骨髄抑制、下痢、悪心、嘔吐、口内炎、無力症、末梢神経障害	
				高血圧、静脈血栓塞栓症、アナフィラキシー反応、間質性肺炎	
大腸癌 (C18)	AADC-0229	Capecitabine + IMRT	カペシタビン	1日2回	週5日
			体表面積	1.31㎡未満	900mg/回
				1.31以上1.64㎡未満	1200mg/回
				1.64以上	1500mg/回
			トモセラピー	2Gy/day	day1-5実施、day6-7中止
				最大50Gy	(2Gy×25回 5週間)
			副作用:	骨髄抑制、手足症候群、下痢、悪心・嘔吐、口内炎、腹痛	
				疲労、無力症、脱毛、皮膚の発赤、掻痒感	
大腸癌 (C18)	AADC-0230	RAM + FOLFIRI	ラムシルマブ	8mg/kg	day1
			5-FU (bolus)	400mg/㎡	day1
			5-FU (infusion)	2400mg/㎡	day1～3
			I-LV	200mg/㎡	day1
			CPT-11	150mg/㎡	day1
			2週毎		
			副作用:	食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛	
				口内炎、鼻出血、高血圧、動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症	
大腸癌 (C18) 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	AADC-0259	bevacizumab+S-1(3週毎)	ラムシルマブ	8mg/kg	day1
			5-FU (bolus)	400mg/㎡	day1
			5-FU (infusion)	2400mg/㎡	day1～3
			I-LV	200mg/㎡	day1
			CPT-11	150mg/㎡	day1
			2週毎		
			副作用:	食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛	
				口内炎、鼻出血、高血圧、動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症	
大腸癌 (C18) 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	AADC-0259	bevacizumab+S-1(3週毎)	ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1 3週ごと
			TS-1	朝食後および夕食後の1日2回	day1～day14 3週ごと
			体表面積	1.25㎡未満	40mg/回
				1.25から1.5㎡未満	50mg/回
				1.5㎡以上	60mg/回
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹	
				消化管穿孔、肝機能障害	
				創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ	
大腸癌 (C18) 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	AADC-0260	bevacizumab+S-1(4週毎)	ベバシズマブ	5mg/kg	day1、15
			TS-1	朝食後および夕食後の1日2回	day1～day14
			体表面積	1.25㎡未満	40mg/回
				1.25から1.5㎡未満	50mg/回
				1.5㎡以上	60mg/回

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
				消化管穿孔、肝機能障害
				創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ
				可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、間質性肺炎
大腸癌 (C18) 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	AADC-0261	bevacizumab+IRIS	ベバシズマブ	5mg/kg day1、15
			CPT-11	150mg/m ² day1、15
			TS-1	朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14
			体表面積 1.25m ² 未満	40mg/回
			1.25から1.5m ² 未満	50mg/回
			1.5m ² 以上	60mg/回
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
				末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック、消化管穿孔
				創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ
				可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、間質性肺炎
				肝機能障害、脱毛
大腸癌 (C18) MSI-high	AADC-0252	Nivolumab+Ipilimumab	Nivolumab	240mg/body
			Ipilimumab	1mg/kg
			3週毎4コースまで	
			5コースから	
			Nivolumab	240mg/body 2週毎 又は 480mg/body 4週毎
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
				血球貪食症候群、結核
大腸癌 (C18)	AADC-0284	Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab	Cetuximab	初回 400mg/m ² (2回目以降は250mg/m ²)を週1回
			Encorafenib	1回300mg 1日1回経口投与
			Binimetinib	1回45mg 1日2回経口投与
			副作用:	ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、
				掻痒感、infusion reaction、下痢、悪心嘔吐、疲労
				手足症候群、眼障害、心機能障害、肝障害、横紋筋融解症
大腸癌 (C18)	AADC-0285	Encorafenib+Cetuximab	Cetuximab	初回 400mg/m ² (2回目以降は250mg/m ²)を週1回
			Encorafenib	1回300mg 1日1回経口投与
			副作用:	ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、
				掻痒感、infusion reaction、下痢、悪心嘔吐、疲労
				皮膚悪性腫瘍、手足症候群、眼障害、横紋筋融解症
大腸癌 (C18) Her2陽性大腸癌 RAS野生型	AADC-0303	Pertuzumab+Trastuzumab(Her2陽性大腸癌)	Pertuzumab	初回840mg/body 2回目以降420mg/body day1
			Trastuzumab	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg day1
			3週ごと	
			副作用:	インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感
				間質性肺炎,悪心、口内炎
大腸癌 (C18)	AADC-0317	Bevacizumab+Trifluridine	ベバシズマブ	5mg/kg day1、15
			トリフルリジン	1回35mg/m ² を1日2回
				5日間連続経口投与した後2日間休薬し、これを2回繰り返した後
				14日間休む
				1コース28日間
			副作用:	骨髄抑制、悪心、食欲減退、疲労、下痢、嘔吐、口内炎、感染症、間質性肺炎
				創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等			
大腸癌 (C18)	AADC-0321	bi weekly cetuximab	セツキシマブ	500mg/㎡	day1	
			2週毎			
			副作用:	ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、下痢		
大腸癌 (C18)	AADC-0322	bi weekly cetuximab+mFOLFOX6	セツキシマブ	500mg/㎡	day1	
			L-OHP	85mg/㎡	day1	
			5-FU (bolus)	400mg/㎡	day1	
			5-FU (infusion)	2400mg/㎡	46～48hr	
			l-LV	200mg/㎡	day1	
			2週毎			
			副作用:	ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、食欲不振、下痢、悪心・嘔吐、発熱 脱毛、疲労感、骨髄抑制、末梢神経障害、注射部位反応、		
大腸癌 (C18)	AADC-0323	bi weekly cetuximab+FOLFIRI	セツキシマブ	500mg/㎡	day1	
			CPT-11	150mg/㎡ (75歳以上は120mg/㎡)	day1	
			l-LV	200mg/㎡	day1	
			5-FU (bolus)	400mg/㎡	day1	
			5-FU (infusion)	2400mg/㎡	46～48hr	
			2週毎			
			副作用:	食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛、発熱 ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction		
大腸癌 (C18)	AADC-0324	bi weekly cetuximab+5FU+l-LV	セツキシマブ	500mg/㎡	day1	
			5-FU (bolus)	400mg/㎡	day1	
			5-FU (infusion)	2400mg/㎡	46～48hr	
			l-LV	200mg/㎡	day1	
			2週毎			
			副作用:	Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、心不全、血栓塞栓症、口内炎 ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎 骨髄抑制、感染症、肝機能障害、手足症候群、低マグネシウム血症		
大腸癌 (C18)	AADC-0329	Cetuximab+CPT-11(bi-weekly)	セツキシマブ	500mg/㎡	day1	
			CPT-11	150mg/㎡ (76才以上は120mg/㎡)	day1	
			2週毎			
			副作用:	Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、低マグネシウム血症、口内炎 ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎 骨髄抑制、腸管穿孔、消化管出血、腸閉塞、末梢神経障害、脱毛 腎機能障害、血栓塞栓症		
大腸癌 (C18)	AADC-0330	IRIS+bev(TRICOLORE)	ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1	
			CPT-11	150mg/㎡	day1	
			TS-1	朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14		
			体表面積	1.25㎡未満	40mg/回	
				1.25から1.5㎡未満	50mg/回	
				1.5㎡以上	60mg/回	
			3週毎			
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック、消化管穿孔 創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ 可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、間質性肺炎 肝機能障害、脱毛		

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
大腸癌 (C18) Her2陽性大腸癌 RAS野生型	AADC-0344	PHESGO	ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として	
			初回 (IN)	それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1
			2回目以降 (MA)	それぞれ 600mg、600mg、20000U day1
			初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与	
			3週ごと	
			副作用：	インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感
大腸癌 (C18)	AADC-0356	Bevacizumab+mFOLFOXIRI	間質性肺炎,悪心、口内炎	
			ベバシズマブ	5mg/kg day1
			5-FU (infusion)	2400mg/m ² 46hr
			I-LV	200mg/m ² day1
			L-OHP	85mg/m ² day1
			CPT-11	150mg/m ² day1
			2週毎	
			副作用：	骨髄抑制、下痢、悪心、嘔吐、口内炎、無力症、末梢神経障害
			高血圧、静脈血栓塞栓症、アナフィラキシー反応、間質性肺炎	
			腸管穿孔、創傷治癒遅延、白質脳症	
大腸癌 (C18) がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発大腸癌	AADC-0364	Fruquintinib	フルキンチニブ	1日1回 5mgを3週間連日経口投与、その後1週間休薬 これを繰り返す
			副作用：	手足症候群、蛋白尿、創傷治癒遅延、甲状腺機能低下症、動脈解離
			肝機能障害、出血、血栓塞栓症、高血圧、高血圧クリーゼ、可逆性後白質脳症	
			消化管穿孔、下痢、食欲不振、口内炎、悪心・嘔吐、頻脈、発声障害、骨髄抑制	
大腸癌 (C18) がん化学療法後に増悪したKRAS G12C変異陽性の 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	AADC-0378	Sotorasib+Panitumumab	ソトラシブ	1日1回 960mg (8錠)を連日経口投与
			パニツムマブ	6mg/kg 点滴静注 2週毎
			副作用：	食欲不振、悪心、嘔吐、下痢
			肝機能障害、間質性肺疾患	
			infusion reaction、ざ瘡、皮膚乾燥、発疹、掻痒、爪周炎	
			疲労、口内炎、低マグネシウム血症	
肛門管癌 (C21.1)	AADC-0196	5-FU+MMC+RT	5-FU (infusion)	1000mg/m ² /day day1～4 29～32
			MMC(bolus)	10mg/m ² /day day1,29
			RT	1.8Gy/day 週5回 計33回 総線量 59.4Gy
			副作用：	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、全身倦怠感、体重減少、脱毛、口内炎
			出血傾向、溶血性尿毒症症候群、腎障害、間質性肺炎、下痢、色素沈着	
			肝機能障害、アナフィラキシーショック、白質脳症、うつ血性心不全、手足症候群	
			食道炎、	
肝癌 (C22)	AADC-0017	Epirubicin 肝動注		
			1日60mg/m ² を動脈内投与	
肝癌 (C22)	AADC-0141	Miriplatin肝動注	副作用：	骨髄抑制、食欲不振、脱毛、悪心・嘔吐
			1日1回70mg を肝動脈内投与 (1回120mgを上限)	
			繰り返し投与する場合は4週間以上の観察期間をおく	
			副作用：	肝機能障害、骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、発熱、投与部位の疼痛
肝癌 (C22)	AADC-0160	Sorafenib	腎機能障害、全身倦怠感	
			用法・用量	1回400mg 1日2回 経口投与 適宜増減
			副作用：	手足症候群。剥脱性皮膚炎、発疹、脱毛、下痢、高血圧、疲労
			食欲不振、そう痒感、体重減少、肝機能障害、出血	
			間質性肺炎、急性肺障害、高血圧クリーゼ、可逆性後白室脳症	

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
			皮膚粘膜眼症候群、消化管穿孔、心筋虚血・心筋梗塞	
肝癌 (C22)	AADC-0240	Lenvatinib	用法・用量	体重60kg以上 1日1回12mg経口投与 体重60kg未満 1日1回8mg経口投与
			副作用：	高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労 口内炎、蛋白尿、手掌・足底発赤知覚不全症候群、出 動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔 可逆性後白質脳症症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延 低カルシウム血症
肝癌 (C22) 切除不能肝細胞癌	AADC-0293	Atezolizumab+Bevacizumab	アテゾリズマブ	1200mg day1
			ベバシズマブ	15mg/kg day1 3週ごと
			副作用：	疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害 消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧
肝癌 (C22) 進行再発肝細胞癌	AADC-0327	Durvalumab+Tremelimumab	Durvalumab	1500mg (体重30kg以下の場合は20mg/kg) 4週間隔
			Tremelimumab	300mg (体重30kg以下の場合は4mg/kg) 初回単回のみ
			副作用：	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
肝癌 (C22) 進行再発肝細胞癌	AADC-0348	Durvalumab	Durvalumab	1500mg/body day1 体重30kg以下の場合は1回20mg/kg
			4週毎	
			副作用：	間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー
肝癌 (C22) がん化学療法後に増悪した切除不能な肝細胞癌	AADC-0278	Cabozantinib	カボザンチニブ	1回60mg 1日1回空腹時
			副作用：	高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労 口内炎、蛋白尿、手足症候群、横紋筋融解症 動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔 可逆性後白質脳症症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延 低カルシウム血症
肝癌 (C22) 切除不能肝細胞癌	AADC-0309	Nivolumab+ipilimumab	Nivolumab	80mg/body
			Ipilimumab	3mg/kg
			3週毎 4回投与後、Nivolumab 240mg/bodyを2週毎、又は480mg/bodyを4週毎 で継続	
			副作用：	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 肝機能障害、肝炎、血球貪食症候群、結核
胆道癌 (C22～24)	AADC-0001	S-1(CG)	用法	a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法 (副作用の軽減を目的)
			用量	朝食後および夕食後の1日2回
			体表面積 1.25㎡未満	40mg/回
			1.25から1.5㎡未満	50mg/回
			1.5㎡以上	60mg/回

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
胆道癌 (C22～24)	AADC-0015	GEM		
			GEM	1000 mg/ m ² を週1回 3回投与 1週休薬
				1000 mg/ m ² を2週間に1回
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感
胆道癌 (C22～24)	AADC-0163	GC療法		
			GEM	1000mg/ m ² day1.8
			CDDP	25mg/ m ² day1.8
			1クール:3週	
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱
胆道癌 (C22～24)	AADC-0320	Durvalumab+GEM+CDDP	Durvalumab	1500mg/body day1
			GEM	1000mg/ m ² day1.8
			CDDP	25mg/ m ² day1.8
			1クール:3週	
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱
				間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病
				肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー
胆道癌 (C22～24)	AADC-0347	GCS	GEM	1000mg/ m ² day1
			CDDP	25mg/ m ² day1
			S-1	80mg/ m ² day1-7
			1クール:2週	
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱
				下痢、色素沈着、発疹
胆道癌 (C22～24)	AADC-0352	Pembrolizumab+GEM+CDDP	Pembrolizumab	200mg/body day1
			GEM	1000mg/ m ² day1.8
			CDDP	25mg/ m ² day1.8
			1クール:3週	CDDPは最大8クールまで、以降Pembrolizumab+GEM or Pembrolizumab単剤で継続
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱
				間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病
				肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー
膵癌 (C25)	AADC-0001	S-1(CG)		
			用法	a.4週投与 2週休薬法
				b.2週投与 1週休薬法 (副作用の軽減を目的)
			用量	朝食後および夕食後の1日2回
			体表面積 1.25 m ² 未満	40mg/回
			1.25から1.5 m ² 未満	50mg/回
			1.5 m ² 以上	60mg/回
膵癌 (C25)	AADC-0015	GEM		
			GEM	1000 mg/ m ² を週1回 3回投与 1週休薬
				1000 mg/ m ² を2週間に1回
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
膵癌 (C25)	AADC-0143	GEM +IMRT療法			
			GEM	1000 mg/ m ² を週1回	3回投与 1週休薬
			放射線照射	1.8Gy×28Fr	total50.4Gy
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感	
膵癌 (C25)	AADC-0159	Erlotinib+GEM療法			
			Erlotinib	100mg/day	連日経口投与
			GEM	1000 mg/ m ² を週1回	3回投与 1週休薬
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、ざ瘡様皮疹等の発疹、悪心・嘔吐、下痢	
膵癌 (C25) 治癒切除不能膵癌	AADC-0200	FOLFIRINOX			
			L-OHP	85mg/ m ²	day1
			5-FU (bolus)	400mg/ m ²	day1
			5-FU (infusion)	2400mg/ m ²	46hr
			l-LV	200mg/ m ²	day1
			CPT-11	180mg/ m ²	day1
			2週ごと		
			副作用:	末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐、倦怠感、下痢	
膵癌 (C25) 治癒切除不能膵癌	AADC-0212	GEM+nab-PTX			
			GEM	1000mg/ m ²	day1
			nab-PTX	125mg/ m ²	day1
			3週投与1週休薬		
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感	
膵癌 (C25) BRCA遺伝子変異陽性、プラチナ製剤を含む化学療法後に疾患進行が認められていない膵癌	AADC-0248	Olaparib			
			副作用:	悪心、嘔吐、味覚異常	
				貧血、好中球減少、血小板減少、リンパ球減少	
				疲労、無力症、間質性肺炎	
				下痢、頭痛	
膵癌 (C25) 切除可能膵癌術前	AADC-0256	GEM+S-1(膵癌NAC)			
			GEM	1000 mg/ m ²	day1.day8 30分かけて点滴静注
			S-1	体表面積毎(80mg～120mg)	14日間 分2で内服
				(day1の夕方からday15の朝まで)	
				これを2コース繰り返す。	
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感	
膵癌 (C25) 治癒切除不能膵癌	AADC-0318	NaI-IRI+5FU/LV			
			Lipospmal Irinotecan	70mg/ m ²	day1
			5-FU (infusion)	2400mg/ m ²	day1～3
			l-LV	200mg/ m ²	day1
			2週毎		
膵癌 (C25) 治癒切除不能膵癌	AADC-0014	mFOLFOX6療法			
			副作用:	食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、肝機能障害、脱毛	
				倦怠感、好中球減少、貧血、低カリウム血症	
膵癌 (C25) 治癒切除不能膵癌	AADC-0014	mFOLFOX6療法	L-OHP	85mg/ m ²	day1
			5-FU (bolus)	400mg/ m ²	day1
			5-FU (infusion)	2400mg/ m ²	46hr

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
			1-LV	200mg/㎡ day1
			2週ごと	
			副作用:	末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐、倦怠感、下痢 発熱、肝機能障害
膵内分泌腫瘍 (C25.4)	AADC-0169	Everolimus	Everolimus	10mg/day 連日経口投与
			副作用:	口内炎、発疹、下痢、疲労、末梢性浮腫、悪心・嘔吐、食欲不振 鼻出血、貧血、味覚障害、体重減少、頭痛、掻痒症、高血糖 血小板減少、無力症、間質性肺炎、腎不全、アナフィラキシー様症状 急性呼吸窮迫症候群、肺塞栓症、深部静脈血栓症、好中球減少 悪性腫瘍(二次発癌)、皮膚乾燥、爪の障害、心嚢液貯留 進行性多巣性白室脳症、BKウィルス腎症、細胞蛋白症
消化管神経内分泌腫瘍 (C26.9)	AADC-0188	サントスタチンLAR	サントスタチンLAR	1回30mgを4週毎に臀部筋肉内に注射
			副作用:	注射部位硬結、注射部位疼痛、胆石症、下痢
膵・消化管神経内分泌腫瘍 (C25.4、C26.9)	AADC-0257	Lanreotide	Lanreotide	1回120mgを4週毎に深部皮下内に注射
			副作用:	注射部位硬結、注射部位疼痛、徐脈 胆石症、下痢、白色便
膵・消化管神経内分泌腫瘍 (C25.4、C26.9)	AADC-0277	Streptozocin	Streptozocin	1000 mg/㎡ 1週間毎 30分かけて点滴静注
			副作用:	腎障害、骨髄抑制、耐糖能異常、肝障害 血管痛、悪心、便秘、味覚異常、倦怠感
肺癌 (C34)	AADC-0001	S-1(CG)		
非小細胞肺癌			用法	a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的)
			用量	朝食後および夕食後の1日2回 体表面積 1.25㎡未満 40mg/回 1.25から1.5㎡未満 50 mg/回 1.5㎡以上 60mg/回
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
肺癌 (C34)	AADC-0010	UFT(UFTE)		
非小細胞肺癌			用法・用量	1日量としてテガフル300-600mgを1日2-3回に分割投与
			副作用:	食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
肺癌 (C34)	AADC-0015	GEM		
非小細胞肺癌			GEM	1000 mg/㎡を週1回 3回投与 1週休薬
				1000 mg/㎡を2週間に1回
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感
肺癌 (C34)	AADC-0019	PTX + CBDCA療法(TC)		
非小細胞肺癌			PTX 200mg/㎡ day1	
			CBDCA 目標AUC=6 day1	
			3週ごと	
			副作用:	脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、 肝機能障害
肺癌 (C34)	AADC-0020	DTX + CDDP療法(DC)		
非小細胞肺癌			DTX	60mg/㎡ day1

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
			CDDP	80mg/㎡	day1
			3～4週ごと		
			副作用:	悪心・嘔吐、腎機能障害、神経毒性、聴覚障害、電解質異常、 浮腫、倦怠感 味覚異常、爪の変形、骨髄抑制、脱毛	
肺癌 (C34)	AADC-0022	Iressa			
非小細胞肺癌			250mgを1日1回経口投与		
			副作用:	下痢、皮膚乾燥症、ニキビ様皮疹、肝機能障害、間質性肺炎	
肺癌 (C34)	AADC-0025	CPT-11			
非細胞肺癌			CPT-11	100mg/㎡	day1.8.15
			1週間隔で3回投与、1週休薬		
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、間質性肺炎	
肺癌 (C34)	AADC-0091	tri-weekly DTX			
非小細胞肺癌			DTX	60mg/㎡	day1
			3週ごと		
			副作用:	脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害	
肺癌 (C34)	AADC-0098	CPT-11+CDDP療法(IP)			
非小細胞肺癌			CDDP	80mg/㎡	day1
			CPT-11	60mg/㎡	day1.8.15
			4週ごと		
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、倦怠感、腎機能障害、下痢、間質性肺炎、食欲不振 末梢神経障害、脱毛、	
肺癌 (C34)	AADC-0106	Tarceva			
非小細胞肺癌			エルロチニブ	150mg	1日1回経口投与
			副作用:	発疹、下痢、皮膚乾燥、掻痒感、間質性肺疾患、肝機能障害	
肺癌 (C34)	AADC-0111	VNR			
非小細胞肺癌			ビンレルビン	25mg/㎡	day1.8
			3週ごと(4クール以上、最大6クール)		
肺癌 (C34)	AADC-0114	Pemetrexed+ CDDP療法			
非小細胞肺癌			Pemetrexed	500mg/㎡	day1
			CDDP	75mg/㎡	day1
			3週毎		
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、倦怠感、口内炎、神経障害	
肺癌 (C34)	AADC-0119	CDDP+VNR+IMRT療法			
非小細胞肺癌			CDDP	80mg/㎡	day1
			VNR	20mg/㎡	day1、8
			3週ごと		
			放射線療法	2Gy/日	5回/週 計6週30回60Gy (化学療法1コース目のday3から開始
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、間質性肺炎、食欲不振、口内炎、倦怠感 腎機能障害	
肺癌 (C34)	AADC-0149	Bevacizumab based TC療法			
非小細胞肺癌			PTX	200mg/㎡	day1
			CBDCA	目標AUC=6	day1
			ベバシズマブ	15mg/kg	day1 3週ごと
			CBDCA+PTX+ベバシズマブを3週間間隔で4～6サイクル実施後、アバスチン単独を		
			3週間間隔で投与する		
			副作用:	脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、 肝機能障害、高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、咯血、肺出血、血栓塞栓症	
肺癌 (C34)	AADC-0151	CDDP+VNR療法			

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
非小細胞肺癌			CDDP	80mg/㎡	day1
			VNR	25mg/㎡	day1、8
			3週ごと	4コース	
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、間質性肺炎、食欲不振、口内炎、倦怠感 腎機能障害	
肺癌 (C34)	AADC-0170	Pemetrexed			
非小細胞肺癌			Pemetrexed	500mg/㎡	day1
			3週毎	4コース	
			副作用:	肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心	
肺癌 (C34)	AADC-0180	CBDCA+Pemetrexed			
非小細胞肺癌			Pemetrexed	500mg/㎡	day1
			CBDCA	目標AUC=6	day1
			3週毎	4コース	
			副作用:	肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり	
肺癌 (C34)	AADC-0176	Crizotinib			
ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行再発非小細胞肺癌			Crizotinib	1回250mg1日2回内服	
ROS1融合遺伝子陽性の切除不能な進行再発非小細胞肺癌			副作用:	悪心・嘔吐、視力障害、下痢、便秘、末梢性浮腫、間質性肺炎 肝機能障害、QT間隔延長、骨髄抑制	
肺癌 (C34)	AADC-0181	PEM+CBDCA+BV followed by PEM+BV			
進行性非扁平非小細胞肺癌			Pemetrexed	500mg/㎡	day1
			CBDCA	目標AUC=6	day1
			ベバシズマブ	15mg/kg	day1
			3～4週毎4コース後 CR、PR、SDなら維持療法へ		
			維持療法		
			Pemetrexed	500mg/㎡	day1
			ベバシズマブ	15mg/kg	day1
			3週毎PDになるまで継続		
			副作用:	肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり 高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、喀血、肺出血、血栓塞栓症	
	肺癌 (C34)	AADC-0186	CBDCA+S-1療法		
非小細胞肺癌			CBDCA	目標AUC=5	day1
			TS-1	80～120mg/body	day1～14
			3週毎		
			副作用	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 神経障害、関節痛、脱毛	
肺癌 (C34)	AADC-0189	IMRT+CBDCA			
非小細胞肺癌			CBDCA	30mg/㎡	day1～day5
			IMRT	2Gy/日	day1～day5
			1週毎		
			CBDCAは4週間実施、IMRTは6週間実施		
			副作用:	嘔気・嘔吐、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、発熱、骨髄抑制、肝機能障害 アナフィラキシー様症状、間質性肺炎、急性腎不全、肝不全、 消化管壊死、消化管出血、出血性腸炎、偽膜性大腸炎、麻痺性イレウス 脳梗塞、肺梗塞、血栓・塞栓症、心筋梗塞、うっ血性心不全、溶血性尿毒症症候群 急性呼吸窮迫症候群、DIC、急性膵炎、難聴、皮膚炎、放射線肺炎、放射線食道炎 脊髄症	
肺癌 (C34)	AADC-0194	nab-paclitaxel + Carboplatin			

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
非小細胞肺癌			アブラキサン	100mg/㎡ day1, 8, 15
			CBDCA	目標AUC=6/body day1
			4週毎	
			副作用:	脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹
				食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、脳神経麻痺、アナフィラキシー
				間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全
				難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群
				急性腎不全、白質脳症、
肺癌 (C34)	AADC-0201	AVAPERL	Pemetrexed	500mg/㎡ day1
非小細胞肺癌			CDDP	75mg/㎡ day1
			ベバシズマブ	7.5mg/kg day1
			3週毎4コース後	SDもしくはresponse(+)なら維持療法へ
			維持療法	
			Pemetrexed	500mg/㎡ day1
			ベバシズマブ	7.5mg/kg day1
			3週毎PDになるまで継続	
			副作用:	腎機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感
				下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり
				高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、喀血、肺出血、血栓塞栓症
肺癌 (C34)	AADC-0202	S-1+CDDP+RT	CDDP	60mg/㎡ day1
局所進行非小細胞肺癌			TS-1	1回40mg/㎡ 1日2回 day1～14
			4週毎2コース施行中に放射線治療施行	
			1回2Gy 週5日 30回照射 計60Gy (6週間)	
			上記化学放射線療法終了後2週間後から	
			CDDP	60mg/㎡ day1
			TS-1	1回40mg/㎡ 1日2回 day1～14
			4週毎2コース施行	
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
肺癌 (C34)	AADC-0204	Afatinib	Afatinib	1日1回40mg経口投与
EGFR遺伝子変異陽性の手術不能または再発 非小細胞肺癌				患者の状態により適宜増減 1日50mgまで
			副作用:	下痢、発疹、爪囲炎、口内炎、間質性肺炎、皮膚障害、肝機能障害
				鼻出血、食欲減退、疲労、粘膜の炎症、体重減少、味覚異常
				結膜炎、心障害
肺癌 (C34)	AADC-0010	UFT(UFTE)		
小細胞肺癌			用法・用量	1日量としてテガフル300-600mgを1日2-3回に分割投与
			副作用:	食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
肺癌 (C34)	AADC-0023	CBDCA+ETP療法(CE)		
小細胞肺癌			VP-16	80mg/㎡ day1～3
			CBDCA	目標AUC=5/body day1
			3～4週ごと	
			副作用:	骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振
肺癌 (C34)	AADC-0024	CPT-11+ CDDP療法(IP)		
小細胞肺癌			CDDP	60mg/㎡ day1
			CPT-11	60mg/㎡ day1.8.15
			4週ごと	
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、倦怠感、腎機能障害、下痢、間質性肺炎、食欲不振
				末梢神経障害、脱毛、
肺癌 (C34)	AADC-0025	CPT-11		

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等			
小細胞肺癌			CPT-11	100mg/m ²	day1.8.15	
			1週間隔で3回投与、2週休薬			
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、間質性肺炎		
肺癌 (C34)	AADC-0100	PE(CDDP+ETP)+IMRT療法				
小細胞肺癌			CDDP	80mg/m ²	day1	
			VP-16	100mg/m ²	day1～3	
			3～4週ごと	4コース		
			副作用:	骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振		
肺癌 (C34)	AADC-0137	AMR				
			AMR	35～40mg/m ²	3日間連続投与	
			3週ごと	3～6コース		
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、脱毛、肝機能障害、発熱		
肺癌 (C34)	AADC-0145	GC療法				
			GEM	1000mg/m ²	day1.8	
			CDDP	80mg/m ²	day1	
			3週毎	4～6コース		
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱		
肺癌 (C34)	AADC-0176	Crizotinib				
ALK陽性・ROS1陽性肺癌			クリゾチニブ	1回250mgを1日2回経口投与		
			副作用:	間質性肺疾患、肝機能障害、QT間隔延長、徐脈		
				血液障害、心不全、発疹、便秘、口内炎、悪心		
				腎機能障害、倦怠感、筋肉痛、光線過敏性		
肺癌 (C34)	AADC-0177	CDDP+VP-16				
CPT-11が使用できない進展型小細胞肺癌			CDDP	80mg/m ²	day1	
			VP-16	100mg/m ²	day1～3	
			副作用:	骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振		
肺癌 (C34)	AADC-0210	Alectinib				
			アレクチニブ	1回300mg1日2回経口投与		
			副作用:	間質性肺疾患、肝機能障害、骨髄抑制、消化管穿孔		
				血栓塞栓症、味覚異常、発疹、便秘、口内炎、悪心		
				腎機能障害、倦怠感、筋肉痛、光線過敏性		
肺癌 (C34)	AADC-0211	Erlotinib+Bevacizumab併用療法				
EGFR遺伝子変異陽性肺癌			ベバシズマブ	15mg/kg	3週間毎	
			エルロチニブ	100～150mg	1日1回経口投与	
			副作用:	発疹、下痢、皮膚乾燥、掻痒感、肝機能障害、神経毒性、食欲減退		
				口内炎、嘔吐、高血圧、脱毛、関節痛、疲労、倦怠感、卵巣機能不全		
			重大な副作用:	ショック、アナフィラキシー、消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血		
				血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧クレーゼ、可逆性後白質脳症症候群		
				ネフローゼ症候群、骨髄抑制、感染症、うつ血性心不全、間質性肺炎		
				血栓性微小血管症、		
肺癌 (C34)	AADC-0225	Nivolumab				
切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌			ニボルマブ	240mg/body	2週間隔	
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症		
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害		
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション		
肺癌 (C34)	AADC-0231	Osimertinib				
			タグリッソ	1日1回80mg		
			副作用:	発疹、ざ瘡、下痢、皮膚乾燥、爪の障害、間質性肺炎、QT間隔延長		
				骨髄抑制、肝機能障害		
肺癌 (C34)	AADC-0232	RAM+DTX				
非小細胞肺癌			RAM	10mg/kg	day1	3週ごと
			DTX	60mg/m ²	day1	3週ごと

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
			副作用:	腹痛、高血圧、下痢、 動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害 インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血 骨髄抑制、低カリウム血症、低ナトリウム血症 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、
肺癌 (C34)	AADC-0235	Pembrolizumab	ペムブロリズマブ	1回200mg 3週間隔
PD-L1陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌			副作用:	骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症
PD-L1陽性の未治療非小細胞肺癌				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
肺癌 (C34)	AADC-0237	Ceritinib	セリチニブ	1日1回750mg空腹時に経口投与
			副作用:	間質性肺炎、肝機能障害、QT間隔延長、徐脈、下痢 高血糖、眼障害、皮下組織障害、胃腸障害、疲労 腎及び尿路障害
肺癌 (C34)	AADC-0241	Atezolizumab	アテゾリズマブ	1200mg day1 3週ごと
切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌			副作用:	疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害
肺癌 (C34)	AADC-0243	Lorlatinib	ロルラチニブ	1日1回100mgを経口投与
			副作用:	間質性肺炎、肝機能障害、QT間隔延長、徐脈、下痢 膵炎、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症 末梢性ニューロパチー
肺癌 (C34)	AADC-0245	CBDCA+PEM+Pembrolizumab→PEM+Pembrolizumab		
進行性非扁平上皮非小細胞肺癌			Pemetrexed	500mg/m ² day1
			CBDCA	目標AUC=5 day1
			Pembrolizumab	200mg/body day1
			3週毎4コース後 維持療法へ	
			維持療法	
			Pemetrexed	500mg/m ² day1
			Pembrolizumab	200mg/body day1
			3週毎	
			副作用:	肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
肺癌 (C34)	AADC-0246	CBDCA+nab-PTX+Pembrolizumab→Pembrolizumab		
扁平上皮癌			アブラキサン	100mg/m ² day1, 8, 15
			CBDCA	目標AUC=6/body day1
			Pembrolizumab	200mg/body day1
			3週毎4コース後 維持療法へ	
			維持療法	

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
			Pembrolizumab	200mg/body day1
			3週毎	
			副作用:	脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹
				食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー
				間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全
				難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群
				急性腎不全、白質脳症、
				大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病
				膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
肺癌 (C34)	AADC-0247	CBDCA+PTX+Bevacizumab+Atezolizumab→Bevacizumab+Atezolizumab維持療法		
非扁平上皮非小細胞肺癌			PTX 200mg/m ²	day1
			CBDCA 目標AUC=6	day1
			ベバシズマブ	15mg/kg day1
			アテゾリズマブ	1200mg/body day1
			3週毎4-6コース後	維持療法へ
			維持療法	
			ベバシズマブ	15mg/kg day1
			アテゾリズマブ	1200mg/body day1
			3週毎	
			副作用:	脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、悪心・嘔吐
				疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢
				間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病
				甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎
				髄膜炎、神経障害
肺癌 (C34)	AADC-0254	CBDCA+VP-16+Atezolizumab f/b Atezolizumab		
小細胞肺癌			VP-16 100mg/m ²	day1～3
			CBDCA 目標AUC=5	day1
			アテゾリズマブ	1200mg/body day1
			3週毎4コース後	維持療法へ
			維持療法	
			アテゾリズマブ	1200mg/body day1
			3週毎	
			副作用:	骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振
				疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢
				間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病
				甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎
				髄膜炎、神経障害
肺癌 (C34)	AADC-0262	CBDCA+PEM+Atezolizumab→PEM+Atezolizumab		
進行性非扁平上皮非小細胞肺癌			Pemetrexed	500mg/m ² day1
			CBDCA	目標AUC=6 day1
			Atezolizumab	1200mg/body day1
			3週毎4-6コース後	維持療法へ
			維持療法	
			Pemetrexed	500mg/m ² day1
			Atezolizumab	1200mg/body day1
			3週毎	
			副作用:	肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感
				下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり
				大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病
				膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
肺癌 (C34) HER2遺伝子変異陽性 非小細胞肺癌	AADC-0264	Trastuzumab Deruxtecan	Trastuzumab Deruxtec	5.4mg/kg	day1
			3週ごと		
			副作用:	間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション	
			骨髄抑制、脱毛、疲労、悪心・嘔吐、下痢、便秘、口内炎		
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0268	Pembrolizumab(6週間)	ペムブロリズマブ	1回400mg	6週間隔
			副作用:	骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症	
			甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐		
			口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害		
			肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害		
			膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎		
肺癌 (C34) 小細胞肺癌	AADC-0270	CDDP+VP-16+Durvalumab→維持療法Durvalumab	VP-16	80-100mg/m ²	day1～3
			CDDP	75-80mg/m ²	day1
			Durvalumab	1500mg/body	day1
			3週毎4コース後 維持療法へ		
			維持療法		
			Durvalumab	1500mg/body	day1
			4週毎		
			副作用:	骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振	
			腎機能障害、疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢		
			間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病		
			甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎		
			髄膜炎、神経障害		
			肺癌 (C34) 小細胞肺癌	AADC-0271	CBDCA+VP-16+Durvalumab→維持療法Durvalumab
CBDCA	目標AUC=5-6	day1			
Durvalumab	1500mg/body	day1			
3週毎4コース後 維持療法へ					
維持療法					
Durvalumab	1500mg/body	day1			
4週毎					
副作用:	骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振				
疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢					
間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病					
甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎					
髄膜炎、神経障害					
肺癌 (C34) 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	AADC-0272	4週毎 Nivolumab			
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害		
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション		
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0274	Ipilimumab+Nivolumab	Ipilimumab	1mg/kg	6週間隔
			Nivolumab	360mg/body	3週間隔
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害		
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション		
			血球貪食症候群、結核		

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
肺癌 (C34) 小細胞肺癌	AADC-0275	Nogitecan	Nogitecan	1mg/㎡	5日間連続投与
			3週ごと		
			副作用:	骨髄抑制、消化管出血、間質性肺炎、血栓塞栓症 悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、発熱、易疲労感	
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 (前治療2レジメン以内)	AADC-0276	nab-PTX単剤	nab-PTX	100mg/㎡	day1,8,15
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感 脱毛、末梢神経障害、発疹、下痢	
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0279	Ipilimumab+Nivolumab+PEM+CDDP	Ipilimumab	1mg/kg	6週間隔
			Nivolumab	360mg/body	3週間隔
			Pemetrexed	500mg/㎡	3週間隔
			CDDP	75mg/㎡	3週間隔
			★CDDP+Pemetrexedは2コースで終了		
			★維持療法はNivolumab (±Pemetrexed)を3週毎+Ipilimumab6週毎		
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核	
				悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎	
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0280	Ipilimumab+Nivolumab+PEM+CBDCA	Ipilimumab	1mg/kg	6週間隔
			Nivolumab	360mg/body	3週間隔
			Pemetrexed	500mg/㎡	3週間隔
			CBDCA	目標AUC=6	3週間隔
			★CBDCA+Pemetrexedは2コースで終了		
			★維持療法はNivolumab (±Pemetrexed)を3週毎+Ipilimumab6週毎		
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核	
				発疹、骨髄抑制、悪心、下痢、味覚異常、便秘、しゃっくり	
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0281	Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX	Ipilimumab	1mg/kg	6週間隔
			Nivolumab	360mg/body	3週間隔
			PTX	200mg/㎡	3週間隔
			CBDCA	目標AUC=6	3週間隔
			★CBDCA+PTXは2コースで終了		
			★維持療法はNivolumabを3週毎+Ipilimumab6週毎		
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核	
				脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、悪心・嘔吐	
肺癌 (C34) 扁平上皮癌	AADC-0282	Necttumumab+GEM+CDDP	Necitumumab	800mg	day1.8
			GEM	1250mg/㎡	day1.8
			CDDP	75mg/㎡	day1
			3週毎		
			★CDDP+GEMは最大6コース		
			★維持療法はNecitumumab単剤でPDまで継続		
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱	

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
			ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、低マグネシウム血症、	
			掻痒感、インフュージョンリアクション、下痢	
肺癌 (C34)	AADC-0299	CBDCA+PTX+Pembrolizumab	CBDCA	目標AUC=6/body day1
			PTX	200mg/m ² day1
			Pembrolizumab	200mg/body day1
			3週毎4コース後 維持療法へ	
			維持療法	
			Pembrolizumab	200mg/body day1
			3週毎	
			副作用:	脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹
			食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー	
			間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全	
肺癌 (C34)	AADC-0304	Erlotinib+Ramucirumab	難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群	
			急性腎不全、白質脳症、	
			大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病	
			膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎	
			ラムシルマブ	10mg/kg 2週間毎
			エルロチニブ	150mg 1日1回 空腹時 連日経口投与
			副作用:	高血圧、動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害
			インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血	
			発疹、下痢、皮膚乾燥、掻痒感、間質性肺疾患、肝機能障害	
肺癌 (C34)	AADC-0305	Gefitinib+Ramucirumab	ラムシルマブ	10mg/kg 2週間毎
			ゲフィチニブ	250mg 1日1回 連日経口投与
			副作用:	高血圧、動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害
			インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血	
			発疹、下痢、皮膚乾燥、掻痒感、間質性肺疾患、肝機能障害	
			ダブラフェニブ	1回150mg 1日2回 空腹時連日経口投与
			トラメチニブ	1回2mg 1日1回 空腹時連日経口投与
			副作用:	発熱、肝機能障害、眼障害、心障害
			静脈血栓塞栓症、脳血管障害	
肺癌 (C34)	AADC-0306	Dabrafenib+Trametinib	有棘細胞癌、横紋筋融解症、間質性肺疾患	
肺癌 (C34)	AADC-0307	CBDCA+PTX+RT	PTX 40mg/m ² day1	
			CBDCA 目標AUC=2 day1	
			毎週投与 計6回(放射線療法を行っている間)	
			副作用:	脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、
			肝機能障害	
肺癌 (C34)	AADC-0315	Atezolizumab+nab-PTX+CBDCA→Atezolizumab	アブラキサン	100mg/m ² day1, 8, 15
			CBDCA	目標AUC=6/body day1
			Atezolizumab	1200mg/body day1
			3週毎4コース後 維持療法へ	
			維持療法	
			Atezolizumab	1200mg/body day1
			3週毎	
			副作用:	脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹
			食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー	
			間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全	

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
			難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群	
			急性腎不全、白質脳症、	
			大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病	
			腓炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎	
肺癌 (C34) ALK陽性肺癌	AADC-0325	Brigatinib	ブリグチニブ	1日1回90mgを7日間経口投与後、1日1回180mgを経口投与 (14日以上休薬した場合は90mgにて再開)
			副作用:	間質性肺疾患、高血圧、徐脈、高血糖
				視覚障害、CK上昇、リパーゼorアミラーゼ上昇(膵炎)
				下痢、悪心、肝機能障害、口内炎、発疹
肺癌 (C34) KRAS G12C変異陽性肺癌	AADC-0328	Sotorasib	ソトラシブ	1日1回 960mg(8錠)を連日経口投与
			副作用:	食欲不振、悪心、嘔吐、下痢
				肝機能障害、間質性肺疾患
肺癌 (C34) ROS1融合遺伝子陽性肺癌	AADC-0331	Entrectinib	エストレクチニブ	1日1回 600mg(3Cap)を連日経口投与
			副作用:	心臓障害、QT延長、認知障害・運動失調
				間質性肺疾患、失神、成長発達遅延
				味覚異常、浮動性めまい、末梢感覚ニューロパチー
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0332	Tremelimumab+durvalumab+PEM+CBDCA	Tremelimumab	75mg/body day1
			Durvalumab	1500mg/body day1
			Pemetrexed	500mg/m ² day1
			CBDCA	目標AUC=6 day1
			3週毎	CBDCAは4コースで終了
				維持療法は4週毎にPemetrexed+Durvalumab
				★維持療法の2回目のみ Pemetrexed+Durvalumab+Tremelimumab
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
				血球貪食症候群、結核
				発疹、骨髄抑制、悪心、下痢、味覚異常、便秘、しゃっくり
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0333	Tremelimumab+durvalumab+nab-PTX+CBDCA	Tremelimumab	75mg/body day1
			Durvalumab	1500mg/body day1
			nab-PTX	100mg/m ² day1、8、15
			CBDCA	目標AUC=6 day1
			3週毎	CBDCA+nab-PTXは4コースで終了
				維持療法は4週毎にDurvalumab
				★維持療法の2回目のみ Durvalumab+Tremelimumab
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
				血球貪食症候群、結核
				脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、悪心・嘔吐
肺癌 (C34) 術前 StageⅢA (StageⅡでも症例によって考慮)	AADC-0334	Nivolumab+PTX+CBDCA(術前のみ)	Nivolumab	360mg/body day1
			CBDCA	目標AUC=5 or 6 day1
			PTX	175mg/m ² day1
			3週毎 最大3コース	
			副作用:	脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹
				食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
			間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うつ血性心不全	
			難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群	
			急性腎不全、白質脳症、	
			大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病	
			膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎	
肺癌 (C34) 肺腺癌術前 StageⅢA (StageⅡでも症例によって考慮)	AADC-0335	Nivolumab+CDDP+PEM(術前のみ)	Nivolumab	360mg/body day1
			Pemetrexed	500mg/m ² day1
			CDDP	75mg/m ² day1
			3週毎 最大3コース	
			副作用：	
			発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
			血球貪食症候群、結核	
			悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎	
肺癌 (C34) 切除可能非小細胞肺癌	AADC-0338	Nivolumab+GEM+CDDP(術前のみ)	Nivolumab	360mg/body day1
			CDDP	75mg/m ² day1
			GEM	1000mg/m ² day1,day8
			3週毎 最大3コース	
			副作用：	
			発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
			血球貪食症候群、結核	
			悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎	
肺癌 (C34) 切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における 根治的化学放射線療法後の維持療法 投与期間は12ヶ月まで	AADC-0345	Durvalumab	Durvalumab	1500mg/body day1
			体重30kg以下の場合は1回20mg/kg	
			4週毎	
			副作用：	
			間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病	
			肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー	
肺癌 (C34) METエクソン14スキッピング変異陽性 切除不能な進行・再発非小細胞性肺癌	AADC-0350	Capmatinib	カプマチニブ	1日2回 1回400mg を連日経口投与
			副作用：	
			間質性肺疾患、体液貯留、肝機能障害、腎機能障害	
			悪心・嘔吐、下痢、リバーゼ増加、疲労	
			低リン酸血症、発疹、便秘、血中ビリルビン増加	
肺癌 (C34) EGFR変異陽性肺癌	AADC-0359	Osimertinib+PEM+CDDP	Osimertinib	1日1回80mg を連日経口投与
			CDDP	75mg/m ² day1
			Pemetrexed	500mg/m ² day1
			3週毎 CDDP併用は最大4コース	
			維持療法はPEM 500mg/m ² day1 3週毎 + Osimertinib 80mg 連日	
			副作用：	
			悪心・嘔吐、下痢、便秘、食欲不振、口内炎	
			皮疹、皮膚乾燥、浮腫	
			貧血、好中球減少、血小板減少	
肺癌 (C34) 肺扁平上皮癌(周術期)	AADC-0361	Pembrolizumab+GEM+CDDP	Pembrolizumab	200mg/body day1
			CDDP	75mg/m ² day1
			GEM	1000mg/m ² day1,day8
			(術前) 3週毎 最大4コース	
			Pembrolizumab	200 or 400mg/body day1
			(術後) 200mg 3週毎 もしくは 400mg6週毎	

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
				血球貪食症候群、結核
				悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎
肺癌 (C34) 非扁平上皮非小細胞肺癌 (周術期)	AADC-0362	Pembrolizumab+PEM+CDDP	Pembrolizumab	200mg/body day1
			Pemetrexed	500mg/m ² day1
			CDDP	75mg/m ² day1
			(術前) 3週毎 最大4コース	
			Pembrolizumab	200 or 400mg/body day1
			(術後) 200mg 3週毎	もしくは 400mg6週毎
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
				血球貪食症候群、結核
				悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎
肺癌 (C34) 白金製剤を含む化学療法後に増悪した小細胞肺癌	AADC-0366	Tarlata ^m ab	Tarlata ^m ab	1mg day1 10mg day8
				10mg day15 以降
			2週毎	
			副作用:	サイトカイン放出症候群 (CRS)
				免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群 (ICANS)を含む神経学的事象
				骨髄抑制、間質性肺疾患、食欲不振、味覚異常
肺癌 (C34) 限局型小細胞肺癌における 根治的化学放射線療法後の維持療法 投与期間は24ヶ月まで	AADC-0368	Durvalumab	Durvalumab	1500mg/body day1
				体重30kg以下の場合は1回20mg/kg
			4週毎	
			副作用:	間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病
				肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー
肺癌 (C34) EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 EGFR遺伝子変異陽性の 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	AADC-0369	Amivantamab+CBDCA+PEM	Amivantamab	80kg未満 80kg以上
				350mg/body 350mg/body day1
				1050mg/body 1400mg/body day2
				1400mg/body 1750mg/body day8、day15
				1400mg/body 1750mg/body day1 (2サイクル目)
				1750mg/body 2100mg/body day1 (3サイクル目以降)
			CBDCA	目標AUC=5 day1
			Pemetrexed	500mg/m ² day1
			3週毎	CBDCAは4コースで終了
			副作用:	ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、低マグネシウム血症、体液貯留
				掻痒感、インフュージョンリアクション、下痢、静脈血栓塞栓症
				肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感
				下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり
肺癌 (C34) 切除可能な非小細胞癌(扁平上皮癌) II A～III B(N2)期	AADC-0379	Durvalumab+PTX+CBDCA	Durvalumab	1500mg/body day1
			CBDCA	目標AUC=6 day1
			PTX	200mg/m ² day1
			術前 3週毎 4コース	
			Durvalumab	1500mg/body day1
			術後 4週毎 12コース	
			副作用:	脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、 発疹

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
			食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー		
			間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全		
			難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群		
			急性腎不全、白質脳症、		
			大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病		
			膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎		
肺癌 (C34) 切除可能な非小細胞癌(扁平上皮癌) ⅡA～ⅢB(N2)期	AADC-0380	Durvalumab+CBDCA+GEM	Durvalumab	1500mg/body	day1
			CBDCA	目標AUC=5	day1
			GEM	1000mg/m ²	day1,day8
			術前 3週毎 4コース		
			Durvalumab	1500mg/body	day1
			術後 4週毎 12コース		
			副作用：		
			発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症		
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害		
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション		
肺癌 (C34) 切除可能な非小細胞癌(扁平上皮癌) ⅡA～ⅢB(N2)期	AADC-0381	Durvalumab+CDDP+GEM	血球貪食症候群、結核		
			悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎		
			Durvalumab	1500mg/body	day1
			CDDP	75mg/m ²	day1
			GEM	1000mg/m ²	day1,day8
			術前 3週毎 4コース		
			Durvalumab	1500mg/body	day1
			術後 4週毎 12コース		
			副作用：		
			発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症		
肺癌 (C34) 切除可能な非小細胞癌(非扁平上皮癌) ⅡA～ⅢB(N2)期	AADC-0382	Durvalumab+CBDCA+PEM	大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害		
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション		
			血球貪食症候群、結核		
			悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎		
			Durvalumab	1500mg/body	day1
			Pemetrexed	500mg/m ²	day1
			CBDCA	目標AUC=5	day1
			術前 3週毎 4コース		
			Durvalumab	1500mg/body	day1
			術後 4週毎 12コース		
肺癌 (C34) 切除可能な非小細胞癌(非扁平上皮癌) ⅡA～ⅢB(N2)期	AADC-0383	Durvalumab+CDDP+PEM	副作用：		
			発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症		
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害		
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション		
			血球貪食症候群、結核		
			発疹、骨髄抑制、悪心、下痢、味覚異常、便秘、しゃっくり		
			Durvalumab	1500mg/body	day1
			Pemetrexed	500mg/m ²	day1
			CDDP	75mg/m ²	day1
			術前 3週毎 4コース		
肺癌 (C34) 切除可能な非小細胞癌(非扁平上皮癌) ⅡA～ⅢB(N2)期	AADC-0383	Durvalumab+CDDP+PEM	Durvalumab	1500mg/body	day1
			術後 4週毎 12コース		
			副作用：		
			発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症		
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害		
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション		

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
			血球貪食症候群、結核	
			悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎	
胸腺腫 (C37)	AADC-0308	ADOC	DXR	40mg/㎡ day1
			CDDP	50mg/㎡ day1
			VCR	0.6mg/㎡(最大2mg/body) day3
			CPA	700mg/㎡ day4
			3週毎	
			副作用:	骨髄抑制、心毒性、末梢神経障害、肝障害、悪心・嘔吐、脱毛
				腎障害、出血性膀胱炎
胸腺癌 (C37) 進行胸腺癌2次治療以降	AADC-0222	Lenvatinib	用法・用量	1回24mg 1日1回
			副作用:	高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労
				口内炎、蛋白尿、手掌・足底発赤知覚不全症候群、出
				動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔
				可逆性後白質脳症症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延
				低カルシウム血症
胸腺癌 (C37)	AADC-0137	AMR	AMR	35～40mg/㎡
			3週ごと	3～6コース 3日間連続投与
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、脱毛、肝機能障害、発熱
悪性胸膜中皮腫 (C38)	AADC-0114	Pemetrexed+ CDDP療法	Pemetrexed	500mg/㎡ day1
			CDDP	75mg/㎡ day1
			3週毎	
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、倦怠感、口内炎、神経障害
悪性胸膜中皮腫 (C38)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ	240mg/body 2週間隔
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
悪性胸膜中皮腫 (C38)	AADC-0274	Ipilimumab+Nivolumab	Ipilimumab	1mg/kg 6週間隔
			Nivolumab	360mg/body 3週間隔
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
				血球貪食症候群、結核
悪性胸膜中皮腫 (C38)	AADC-0349	CBDCA+Pemetrexed	Pemetrexed	500mg/㎡ day1
			CBDCA	目標AUC=5 day1
			3週毎	4-6コース
			副作用:	肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感
				下痢、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり
骨髄腫 (C42)	AADC-0161	Bortezomib	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡ 1日1回 day1.4.8.11
			3週毎	
			副作用:	肺障害、心障害、末梢性ニューロパシー、イレウス
				骨髄抑制、低血圧、腫瘍崩壊症候群、皮膚粘膜眼症候群
				中毒性表皮壊死症、発熱、可逆性後白質脳症症候群
				食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、肝機能障害
骨髄腫 (C42)	AADC-0165	Bortezomib+Dexamethasone		

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
			ボルテゾミブ	1.3mg/m ² 1日1回 day1.4.8.11
			デキサメタゾン	20mg 1日1回 day1.2.4.5.8.9.11.12
			3週毎	
			副作用:	肺障害、心障害、末梢性ニューロパシー、イレウス
				骨髄抑制、低血圧、腫瘍崩壊症候群、皮膚粘膜眼症候群
				中毒性表皮壊死症、発熱、可逆性後白質脳症症候群
				食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、肝機能障害、血管浮腫
				不眠症、無力症、疲労、錯覚症、筋痙攣、高血糖
				誘発感染症、続発性副腎皮質機能不全、消化性潰瘍
				骨粗鬆症、霧視、紅斑、味覚異常、血栓塞栓症、緑内障、
骨髄腫 (C42)	AADC-0218	DRC療法	デキサメタゾン	20mg 点滴 day1
原発性マクログロブリン血症			リツキシマブ	375mg/m ² 点滴 day1
			シクロホスファミド	200mg/m ² 経口 day1～5
			3週毎6ヶ月間	
			副作用:	アナフィラキシー様症状、腫瘍崩壊症候群、肝機能障害、
				皮膚粘膜症状、皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死融解症
				骨髄抑制、間質性肺炎、心障害、消化管穿孔、イレウス、 SIADH
				横紋筋融解症、悪心・嘔吐、脱毛、色素沈着、食欲不振
				口内炎、不眠、高血糖
悪性黒色腫 (C43)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ	240mg/body 2週間隔
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
悪性黒色腫 (C43)	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ	480mg/body 4週間隔
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
悪性軟部腫瘍 (C49)	AADC-0199	Pazopanib	パゾパニブ	1日1回800mg 経口投与
			副作用:	下痢、疲労、悪心、高血圧、毛髪変色、食欲減退、体重減少、味覚異常
				肝機能障害、心機能障害、動脈血栓性事象、静脈血栓性事象、出血
				甲状腺機能障害、ネフローゼ症候群、蛋白尿、感染症、創傷治癒遅延
悪性軟部腫瘍 (C49)	AADC-0265	doxorubicin	doxorubicin	75mg/m ² day1
			3週毎 total 6回施行 (心毒性に対する用量制限)	
			副作用:	悪心・嘔吐、白血球減少、食欲不振、脱毛、肝機能異常、下痢・軟便
				全身倦怠感、口内炎
乳癌 (C50)	AADC-0027	Tamoxifen		
内分泌療法 閉経前			TAM 1日1回20mg	
			副作用:	無月経、月経異常、悪心・嘔吐、食欲不振
乳癌 (C50)	AADC-0069	Zoladex	ゴセリン	4週に1回3.6mgを皮下投与
内分泌療法 閉経前			副作用:	肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下
乳癌 (C50)	AADC-0070	Zoladex LA	ゴセリン	10.8mgを前腹部に12～13週毎に1回投与
内分泌療法 閉経前			副作用:	肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下
乳癌 (C50)	AADC-0094	Leuprorelin		
内分泌療法 閉経前			リュープロレリン	4週に1回3.75mgを皮下投与
				12週に1回11.25mgを皮下投与へ切り替え使用あり

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
			副作用:	間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、肝機能障害、黄疸、うつ状態
				熱感、ほてり、のぼせ、頭痛・頭重、発汗、寝汗、注射部位障害
				悪心・嘔吐、体重増加
乳癌 (C50)	AADC-0095	Leuprorelin +TAM療法		
内分泌療法 閉経前			リュープロレリン	4週に1回3.75mgを皮下投与
				12週に1回11.25mgを皮下投与へ切り替え使用あり
			TAM	1日1回20mg
			副作用:	間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、肝機能障害、黄疸、うつ状態
				熱感、ほてり、のぼせ、頭痛・頭重、発汗、寝汗、注射部位障害
				悪心・嘔吐、体重増加、無月経、月経異常
乳癌 (C50)	AADC-0096	Leuprorelin + Femara療法		
内分泌療法 閉経前			リュープロレリン	4週に1回3.75mgを皮下投与
				12週に1回11.25mgを皮下投与へ切り替え使用あり
			レトロゾール	1日1回2.5mg
			副作用:	間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、肝機能障害、黄疸、うつ状態
				熱感、ほてり、のぼせ、頭痛・頭重、発汗、寝汗、注射部位障害
				悪心・嘔吐、体重増加、関節痛、発疹、掻痒感、血栓症、塞栓症
乳癌 (C50)	AADC-0097	Femara		
内分泌療法 閉経前			レトロゾール	1日1回2.5mg
			副作用:	ほてり、頭痛、関節痛、悪心、発疹、掻痒感、肝機能障害
				塞栓症、血栓症
乳癌 (C50)	AADC-0030	Arimidex		
内分泌療法 閉経後			アナストロゾール 1日1回 1mg	
			副作用:	ほてり、嘔気、脱毛、性器出血
乳癌 (C50)	AADC-0031	Aromasin		
内分泌療法 閉経後			エキセメスタン 1日1回 25mg	
			副作用:	ほてり、多汗、高血圧、めまい、悪心、疲労
乳癌 (C50)	AADC-0032	Fareston		
内分泌療法 閉経後			トレミフェン 1日1回40mg	
			副作用:	肝機能障害、白血球減少
乳癌 (C50)	AADC-0033	high dose Fareston		
内分泌療法 閉経後			トレミフェン 1日1回120mg	
			副作用:	肝機能障害、白血球減少
乳癌 (C50)	AADC-0034	Hysron-H		
内分泌療法 閉経後			MPA 1日600から1200mg 分3	
			副作用:	体重増加、満月様顔貌、子宮出血、浮腫、血栓症、月経異常
乳癌 (C50)	AADC-0001	S-1(CG)		
化学療法			用法	a.4週投与 2週休薬法
				b.2週投与 1週休薬法 (副作用の軽減を目的)
			用量	朝食後および夕食後の1日2回
			体表面積 1.25㎡未満	40mg/回
			1.25から1.5㎡未満	50 mg/回
			1.5㎡以上	60mg/回
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
乳癌 (C50)	AADC-0010	UFT(UFTE)		
化学療法			用法・用量	1日量としてテガフル300-600mgを1日2-3回に分割投与
			副作用:	食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
乳癌 (C50)	AADC-0035	Xeloda		
化学療法			カペシタビン 1日2回	3週連続投与 1週休薬
			体表面積 1.31㎡未満	900mg/回
			1.31から1.64㎡未満	1200mg/回
			1.64㎡以上	1500mg/回
			副作用:	手足症候群、骨髄抑制
乳癌 (C50)	AADC-0036	weekly PTX		

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
化学療法			PTX 100mg/㎡	6週投与2週休薬	
			副作用:	脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛、関節痛 悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常	
乳癌(C50)	AADC-0038	tri-weekly DTX			
化学療法			DTX 60～75mg/㎡	day1	3週毎
			副作用:	脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害	
乳癌(C50)	AADC-0040	FEC100療法			
化学療法			5-FU	500mg/㎡	day1
			EPI	100mg/㎡	day1
			CPA	500mg/㎡	day1
			3週毎		
			副作用:	悪心・嘔吐、白血球減少、食欲不振、脱毛、肝機能異常、下痢・軟便 全身倦怠感、口内炎	
乳癌(C50)	AADC-0042	weekly Trastuzumab			
化学療法			トラスツズマブ	初回 4mg/kg	
				2回目以降	2mg/kg
			毎週投与		
			副作用:	発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制	
乳癌(C50)	AADC-0043	bi weekly Trastuzumab			
化学療法			トラスツズマブ*	4mg/kg	day1
			2週毎		
			副作用:	発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制	
乳癌(C50)	AADC-0044	bi weekly PTX + Trastuzumab療法			
化学療法			PTX	80mg/㎡	day1
			トラスツズマブ*	4mg/kg	day1
			2週毎		
			副作用:	脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛 関節痛、悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常、発熱、悪寒 アントラサイクリン系・タキサン系無効例	
乳癌(C50)	AADC-0045	VNR			
化学療法			VNR	25mg/㎡	1週間間隔で2回投与 1週休薬
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、嘔気・嘔吐、静脈炎、発熱、口内炎 電解質異常	
乳癌(C50)	AADC-0046	VNR + Trastuzumab療法			
化学療法			VNR	25mg/㎡	day1 2回投与1週休薬
			トラスツズマブ*	2mg/kg	day1 毎週投与 (初回は4mg/kg)
			3週毎		
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、嘔気・嘔吐、静脈炎、発熱、口内炎 電解質異常、悪寒	
乳癌(C50)	AADC-0087	tri-weekly Trastuzumab			
化学療法			トラスツズマブ*	初回8mg/kg	day1
				2回目以降	6mg/kg day1
			3週毎		
			副作用:	発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制	
乳癌(C50)	AADC-0088	weekly trastuzumab + PTX療法			
化学療法			PTX	80mg/㎡	day1
			トラスツズマブ*	2mg/kg	day1
			毎週投与		
			副作用:	脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛 関節痛、悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常、発熱、悪寒	
乳癌(C50)	AADC-0129	Tykerb + Xeloda 療法			
化学療法			タイケルブ*	1回1250mg	1日1回 連日投与
			カペシタビン	1回1000mg/㎡	1日2回 2週連続投与 1週休薬
			副作用:	手足症候群、骨髄抑制、下痢、口内炎、倦怠感、嘔気・嘔吐	

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0130	DTX+Cyclohosphamide療法	DTX	60～75mg/㎡	day1
			CPA	500～600mg/㎡	day1
			3週毎		
			副作用:	脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害	
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0131	DTX +Xeloda療法	DTX	60～75mg/㎡	day1 3週毎
			カペシタビン	1回1250mg/㎡ 1日2回	2週連続投与 1週休薬
			副作用:	脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害、手足症候群	
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0132	DTX+tri-weekly Trastuzumab 療法	DTX	60～75mg/㎡	day1 3週毎
			トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	day1 3週毎
			副作用:	脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害	
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0144	XELODA + Trastuzumab療法	カペシタビン	1回1250mg/㎡ 1日2回	2週連続投与 1週休薬
			トラスツズマブ	6mg/kg	day1 3週毎
			副作用:	発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制、手足症候群	
乳癌 (C50) トリプルネガティブ	AADC-0149	Bevacizumab based TC療法	PTX 200mg/㎡	day1	
			CBDCA 目標AUC=6	day1	
			ベバシズマブ	15mg/kg	day1 3週ごと
			CBDCA+PTX+ベバシズマブを3週間間隔で4～6サイクル実施後、アバスチン単独を 3週間間隔で投与する		
			副作用:	脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、 肝機能障害、高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、喀血、肺出血、血栓塞栓症	
乳癌 (C50) 進行・再発乳癌 化学療法	AADC-0150	tri-weekly Abraxane	アブラキサン	1回 260mg/㎡	3週毎
			副作用:	脱毛、疲労、筋痛、末梢神経障害、骨髄抑制、下痢、悪心嘔吐	
乳癌 (C50) アントラサイクリン及びタキサンを含む抗がん剤治療後 再発・転移乳癌 化学療法	AADC-0166	Eribulin	ハラヴェン	1.4mg/㎡	day1、8
			3週ごと		
			副作用:	骨髄抑制、脱毛、疲労、食欲減退、発熱、便秘、下痢、嘔吐 口内炎、味覚異常、末梢神経障害、肝機能障害、間質性肺炎	
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経後	AADC-0167	Fulvestrant	フルベストラント	1回2筒(1筒250mg)	左右の臀部に1筒ずつ筋肉内投与
				初回、2週後、4週後、その後4週ごとに1回	
			副作用:	注射部位疼痛、注射部位硬結、ほてり、注射部位掻痒感 肝機能障害、血栓塞栓症、悪心、便秘、卵巣腫大、頭痛 感覚異常、不眠症、背部痛、筋肉痛、高TG血症、高コレステロール血症	
乳癌 (C50)	AADC-0172	CMF(経口法)	MTX	40mg/㎡	day1、8
			5-FU	600mg/㎡	day1、8
			CPA	1回50mg 1日2回	day1～15
			4週ごと		
			副作用:	嘔気・嘔吐、食欲不振、脱毛、肝機能障害、口内炎、骨髄抑制	
乳癌 (C50)	AADC-0173	CMF(静注法)	MTX	40mg/㎡	day1
			5-FU	600mg/㎡	day1
			CPA	600mg/㎡	day1

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等			
乳癌 (C50)	AADC-0174	Bevacizumab + PTX療法	3週ごと			
			副作用:	嘔気・嘔吐、食欲不振、脱毛、肝機能障害、口内炎、骨髄抑制		
			PTX	90mg/m ²	day1,8,15	
			ベバシズマブ	10mg/kg	day1,15	
			4週ごと			
			副作用:	嘔気・嘔吐、食欲不振、脱毛、肝機能障害、口内炎、骨髄抑制		
				末梢神経障害、関節痛、筋肉痛、下痢、高血圧、蛋白尿		
				出血、消化管穿孔、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クリーゼ		
				可逆性後白質脳症症候群、創傷治癒遅延、味覚異常、爪の障害		
乳癌 (C50)	AADC-0190	Gemcitabine 手術不能又は再発乳癌	GEM	1250mg/m ²	day1,8	
			3週ごと			
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感		
				間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、心筋梗塞、うつ血性心不全		
				肺水腫、気管支痙攣、ARDS、腎不全、溶血性尿毒症症候群		
乳癌 (C50) 進行・再発乳癌 補助化学療法	AADC-0195	THP療法	用法・用量	1クール目		
				Pertuzumab 840mg/body	day1	
				Trastuzumab 8mg/kg	day1	
				DTX 75mg/m ²	day1	
				2クール目		
				Pertuzumab 420mg/body	day1	
				Trastuzumab 6mg/kg	day1	
				DTX 75mg/m ²	day1	
				1クール＝3週間		
				DTX を6サイクルまで投与し、7サイクル以降が主治医の判断で継続		
				副作用	下痢、脱毛、爪の異常、倦怠感、嘔気・嘔吐、しびれ、発疹、骨髄抑制	
					インフュージョンリアクション、うつ血性心不全	
乳癌 (C50)	AADC-0203	Everolimus	Everolimus	1日1回10mgを経口投与（ホルモン療法併用）		
			副作用:	口内炎、発疹、疲労、食欲減退、下痢、味覚異常、悪心		
				感染症、体重減少、貧血、鼻出血、高血糖、血小板減少		
				掻痒症		
乳癌 (C50)	AADC-0207	P/T+Eribulin	Pertuzumab	初回840mg/body	2回目以降420mg/body day1	
			Trastuzumab	初回8mg/kg	2回目以降6mg/kg day1	
			Eribulin	1.4mg/m ²	day1、day8	
			3週ごと			
			副作用:	インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、脱毛、倦怠感		
				骨髄抑制、悪心、爪の異常、ニューロパチー、発疹、間質性肺炎		
				流涙増加、肝機能障害、アナフィラキシー、浮腫、疼痛		
乳癌 (C50)	AADC-0209	T-DM1(手術不能または再発乳癌)	T-DM1	3.6mg/kg	day1	
			3週ごと			
			副作用:	倦怠感、鼻出血、悪心、発熱、食欲減退、骨髄抑制、肝機能障害		
				間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション		
				末梢神経障害		
乳癌 (C50)	AADC-0217	EC療法	EPI	100mg/m ²	day1	
			CPA	600mg/m ²	day1	
			3週毎			
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎		
				出血性膀胱炎、下痢、口内炎、アナフィラキシー、排尿障害		

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
			イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、		
乳癌 (C50)	AADC-0221	AC療法	ADM	60mg/ m ²	day1
			CPA	600mg/ m ²	day1
			3週毎		
			副作用： 骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎		
			口内炎、心電図異常、出血性膀胱炎、下痢、、肝機能障害		
			イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、急性腎不全		
			アナフィラキシー、排尿障害		
乳癌 (C50)	AADC-0226	Leuprorerin Pro	Leuprorerin Pro22.5mg 24週毎皮下注射		
			副作用： 注射部位硬結、注射部位紅斑、注射部位疼痛、糖尿病、ほてり		
			間質性肺炎、アナフィラキシー、肝機能障害、血栓塞栓症		
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0234	TC+tri weekly Trastuzumab	DTX	75mg/ m ²	day1
			CPA	600mg/ m ²	day1
			トラスツズ'マブ'	初回8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	day1
			3週毎		
			副作用： 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制		
			肝機能障害、腎機能障害		
乳癌 (C50)	AADC-0238	Palbociclib + Letrozole	パルボシクリブ	1日1回125mg	3週連続投与1週休薬
			レトロゾール	1日1回2.5mg	連続投与
			4週毎		
			副作用： ほてり、頭痛、関節痛、悪心、発疹、掻痒感、肝機能障害		
			塞栓症、血栓症		
			骨髄抑制、脱毛、疲労、感染症、口内炎、下痢、間質性肺炎		
乳癌 (C50)	AADC-0239	Palbociclib + fulvestrant	パルボシクリブ	1日1回125mg	3週連続投与1週休薬
			フルベストラント	1回2筒(1筒250mg)	左右の臀部に1筒ずつ筋肉内投与
			day1,day15 その後はサイクル1の1日目から換算して18日(±7日)毎		
			副作用： 注射部位疼痛、注射部位硬結、ほてり、注射部位掻痒感		
			肝機能障害、血栓塞栓症、悪心、便秘、卵巣腫大、頭痛		
			感覚異常、不眠症、背部痛、筋肉痛、高TG血症、高コレステロール血症		
			骨髄抑制、脱毛、疲労、感染症、口内炎、下痢、間質性肺炎		
乳癌 (C50)	AADC-0244	Abemaciclib	アベマシクリブ	1回150mgを1日2回経口投与 (フルベ'ストラントorレトロゾールorアナストロゾールと併用)	
			副作用： 肝機能障害、骨髄抑制、下痢、間質性肺炎		
			静脈血栓塞栓症、感染症、悪心、嘔吐		
			疲労、脱毛症		
			血清クレアチニン上昇		
乳癌 (C50)	AADC-0248	Olaparib	オラパリブ	1回300mgを1日2回経口投与	
			副作用： 悪心、嘔吐、味覚異常		
			貧血、好中球減少、血小板減少、リンパ球減少		
			疲労、無力症、間質性肺炎		
			下痢、頭痛		
乳癌 (C50)	AADC-0249	nab-PTX+trasutuzumab	nab-PTX	1回 260mg/ m ²	3週毎
			トラスツズ'マブ'	初回8mg/kg	day1
			2回目以降 6mg/kg day1		
			3週毎		
			副作用： 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制		
			脱毛、筋痛、末梢神経障害、下痢		

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等			
乳癌 (C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行	AADC-0255	nab-PTX+Atezolizumab	Atezolizumab	840mg/回	点滴静注	day1、day15
			nab-PTX	100mg/m ²	点滴静注	day1、day8、day15
				その後13日間休薬 28日で1コース		
			副作用:	発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制		
				脱毛、筋痛、末梢神経障害、下痢		
				疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症		
				間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病		
				甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎		
				髄膜炎、神経障害		
乳癌 (C50)	AADC-0258	DD-EC	EPI	90mg/m ²		day1
			CPA	600mg/m ²		day1
			ペグフィルグラスチム	3.6mg		day2
			2週毎			
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎		
				出血性膀胱炎、下痢、口内炎、アナフィラキシー、排尿障害		
				イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、		
乳癌 (C50)	AADC-0263	DD-PTX	PTX	175mg/m ²		day1
			ペグフィルグラスチム	3.6mg		day2
			2週毎			
			副作用:	脱毛、疲労、筋痛、末梢神経障害、骨髄抑制、下痢、悪心嘔吐		
乳癌 (C50) 進行再発乳癌	AADC-0264	Trastuzumab Deruxtec	Trastuzumab Deruxtec	5.4mg/kg		day1
			3週ごと			
			副作用:	間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション		
				骨髄抑制、脱毛、疲労、悪心・嘔吐、下痢、便秘、口内炎		
乳癌 (C50)	AADC-0269	T-DM1(術後)	T-DM1	3.6mg/kg		day1
			3週ごと (投与回数は14回まで)			
			副作用:	倦怠感、鼻出血、悪心、発熱、食欲減退、骨髄抑制、肝機能障害		
				間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション		
				末梢神経障害		
乳癌 (C50)	AADC-0286	CBDCA+GEM	GEM	1000mg/m ²		day1.8
			CBDCA	AUC2		day1.8
			3週毎			
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、発熱、皮疹		
乳癌 (C50)	AADC-0287	Pembrolizumab+CBDCA+GEM	Pembrolizumab	200mg/body		day1
			GEM	1000mg/m ²		day1.8
			CBDCA	AUC2		day1.8
			3週毎			
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、発熱、皮疹		
				疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症		
				間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病		
				甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎		
乳癌 (C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行	AADC-0288	Pembrolizumab+CBDCA+GEM		髄膜炎、神経障害		
			Pembrolizumab	200mg/body		day1
			GEM	1000mg/m ²		day1.8 day22.29
			CBDCA	AUC2		day1.8 day22.29

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
			6週毎		
			副作用:		
			AADC-0287と同様		
乳癌 (C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行	AADC-0289	Pembrolizumab+nab-PTX	Pembrolizumab	200mg/body	day1 3週毎
			nab-PTX	100mg/m ² 点滴静注	day1,8,15 4週毎
			副作用:		
			発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制		
			脱毛、筋痛、末梢神経障害、下痢		
			疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症		
			間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病		
			甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎		
			髄膜炎、神経障害		
乳癌 (C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行	AADC-0290	Pembrolizumab+nab-PTX	Pembrolizumab	200mg/body	day1 6週毎
			nab-PTX	100mg/m ² 点滴静注	day1,8,15 4週毎
			副作用:		
			AADC-0289と同様		
乳癌 (C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行	AADC-0291	Pembrolizumab+PTX 3週	Pembrolizumab	200mg/body	day1 3週毎
			PTX	90mg/m ² 点滴静注	day1,8,15 4週毎
			副作用:		
			脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛、関節痛		
			悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常		
			疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症		
			間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病		
			甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎		
			髄膜炎、神経障害		
乳癌 (C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行	AADC-0292	Pembrolizumab+PTX 6週	Pembrolizumab	200mg/body	day1 6週毎
			PTX	90mg/m ² 点滴静注	day1,8,15 4週毎
			副作用:		
			AADC-0291と同様		
乳癌 (C50) トリプルネガティブ進行乳癌 術前	AADC-0311	Pembrolizumab+CBDCA+PTX	Pembrolizumab	200mg/body	day1
			CBDCA	目標AUC=5/l	day1
			PTX	80mg/m ²	day1,8,15
			3週毎 術前4コース		
			副作用:		
			脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹		
			食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー		
			間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全		
			難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群		
			急性腎不全、白質脳症、		
			大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病		
			膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎		
乳癌 (C50) トリプルネガティブ進行乳癌 術前	AADC-0312	Pembrolizumab+EC	Pembrolizumab	200mg/body	day1
			EPI	90mg/m ²	day1
			CPA	600mg/m ²	day1
			3週毎 術前4コース		
			副作用:		
			骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎		
			出血性膀胱炎、下痢、口内炎、アナフィラキシー、排尿障害		
			イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、		
			難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群		
			急性腎不全、白質脳症、		
			大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病		
			膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎		
乳癌 (C50)	AADC-0313	Pembrolizumab 200mg 3週毎	ペムブロリズマブ	1回200mg	day1

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
トリプルネガティブ進行乳癌 術後 9回まで			3週毎 術後9コースまで		
			副作用：	骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症	
				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐	
				口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害	
				肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害	
				膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎	
乳癌 (C50)	AADC-0314	Pembrolizumab 400mg 6週毎	ペムブロリズマブ	1回400mg	day1
トリプルネガティブ進行乳癌 術後 5回まで			6週毎 術後5コースまで		
			副作用：	AADC-0313と同様	
乳癌 (C50)	AADC-0326	PT+PTX	用法・用量	1クール目	
HER2陽性乳癌				Pertuzumab 840mg/body	day1
				Trastuzumab 8mg/kg	day1
				PTX 80mg/m ²	day1、8、15
				2クール目以降	
				Pertuzumab 420mg/body	day1
				Trastuzumab 6mg/kg	day1
				PTX 80mg/m ²	day1、8、15
				1クール＝3週間	
			副作用	下痢、脱毛、倦怠感、しびれ、骨髄抑制	
				インフュージョンリアクション、うつ血性心不全	
乳癌 (C50)	AADC-0339	P/T+nab-PTX	用法・用量	1クール目	
HER2陽性乳癌				Pertuzumab 840mg/body	day1
				Trastuzumab 8mg/kg	day1
				nab-PTX 260mg/m ²	day1
				2クール目以降	
				Pertuzumab 420mg/body	day1
				Trastuzumab 6mg/kg	day1
				nab-PTX 260mg/m ²	day1
				1クール＝3週間	
			副作用：	発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制	
				脱毛、筋痛、末梢神経障害、下痢	
				インフュージョンリアクション、うつ血性心不全	
乳癌 (C50)	AADC-0340	PHESGO+DTX	ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として		
HER2陽性乳癌			初回 (IN)	それぞれ 1200mg、600mg、30000U	day1
			2回目以降 (MA)	それぞれ 600mg、600mg、20000U	day1
				初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与	
				DTX 75mg/m ²	day1
			3週ごと		
			副作用：	インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感	
				間質性肺炎,悪心、口内炎	
				脱毛、筋痛、末梢神経障害、爪の異常	
乳癌 (C50)	AADC-0341	PHESGO+Eribulin	ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として		
HER2陽性乳癌			初回 (IN)	それぞれ 1200mg、600mg、30000U	day1
			2回目以降 (MA)	それぞれ 600mg、600mg、20000U	day1
				初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与	
				Eribulin 1.4mg/m ²	day1、8
			3週ごと		
			副作用：	インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感	

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
			間質性肺炎,悪心、口内炎、末梢神経障害		
乳癌 (C50) HER2陽性乳癌	AADC-0342	PHESGO+PTX	ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として		
			初回 (IN)	それぞれ 1200mg、600mg、30000U	day1
			2回目以降 (MA)	それぞれ 600mg、600mg、20000U	day1
			初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与		
			PTX 80mg/m ² day1、8、15		
			3週ごと		
			副作用： インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感		
			間質性肺炎,悪心、口内炎		
			脱毛、筋痛、末梢神経障害		
乳癌 (C50) HER2陽性乳癌	AADC-0343	PHESGO+nab-PTX	ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として		
			初回 (IN)	それぞれ 1200mg、600mg、30000U	day1
			2回目以降 (MA)	それぞれ 600mg、600mg、20000U	day1
			初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与		
			nab-PTX 260mg/m ² day1		
			3週ごと		
			副作用： インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感		
			間質性肺炎,悪心、口内炎		
			脱毛、筋痛、末梢神経障害		
乳癌 (C50) HER2陽性乳癌 術前・術後の場合は投与期間は12ヶ月まで	AADC-0344	PHESGO	ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として		
			初回 (IN)	それぞれ 1200mg、600mg、30000U	day1
			2回目以降 (MA)	それぞれ 600mg、600mg、20000U	day1
			初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与		
			3週ごと		
			副作用： インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感		
			間質性肺炎,悪心、口内炎		
乳癌 (C50)	AADC-0351	Capivasertib	カピバセルチブ		
			1回400mgを1日2回 経口投与 4日間服用3日間休薬		
			副作用： 高血糖、下痢、皮膚障害		
			悪心・嘔吐、口内炎、発疹、疲労		
			味覚不全、腎機能障害		
乳癌 (C50) BRCA遺伝子変異陽性かつHER2陰性乳癌	AADC-0358	Talazoparib	タラゾパリブ		
			1回1mgを1日1回 経口投与		
			副作用： 骨髄抑制、間質性肺疾患、血栓塞栓症、二次性悪性腫瘍		
			口内炎、倦怠感、悪心、脱毛		
			下痢、頭痛		
乳癌 (C50) 化学療法歴のあるホルモン受容体陰性かつHER2陰性乳癌	AADC-0363	Sacituzumab Govitecan	サシツズマブ ゴビテカ		
			10mg/kg	day1、8	
			3週ごと		
			副作用： 骨髄抑制、下痢・腸炎、悪心・嘔吐、インフュージョンリアクション		
			間質性肺疾患、肝機能障害、脱毛、倦怠感		
乳癌 (C50) 化学療法歴のあるホルモン受容体陽性かつHER2陰性乳癌	AADC-0365	Datopotamab Deruxtecan	Datopotamab Deruxtec		
			6mg/kg	day1	
			3週ごと		
			副作用： 間質性肺疾患、角膜障害、口内炎、過敏症、インフュージョンリアクション		
			骨髄抑制、脱毛、疲労、悪心・嘔吐、下痢、便秘		
子宮頸癌 (C53)	AADC-0082	NDP+CPT-11療法	CPT-11		
			60mg/m ²	day1、8	
			ネタプラチン		
			100mg/m ²	day1	
			3週毎		
			副作用： 下痢、悪心・嘔吐、骨髄抑制、腎機能障害、肝機能障害		

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
子宮体癌 (C54)	AADC-0019	PTX + CBDCA療法(TC)			
			PTX	180mg/㎡	day1
			CBDCA	目標AUC＝5	day1
			3～4週ごと		
			副作用：脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振 悪心・嘔吐、肝機能障害		
子宮体癌 (C54)	AADC-0080	DTX+CBDCA療法(DC)			
			DTX	60～75mg/㎡	day1
			CBDCA	目標AUC＝5	day1
			副作用：脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害		
子宮体癌 (C54)	AADC-0081	CPA+ADM+CDDP療法(CAP)			
			CPA	500mg/㎡	day1
			DXR	50mg/㎡	day1
			CDDP	50mg/㎡	day1
			4週ごと		
卵巣癌 (C56)	AADC-0019	PTX + CBDCA療法(TC)			
			PTX	180mg/㎡	day1
			CBDCA	目標AUC＝5	day1
			3～4週ごと		
			副作用：脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振 悪心・嘔吐、肝機能障害		
卵巣癌 (C56)	AADC-0080	DTX+CBDCA療法(DC)			
			DTX	60～75mg/㎡	day1
			CBDCA	目標AUC＝5	day1
			副作用：脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害		
卵巣癌 (C56)	AADC-0081	CPA+ADM+CDDP療法(CAP)			
			CPA	500mg/㎡	day1
			DXR	50mg/㎡	day1
			CDDP	50mg/㎡	day1
			4週ごと		
卵巣癌 (C56)	AADC-0133	DOXIL			
			副作用：脱毛、骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、口内炎、全身倦怠感		
			DXR	50mg/㎡を1mg/分で静注	day1
			4週ごと		
			副作用：骨髄抑制、アナフィラキシー用症状、手足症候群、口内炎、肝機能障害 悪心、食欲不振、発疹、疲労、体重減少、心筋障害		
卵巣癌 (C56)	AADC-0375	TC(術後補助化学療法)			
			PTX	175mg/㎡	day1
			CBDCA	目標AUC＝6	day1 (MAX 800mg/body)
			3週毎 最大6コース		
卵巣杯細胞性悪性腫瘍 (C56)	AADC-0075	EP療法			
			副作用：脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振 悪心・嘔吐、肝機能障害		
			VP-16	100mg/㎡	day1～5
			CDDP	20mg/㎡	day1～5
卵巣杯細胞性悪性腫瘍 (C56)	AADC-0083	BEP療法			
			1クール：3週		
			副作用：骨髄抑制、食欲不振、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、		
			BLM	30mg/body	day2、9、16
			VP-16	100mg/㎡	day1～5

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
			CDDP	20mg/㎡ day1～5
			1クール:3週	
			副作用: 間質性肺炎、肺繊維症、皮膚の硬化、色素沈着、発熱・悪寒、脱毛、食欲不振、体重減少、全身倦怠感、悪心・嘔吐、骨髄抑制、	
前立腺癌 (C61)	AADC-0038	tri-weekly DTX		
			DTX 60～75mg/㎡	day1 3週毎
			副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害	
前立腺癌 (C61)	AADC-0064	Prostal		
			クロルマシ [®] ン	1回50mg1日2回
			副作用: インポテンツ、浮腫、体重増加、女性化乳房	
前立腺癌 (C61)	AADC-0065	Casodex		
			ビ [®] カルタミ [®]	1回80mg1日1回
			副作用: 乳房腫脹、乳房圧痛、肝機能障害、勃起力低下	
前立腺癌 (C61)	AADC-0066	Odyne		
			フルタミ [®]	1回125mg 1日3回
			副作用: 肝機能障害、女性型乳房、悪心・嘔吐	
前立腺癌 (C61)	AADC-0067	Estracyt		
			エストラムスチン	1回280mg 1日2回
			副作用: 女性化乳房、食欲不振、浮腫、貧血、肝機能異常	
前立腺癌 (C61)	AADC-0068	Leuplin		
			リユープロレリン	4週に1回3.75mgを皮下投与
			副作用: 肝機能障害、ほてり、熱感	
前立腺癌 (C61)	AADC-0070	Zoladex LA		
			ゴ [®] セレリン	10.8mgを前腹部に12～13週毎に1回投与
			副作用: 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下	
前立腺癌 (C61)	AADC-0103	多剤ホルモン療法無効前立腺癌 Prosexol		
			エチニルエストラジ [®] オール	1回0.5～1.0mg 1日3回
			副作用: 血栓症、心不全、狭心症、発疹、肝機能障害、血圧上昇、電解質異常	
前立腺癌 (C61)	AADC-0124	Casodex + ZoladexLA 療法		
			ビ [®] カルタミ [®]	1回80mg1日1回
			ゴ [®] セレリン	10.8mgを前腹部に12～13週毎に1回投与
			副作用: 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下、乳房腫脹、乳房圧痛、肝機能障害	
前立腺癌 (C61)	AADC-0125	Casodex + Leuplin 療法		
			ビ [®] カルタミ [®]	1回80mg1日1回
			リユープロレリン	4週ごとに3.75mgまたは12週ごとに11.25mgを皮下投与
			副作用: 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下、ほてり、熱感	
前立腺癌 (C61)	AADC-0127	Odyne + ZoladexLA 療法		
			フルタミ [®]	1回125mg 1日3回
			ゴ [®] セレリン	10.8mgを前腹部に12～13週毎に1回投与
			副作用: 肝機能障害、女性型乳房、悪心・嘔吐、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下	
前立腺癌 (C61)	AADC-0187	Degarelix		
			デ [®] ガレリクス	初回240mgを1箇所あたり120mgずつ腹部2箇所に皮下投与
				2回目以降80mgを腹部1箇所に皮下投与
				4週毎
			副作用: 注射部位疼痛、注射部位硬結、注射部位紅斑、ほてり、体重増加、発熱、高血圧、注射部位熱感、間質性肺炎、肝機能障害、糖尿病憎悪	

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
			心不全、血栓塞栓症、アナフィラキシー	
前立腺癌 (C61)	AADC-0128	Odyne + Leuplin 療法	フルタミド [*]	1回125mg 1日3回
			リュープロレリン	4週ごとに3.75mgまたは12週ごとに11.25mgを皮下投与
			副作用:	肝機能障害、女性型乳房、悪心・嘔吐、ほてり、熱感
前立腺癌 (C61) 去勢抵抗性前立腺癌	AADC-0205	Enzalutamide	エンザルタミド	1回160mg 1日1回 経口投与 連日
			副作用:	疲労、悪心、食欲減退、無力症、痙攣発作、下痢、
前立腺癌 (C61) 去勢抵抗性前立腺癌	AADC-0208	Abiraterone	Abiraterone	1回1000mg 1日1回 経口投与 連日
			プレドニン	1回5mg 1日2回 経口投与 連日
			副作用:	肝機能障害、心障害、疲労、ほてり、悪心・嘔吐、低カリウム血症 高血圧、消化器症状、高脂血症
前立腺癌 (C61) 去勢抵抗性前立腺癌	AADC-0224	Cabazitaxel	Cabazitaxel	20～25mg/ m ² day1
			Pegfilgrastin	3.6mg day2
			3週毎	
			副作用:	好中球減少症、骨髄抑制、疲労、悪心、下痢、食欲減退 貧血、腎不全、消化管出血、アナフィラキシーショック 心不全、末梢神経障害、DIC、皮膚粘膜眼症候群、心タンポナーデ 心筋梗塞、静脈血栓塞栓症、間質性肺炎、口内炎、SIADH
前立腺癌 (C61)	AADC-0226	Leuproterin Pro	Leuproterin Pro22.5mg	24週毎皮下注射
			副作用:	注射部位硬結、注射部位紅斑、注射部位疼痛、糖尿病、ほてり 間質性肺炎、アナフィラキシー、肝機能障害、血栓塞栓症
前立腺癌 (C61)	AADC-0250	Degarelix(12週毎)	デガレリクス	初回240mgを1箇所あたり120mgずつ腹部2箇所に皮下投与 2回目以降は初回投与4週間後より480mgを維持用量として 腹部2箇所に皮下投与し、12週間間隔で投与を繰り返す。
			副作用:	注射部位疼痛、注射部位硬結、注射部位紅斑、ほてり、体重増加 発熱、高血圧、注射部位熱感、間質性肺炎、肝機能障害、糖尿病憎悪 心不全、血栓塞栓症、アナフィラキシー
前立腺癌 (C61)	AADC-0251	Apalutamide	アパルタミド [*]	1回240mg 1日1回 経口投与 連日
			副作用:	疲労、皮疹、甲状腺機能低下症、掻痒症、体重減少 痙攣発作、心房細動、心筋梗塞、悪心、下痢
前立腺癌 (C61) 遠隔転移を有しない去勢抵抗性前立腺癌	AADC-0266	Darolutamide	ダロルタミド [*]	1回600mg (300mgを2錠) 1日2回 食後経口投与 連日
			副作用:	心臓障害、間質性肺疾患、疲労、皮疹、頭痛、めまい 悪心、下痢、ほてり、高血圧、女性化乳房
前立腺癌 (C61) BRCA遺伝子変異陽性の遠隔転移を有する去勢抵抗性前立腺癌	AADC-0248	Olaparib	オラパリブ	1回300mgを1日2回経口投与
			副作用:	悪心、嘔吐、味覚異常 貧血、好中球減少、血小板減少、リンパ球減少 疲労、無力症、間質性肺炎 下痢、頭痛
前立腺癌 (C61) CDK12陽性の前立腺癌	AADC-0367	Cisplatin (CDK12陽性)	CDDP	75mg/ m ² day2
			3週毎	
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、腎機能障害
精巣腫瘍 (G63)	AADC-0074	BEP療法	BLM	30mg/body day1.8.15

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
			VP-16	100mg/㎡ day1～5
			CDDP	20mg/㎡ day1～5
			1クール:3週	
			副作用:	間質性肺炎、肺繊維症、皮膚の硬化、色素沈着、発熱・悪寒、脱毛、食欲不振 体重減少、全身倦怠感、悪心・嘔吐、骨髄抑制、
精巣腫瘍 (C63)	AADC-0075	EP療法		
			VP-16	100mg/㎡ day1～5
			CDDP	20mg/㎡ day1～5
			1クール:3週	
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、
精巣腫瘍 (C63) セミノーマ	AADC-0171	CBDCA		
			CBDCA	AUC=7 単回投与
			副作用:	嘔気・嘔吐、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、発熱、骨髄抑制、肝機能障害
腎癌 (C64)	AADC-0076	Sumiferon		
			IFN- α	1日1回300万～600万IU 連日または週1～3回
			副作用:	発熱、全身倦怠感、食欲不振、骨髄抑制、肝機能障害
腎癌 (C64)	AADC-0077	Imunace		
			テセロキソ	1日1回70万単位 連日
			副作用:	発熱、悪寒、倦怠感、食欲不振、悪心・嘔吐、好酸球増多、肝機能障害、浮腫
腎癌 (C64)	AADC-0112	Sutent		
			スニチニブ1日1回50mg	
			4週間連続投与2週間休薬	
			副作用:	骨髄抑制、皮膚変色、手足症候群、食欲不振、肝機能異常、疲労感 味覚異常、口内炎、下痢、悪心、歯肉炎、代謝異常、浮腫、発熱、高血圧
腎癌 (C64) 根治切除不能または転移性の腎細胞癌	AADC-0160	Sorafenib		
			用法・用量	1回400mg 1日2回 経口投与 適宜増減
			副作用:	手足症候群、剥脱性皮膚炎、発疹、脱毛、下痢、高血圧、疲労 食欲不振、そう痒感、体重減少、肝機能障害、出血 間質性肺炎、急性肺障害、高血圧クリーゼ、可逆性後白室脳症 皮膚粘膜眼症候群、消化管穿孔、心筋虚血・心筋梗塞
腎癌 (C64) 根治切除不能または転移性の腎細胞癌	AADC-0169	Everolimus		
			Everolimus	10mg/day 連日経口投与
			副作用:	口内炎、発疹、貧血、疲労、下痢、無力症、食欲減退、高コレステロール血症 悪心、粘膜の炎症、嘔吐、末梢性浮腫、高トリグリセリド血症、咳嗽、搔痒症 感染症、皮膚乾燥、鼻出血、呼吸困難、味覚異常、間質性肺炎、腎不全 高血糖、アナフィラキシー様症状、急性呼吸窮迫症候群、肺塞栓症、心嚢液貯留 進行性多巣性白質脳症、BKウイルス腎症、血栓性微小血管障害、肺胞蛋白症
腎癌 (C64)	AADC-0178	Temsirolimus		
			テムシロリムス	25mgを1週間に1回点滴
			副作用:	発疹、口内炎、食欲不振、肝機能障害、高血糖、間質性肺疾患 infusion reaction、脂質代謝異常、創傷治癒遅延、腎不全 消化管穿孔、心嚢液貯留、胸水、痙攣、脳出血、感染症 皮膚粘膜眼症候群、横紋筋融解症、骨髄抑制
腎癌 (C64) 進行再発腎癌	AADC-0183	Axitinib		
			アキシチニブ	1回5mg1日2回経口投与
				患者の状態により増減可、増量は1回10mgまで
			副作用:	高血圧、甲状腺機能障害、創傷治癒遅延、蛋白尿、手足症候群 肝機能障害、下痢、疲労、悪心嘔吐、発声障害、無力症、体重減少 粘膜炎症、口内炎、味覚異常、鼻出血、
腎癌 (C64)	AADC-0199	Pazopanib		
			パゾパニブ	1日1回800mg 経口投与
			副作用:	下痢、疲労、悪心、高血圧、毛髪変色、食欲減退、体重減少、味覚異常 肝機能障害、心機能障害、動脈血栓性事象、静脈血栓性事象、出血

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
			甲状腺機能障害、ネフローゼ症候群、蛋白尿、感染症、創傷治癒遅延	
腎癌 (C64)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ	240mg/body 2週間隔
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
腎癌 (C64)	AADC-0252	Nivolumab+Ipilimumab	Nivolumab	240mg/body
			Ipilimumab	1mg/kg
			3週 毎4コースまで	
			5コースから	
			Nivolumab	240mg/body
			2週 毎継続	
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
			血球貪食症候群、結核	
腎癌 (C64)	AADC-0272	4週 毎 Nivolumab	ニボルマブ	480mg/body 4週間隔
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
腎癌 (C64)	AADC-0268	Pembrolizumab(6週間)	ペムブロリズマブ	1回400mg 6週間隔
			副作用:	骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症
				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐
				口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害
				肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害
				膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
腎癌 (C64)	AADC-0278	Cabozantinib	カボザンチニブ	1回60mg 1日1回空腹時
			副作用:	高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労
				口内炎、蛋白尿、手足症候群、横紋筋融解症
				動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔
				可逆性後白質脳症症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延
				低カルシウム血症
腎う癌 (C65)	AADC-0121	GC療法	GEM	1000mg/㎡ day1.8.15
			CDDP	70mg/㎡ day2
			1クール:4週	
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱
腎う癌 (C65)	AADC-0268	Pembrolizumab(6週間)	ペムブロリズマブ	1回400mg 6週間隔
			副作用:	骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症
				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐
				口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害
				肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害
				膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
腎う癌 (C65)	AADC-0283	Avelumab	Avelumab	10mg/kg day1
			2週 毎	
			副作用:	間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病
根治切除不能尿路上皮癌における化学療法後の維持療法				肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
腎う癌 (C65) がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌	AADC-0294	Enfortumab Vedotin	Enfortumab Vedotin	1.25mg/kg	day1.8.15
			4週毎		
			副作用:	皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患	
				肝機能障害、Infusion reaction	
腎う癌 (C65) 筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ	240mg/body	2週間隔
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
腎う癌 (C65) 筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ	480mg/body	4週間隔
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
腎う癌 (C65) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌	AADC-0336	GEM+PTX	GEM	1000mg/㎡	day1.8.15
			PTX	200mg/㎡	day1
			4週毎		
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱	
腎う癌 (C65) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌	AADC-0337	GEM+CBDCA			
			GEM	1000mg/㎡	day1.8
			CBDCA	目標AUC＝5	day1
			3週毎		
腎う癌 (C65) 根治切除不能な尿路上皮癌の一次治療	AADC-0360	Pembrolizumab+Enfortumab Vedotin			
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、発熱	
			Pembrolizumab	200mg/body	day1
			Enfortumab Vedotin	1.25mg/kg	day1.8
			3週毎		
			副作用:	皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患	
				肝機能障害、Infusion reaction	
				発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、静脈血栓塞栓症	
腎う癌 (C65) 根治切除不能な尿路上皮癌	AADC-0377	Nivolumab+GC	Nivolumab	360mg/body	day1
			CDDP	70mg/㎡	day1
			GEM	1000mg/㎡	day1,day8
			3週毎 最大6コース		
			Nivolumab	480mg/body	day1
			4週毎 最長2年間		
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
				血球貪食症候群、結核	
				悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎	
尿管癌 (C66)	AADC-0121	GC療法	GEM	1000mg/㎡	day1.8.15
			CDDP	70mg/㎡	day2
			1クール:4週		
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱	

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
尿管癌 (C66)	AADC-0268	Pembrolizumab(6週間)	ペムブロリズマブ	1回400mg	6週間隔
			副作用:	骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症	
				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐	
				口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害	
				肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害	
				膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎	
尿管癌 (C66) 根治切除不能尿路上皮癌における化学療法後の維持療法	AADC-0283	Avelumab	Avelumab	10mg/kg	day1
			2週毎		
			副作用:	間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病	
				肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー	
尿管癌 (C66) がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌	AADC-0294	Enfortumab Vedotin	Enfortumab Vedotin	1.25mg/kg	day1.8.15
			4週毎		
			副作用:	皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患	
				肝機能障害、Infusion reaction	
尿管癌 (C66) 筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ	240mg/body	2週間隔
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
尿管癌 (C66) 筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ	480mg/body	4週間隔
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
尿管癌 (C66) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌	AADC-0336	GEM+PTX	GEM	1000mg/㎡	day1.8.15
			PTX	200mg/㎡	day1
			4週毎		
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱	
尿管癌 (C66) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌	AADC-0337	GEM+CBDCA	GEM	1000mg/㎡	day1.8
			CBDCA	目標AUC＝5	day1
			3週毎		
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、発熱	
尿管癌 (C66) 根治切除不能な尿路上皮癌の一次治療	AADC-0360	Pembrolizumab+Enfortumab Vedotin	Pembrolizumab	200mg/body	day1
			Enfortumab Vedotin	1.25mg/kg	day1.8
			3週毎		
			副作用:	皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患	
				肝機能障害、Infusion reaction	
				発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、重症筋無力症	
尿管癌 (C66) 根治切除不能な尿路上皮癌	AADC-0377	Nivolumab+GC		大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、静脈血栓塞栓症	
			Nivolumab	360mg/body	day1
			CDDP	70mg/㎡	day1
			GEM	1000mg/㎡	day1,day8
			3週毎	最大6コース	
			Nivolumab	480mg/body	day1
			4週毎	最長2年間	

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
				血球貪食症候群、結核
				悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎
膀胱癌 (C67)	AADC-0012	Furtulon		
			5'-DFUR	800-1200mgを3-4回に分けて服用
			副作用:	食欲不振、下痢、白血球減少
膀胱癌 (C67)	AADC-0071	Epirubicin 膀胱内注入		
			EPI	40mgを週1回膀胱内へ注入 10回
			副作用:	悪心・嘔吐、白血球減少、食欲不振、脱毛
膀胱癌 (C67)	AADC-0072	Immunobladder 膀胱内注入		
			BCG	40mgまたは80mgを週1回膀胱内へ注入 10回
			副作用:	BCG感染、排尿痛、頻尿、肉眼的血尿、肝機能障害、発熱、
膀胱癌 (C67)	AADC-0121	GC療法		
			GEM	1000mg/ m ² day1.8.15
			CDDP	70mg/ m ² day2
			1クール:4週	
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱
膀胱癌 (C67)	AADC-0268	Pembrolizumab(6週間)	ペムブロリズマブ	1回400mg 6週間隔
			副作用:	骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症
				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐
				口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害
				肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害
				膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
膀胱癌 (C67)	AADC-0283	Avelumab	Avelumab	10mg/kg day1
根治切除不能尿路上皮癌における化学療法後の維持療法			2週毎	
			副作用:	間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病
				肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー
膀胱癌 (C67)	AADC-0294	Enfortumab Vedotin	Enfortumab Vedotin	1.25mg/kg day1.8.15
がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌			4週毎	
			副作用:	皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患
				肝機能障害、Infusion reaction
膀胱癌 (C67)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ	240mg/body 2週間隔
筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
膀胱癌 (C67)	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ	480mg/body 4週間隔
筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
膀胱癌 (C67)	AADC-0336	GEM+PTX	GEM	1000mg/ m ² day1.8.15
切除不能または転移を有する尿路上皮癌			PTX	200mg/ m ² day1
			4週毎	
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱
				関節痛、筋肉痛、末梢神経障害

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
膀胱癌 (C67) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌	AADC-0337	GEM+CBDCA	GEM	1000mg/㎡	day1.8
			CBDCA	目標AUC＝5	day1
			3週毎		
			副作用：	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、発熱	
膀胱癌 (C67) 根治切除不能な尿路上皮癌の一次治療	AADC-0360	Pembrolizumab+Enfortumab Vedotin	Pembrolizumab	200mg/body	day1
			Enfortumab Vedotin	1.25mg/kg	day1.8
			3週毎		
			副作用：	皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患 肝機能障害、Infusion reaction 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、静脈血栓塞栓症	
膀胱癌 (C67) 根治切除不能な尿路上皮癌	AADC-0377	Nivolumab+GC	Nivolumab	360mg/body	day1
			CDDP	70mg/㎡	day1
			GEM	1000mg/㎡	day1,day8
			3週毎	最大6コース	
			Nivolumab	480mg/body	day1
			4週毎	最長2年間	
			副作用：	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎	
悪性膠芽腫、乏突起神経膠腫 (C71)	AADC-0078	IFNβ+MCNU+IMRT(IMR療法)	IFNβ または フェロン	300万単位	5投2休(5週間)、1回/週(6週目以降)
			サイメリン	1mg/kg	2ヶ月に1回
			放射線照射		
			副作用：	発熱、骨髄抑制、蛋白尿、食欲不振、悪心嘔吐	
悪性神経膠腫 (C71)	AADC-0104	Temodal	テモダール	経口又は点滴静注 初発)放射線照射との併用 テモゾロミドとして1回75mg/㎡ 1日1回連日42日間投与し4週間休薬 その後に本剤単独にて、テモゾロミドとして1回150mg/㎡を1日1回連日5日間 投与し、23日間休薬。28日間1クール 再発) テモゾロミドとして1回150mg/㎡ 1日1回連日5日間投与し23日間休薬 28日間1クール	
			副作用：	放射線照射との併用 脱毛、悪心・嘔吐、疲労 併用後の単独投与時 疲労、脱毛、悪心・嘔吐、食欲不振、頭痛、便秘	
悪性神経膠腫 (C71)	AADC-0197	BV+RT/TMZ 療法	ベバシズマブ	1回10mg/kgを2週間間隔で計4回点滴静注	
			テモダール	1回75mg/㎡ 1日1回連日経口投与	
			放射線照射	2Gy/日 週5日 総線量60Gy	
			その後		
			ベバシズマブ	1回10mg/kgを2週間間隔点滴静注	
			テモダール	1回150mg～200mg/㎡ 1日1回連日5日間経口投与し23日間休薬 28日間1クール	
			その後		
			ベバシズマブ	1回15mg/kgを3週間間隔点滴静注 PDになるまで	
			副作用：	脳出血、粘膜皮膚出血、動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、創傷治癒遅延 骨髄抑制、感染症、高血圧、蛋白尿、可逆性後白質脳症症候群、消化管穿孔	

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
			うつ血性心不全、疲労、脱毛、悪心・嘔吐、食欲不振、頭痛、便秘	
悪性神経膠腫 (C71)	AADC-0198	Gliadel	ギリアデル	腫瘍切除腔の大きさや形状に応じて、8枚または適宜減じた枚数を脳腫瘍切除術時の切除面を被覆するように留置
			副作用：	脳浮腫、発熱、リンパ球数減少、片麻痺、悪心、嘔吐、食欲減退
				頭痛、肝機能異常、痙攣、創傷治癒不良、血栓塞栓症
悪性リンパ腫 (C72)	AADC-0116	髄注MTX+PSL療法	MTX	15mg
			PSL	20mg
			髄液中悪性リンパ腫細胞が陰性化するまで2回／週 繰り返し施行	
			副作用：	骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、口内炎、下痢、腎機能障害、
悪性リンパ腫 (C72)	AADC-0118	high dose MTX	MTX	3.5g/ m ² 24時間点滴
			LV	15mg/body 静注
			LVはMTX終了12時間後から6時間毎に投与	
			副作用：	骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、口内炎、下痢、腎機能障害、肝機能障害、食欲不振
悪性リンパ腫 (C72)	AADC-0267	Tirabrutinib	チラブルチニブ	1回480mg (80mgを6錠) 1日1回 空腹時経口投与 連日
			副作用：	感染症、皮膚障害、骨髄抑制、過敏症、間質性肺疾患
				肝機能障害、出血、下痢、悪心嘔吐
				高カリウム血症、高トリグリセリド血症
甲状腺癌 (C73)	AADC-0160	Sorafenib	用法・用量	1回400mg 1日2回 経口投与 適宜増減
			副作用：	手足症候群。剥脱性皮膚炎、発疹、脱毛、下痢、高血圧、疲労
				食欲不振、そう痒感、体重減少、肝機能障害、出血
				間質性肺炎、急性肺障害、高血圧クリーゼ、可逆性後白室脳症
甲状腺癌 (C73)	AADC-0222	Lenvatinib	用法・用量	1回24mg 1日1回
			副作用：	高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労
				口内炎、蛋白尿、手掌・足底発赤知覚不全症候群、出
				動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔
甲状腺癌 (C73)	AADC-0357	Encorafenib+Binimetinib	Encorafenib	1回450mg 1日1回経口投与
			Binimetinib	1回45mg 1日2回経口投与
			副作用：	手足症候群、眼障害、心機能障害、肝障害、横紋筋融解症
				高血圧、出血、腫瘍崩壊症候群
悪性リンパ腫 (C77) 非ホジキンリンパ腫	AADC-0048	CHOP療法	CPA	750mg/ m ² day1
			DXR	50mg/ m ² day1
			VCR	1.4mg/ m ² day1
			PSL	100mg/body day1～5
			1クール:3週	
			副作用：	骨髄抑制、心毒性、末梢神経障害、肝障害、悪心・嘔吐、脱毛、出血性膀胱炎

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
悪性リンパ腫 (C77) 非ホジキンリンパ腫	AADC-0049	R-CHOP療法	リツキシマブ [*]	375mg/m ² (CHOP療法の前日)
			CPA	750mg/m ² day1
			DXR	50mg/m ² day1
			VCR	1.4mg/m ² day1
			PSL	100mg/body day1～5
			1クール:3週	
			副作用:	全身浮腫、呼吸障害、発熱、悪寒、頭痛、血圧上昇、発疹、骨髄抑制、悪心・嘔吐
				出血性膀胱炎、心毒性、末梢神経障害、肝障害、脱毛、下肢深部反射減弱・消失、
悪性リンパ腫 (C77) 非ホジキンリンパ腫	AADC-0236	High dose MTX + High dose Ara-C	MTX	200mg/m ² day1
			MTX	800mg/m ² 持続 day1
			ソル・メルコート	50mg/body day1～3
			キロサイト	6000mg/m ² /日 day2～3
			1クール:3週	
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、口内炎、下痢、腎機能障害、
				肝機能障害、食欲不振、間質性肺炎、急性呼吸促迫症候群
				中枢神経障害、代謝異常
原発不明癌 (C80)	AADC-0015	GEM	GEM	1000 mg/m ² を週1回 3回投与 1週休薬
				1000 mg/m ² を2週間に1回
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感
原発不明癌 (C80)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ	240mg/body 2週間隔
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
原発不明癌 (C80)	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ	480mg/body 4週間隔
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
リンパ性白血病(C91) 再発又は難治性の慢性リンパ性白血病	AADC-0319	Acalabrutinib	用法・用量	1回100mg 1日2回 経口投与
			副作用:	下痢、悪心・嘔吐、頭痛
				骨髄抑制、感染症、出血
				不整脈、虚血性心疾患、間質性肺疾患
				腫瘍崩壊症候群、二次性悪性腫瘍
骨髄異形成症候群 (D46)	AADC-0301	Azacitidine 皮下注	アザシチジン	75mg/m ² day1-7 皮下注
				21日間休薬
			副作用:	骨髄抑制、感染症、出血、腎尿細管アシドーシス、低血圧
				食欲不振、便秘、悪心、口内炎、下痢
				発疹、掻痒、倦怠感、発熱、注射部位反応、注射部位紅斑
骨髄異形成症候群 (D46)	AADC-0302	Azacitidine 点滴静注	アザシチジン	75mg/m ² day1-7 10分かけて点滴静注
				21日間休薬
			副作用:	骨髄抑制、感染症、出血、腎尿細管アシドーシス、低血圧
				食欲不振、便秘、悪心、口内炎、下痢
				発疹、掻痒、倦怠感、発熱
固形癌 (MSI-High)	AADC-0235	Pembrolizumab	ペムブロリズマブ	1回200mg 3週間隔
			副作用:	骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症
				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
				口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害
				肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害
				膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
固形癌 (MSI-High)	AADC-0268	Pembrolizumab(6週間)	ペムブロリズマブ	1回400mg 6週間隔
			副作用:	骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症
				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐
				口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害
				肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害
				膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
固形癌 (NTRK融合遺伝子陽性)	AADC-0346	Larotrectinib	ラロトレクチニブ	1回 100mg、1日2回、連日経口投与
			副作用:	浮動性めまい、頭痛、末梢性感覚ニューロパチー
				肝機能障害、骨髄抑制
				疲労、筋肉痛、関節痛
小細胞癌 (臓器横断的)	AADC-0023	CBDCA+ETP療法(CE)	VP-16 80mg/m ²	day1～3
			CBDCA 目標AUC=5/body	day1
				3～4週ごと
			副作用:	骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振
フォン・ヒッペル・リンドウ病関連腫瘍	AADC-0376	Belzutifan	ベルズチファン	1回 120mg、1日1回、連日経口投与
			副作用:	貧血、低酸素症
				出血、骨折