

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
頭頸部癌 (C00)	AADC-0001	S-1(CG)	用法
			a.4週投与 2週休薬法
			b.2週投与 1週休薬法 (副作用の軽減を目的)
			用量
			朝食後および夕食後の1日2回
			体表面積 1.25㎡未満 40mg/回
			1.25から1.5㎡未満 50mg/回
			1.5㎡以上 60mg/回
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹、流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、
頭頸部癌 (C00)	AADC-0091	tri-weekly DTX	DTX
			60mg/㎡ day1
			3週ごと
			副作用:
			脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害
頭頸部癌 (C00)	AADC-0008	DCF 療法	CDDP 80 mg/㎡
			day1
			TXT 70mg/㎡
			day1
			5Fu 800 mg/㎡
			day1からday5
			副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛、食欲不振、全身倦怠感、発熱、
頭頸部癌 (C00)	AADC-0182	Cetuximab + FP	セツキシマブ
			初回400 mg/㎡、2回目以降250 mg/㎡
			毎週点滴静注
			CDDP
			100 mg/㎡ day1
			3週に1回
			5Fu 1000 mg/㎡/day
			day1～day4
			3週に1回
			副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛、
			ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、低マグネシウム血症、間質性肺炎、
			掻痒感、infusion reaction、食欲不振、疲労感、心不全、血栓塞栓症
頭頸部癌 (C00)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ
			240mg/body 2週間隔
			副作用:
			発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
頭頸部癌 (C00)	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ
			480mg/body 4週間隔
			副作用:
			発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
頭頸部癌 (C00)	AADC-0235	Pembrolizumab	ペムブロリズマブ
			1回200mg 3週間隔
			副作用:
			骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症
			甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐
			口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害
			肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害
			肺炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
頭頸部癌 (C00)	AADC-0268	Pembrolizumab(6週間)	ペムブロリズマブ
			1回400mg 6週間隔
			副作用:
			骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症
			甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐
			口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害
			肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害
			肺炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
食道癌 (C15)	AADC-0007	CDDP+5-FU 療法(FP)	CDDP 10 mg/body day1からday5
			5Fu 500 mg/m ² day1からday5
			副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛
食道癌 (C15)	AADC-0008	DCF 療法	CDDP 80 mg/m ² day1
			TXF 70mg/m ² day1
			5Fu 800 mg/m ² day1からday5
			副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛、食欲不振、全身倦怠感、発熱、
食道癌 (C15)	AADC-0105	FP+IMRT療法	5-FU 500 mg/body day1からday5
			CDDP 5 mg/body day1からday5
			トモセラビー 2Gy/body day1からday5
			day6,7は休薬 6週連続 (到達目標60Gy)
			副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛
食道癌 (C15)	AADC-0164	DTX	DTX 70mg/m ² day1
			3週ごと
			副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害
食道癌 (C15)	AADC-0184	IMRT+FP	CDDP 70 mg/m ² day1
			5Fu 700 mg/m ² day1からday5
			IMRT 50Gy 25分割
			副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛、食道炎、心嚢水貯留、胸水貯留、肺臓炎
食道癌 (C15)	AADC-0185	FP	化学療法は4週毎に繰り返す
			CDDP 80 mg/m ² day1
			5Fu 800 mg/m ² day1からday5
			副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛
食道癌 (C15)	AADC-0227	PTX(6投2休)	PTX 100 mg/m ² day1.8.15.22.29.36 少なくとも2週休薬
			副作用: 脱毛、発疹、爪の障害、感覚減退、味覚異常、浮動性めまい、疲労、浮腫、発熱、悪心、嘔吐、下痢、便秘、食欲不振、口内炎、筋痛、関節痛
			骨髄抑制、末梢神経障害、間質性肺炎
食道癌 (C15)	AADC-0233	Nedaplatin + 5-FU	Nedaplatin 90 mg/m ² day1
			5Fu 800 mg/m ² /day day1からday5
			副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、腎機能障害、口内炎、脱毛、肝機能異常、色素沈着、ショック、アナフィラキシー、電解質異常、間質性肺炎
食道癌 (C15)	AADC-0014	mFOLFOX6療法	L-OHP 85mg/m ² day1
			5-FU (bolus) 400mg/m ² day1
			5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46~48hr
			l-LV 200mg/m ² day1
			副作用: 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢、発熱
食道癌 (C15)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 (術後補助の場合投与は1年間)

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発 術前治療でpCRでなかったStage II / IIIの術後補助			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
食道癌(C15) がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発 術前治療でpCRでなかったStage II / IIIの術後補助	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 (術後補助の場合投与は1年間) 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
食道癌(C15)	AADC-0298	Pembrolizumab+5-FU+CDDP	ペムブロリズマブ 1回200mg day1 CDDP 80 mg/m ² day1 5FU 800 mg/m ² day1からday5 3週毎 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎 インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感 肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 下垂体機能障害、1型糖尿病 肺炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
食道癌(C15) 切除可能、局所進行食道扁平上皮癌(cT1N1-3M0,cT2-3N0-3M0) 年齢20歳以上75歳以下mECOG PS 0-1	AADC-0300	DCF療法(術前)	CDDP 70 mg/m ² day1 DTX 70mg/m ² day1 5Fu 750 mg/m ² day1からday5 3週毎に3回施行 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、発熱、
食道癌(C15)	AADC-0309	Nivolumab+ipilimumab	Nivolumab 240mg/body 2週間隔 Ipilimumab 1mg/kg 6週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核
食道癌(C15)	AADC-0310	Nivolumab+FP	ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 CDDP 80 mg/m ² day1 5Fu 800 mg/m ² day1からday5 4週毎 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎 インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感 肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 下垂体機能障害、1型糖尿病 肺炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
食道癌(C15) 根治切除不能な進行・再発	AADC-0373	Tislelizumab+FP	Tislelizumab 200mg/body day1 CDDP 80 mg/m ² day1 5FU 800 mg/m ² day1からday5 3週毎 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎 インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感 肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			下垂体機能障害、1型糖尿病 膝炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
食道癌 (C15) がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発	AADC-0374	Tislelizumab	Tislelizumab 200mg/body 3週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
胃癌 (C16)	AADC-0001	S-1(CG)	用法 a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的) 用量 朝食後および夕食後の1日2回 体表面積 1.25㎡未満 40mg/回 1.25から1.5㎡未満 50mg/回 1.5㎡以上 60mg/回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、
胃癌 (C16)	AADC-0002	S-1+CDDP療法	TS-1 3週投与2週休薬 TS-1開始8日目にCDDP60 mg/㎡ 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、
胃癌 (C16)	AADC-0003	PTX	a. 70 mg/㎡を1週に1回 3回投与 1週休薬 b. 80 mg/㎡を2週に1回 もしくは 3週に1回 副作用: 脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害 筋肉痛、関節痛、悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常
胃癌 (C16)	AADC-0006	CPT-11+ CDDP療法(IP)	CDDP 80 mg/㎡ day1 CPT-11 70 mg/㎡ day1,15 4週毎 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、全身倦怠感 末梢神経障害、脱毛
胃癌 (C16)	AADC-0014	mFOLFOX6療法	L-OHP 85mg/㎡ day1 5-FU (bolus) 400mg/㎡ day1 5-FU (infusion) 2400mg/㎡ 46~48hr I-LV 200mg/㎡ day1 2週ごと 副作用: 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢 発熱
胃癌 (C16)	AADC-0085	CPT-11	CPT-11 150 mg/㎡ 2週に1回 副作用: 下痢、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、骨髄抑制、肝機能障害
胃癌 (C16)	AADC-0101	外来 CPT-11+CDDP療法(IP)	CDDP 30 mg/㎡ day1,15 CPT-11 60 mg/㎡ day1,15 4週毎 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、全身倦怠感 末梢神経障害、脱毛
胃癌 (C16)	AADC-0122	S-1+DTX療法	TS-1 2週投与1週休薬

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			朝食後および夕食後の1日2回 80 mg/m ² /day
			DTX 40 mg/m ² day1 3週毎
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、色素沈着、神経障害、脱毛 浮腫、悪心・嘔吐、流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、
胃癌 (C16)	AADC-0134	XELOX 療法	カベシタビン 1日2回 14日間内服7日間休薬 体表面積 1.36m ² 未満 1200mg/回 1.36以上1.66m ² 未満 1500mg/回 1.66以上1.96m ² 未満 1800mg/回 1.96m ² 以上 2100mg/回
			L-OHP 130mg/m ² day1 3週ごと 副作用: 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着
胃癌 (C16)	AADC-0150	tri-weekly Abraxane	アブラキサン 1回 260mg/m ² 3週毎 副作用: 脱毛、疲労、筋痛、末梢神経障害、骨髄抑制、下痢、悪心嘔吐
胃癌 (C16)	AADC-0153	tri weekly Trastuzumab + XP療法	トラスツズマブ 8mg/kg day1 (2回目からは6mg/kg) CDDP 80 mg/m ² day1 カベシタビン 1日2回1回1000mg/m ² day1夕からday15朝まで内服その後7日間休薬 3週毎 副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制、下痢、口内炎、色素沈着 手足症候群、血中ビリルビン増加、腎機能障害、脱毛、末梢神経障害
胃癌 (C16)	AADC-0154	DCS療法	TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 80 mg/m ² /day day1夕からday15朝まで内服その後14日間休薬 DTX 35 mg/m ² day1, day15 CDDP 35 mg/m ² day1, day15 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、色素沈着、神経障害、脱毛 浮腫、悪心・嘔吐、腎機能障害、下痢
胃癌 (C16)	AADC-0179	DTX	DTX 75mg/m ² day1 3週ごと 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害、間質性肺炎
胃癌 (C16)	AADC-0213	SOX	L-OHP 130mg/m ² day1 3週ごと TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14 3週ごと 体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回 1.25から1.5m ² 未満 50mg/回 1.5m ² 以上 60mg/回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック
胃癌 (C16) 一次治療が無効の治癒切除不能胃癌	AADC-0219	RAM療法	RAM 8mg/kg day1 2週ごと 副作用: 腹痛、高血圧、下痢、 動脈血栓塞症、静脈血栓塞症、心筋梗塞、脳血管障害 インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血 骨髄抑制、低カリウム血症、低ナトリウム血症
胃癌 (C16) 一次治療が無効の治癒切除不能胃癌	AADC-0220	PTX+RAM療法	RAM 8mg/kg day1 2週ごと PTX 70mg/m ² day1, 8 2週ごと

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			副作用: 腹痛、高血圧、下痢、疲労、無力症、末梢性浮腫 口内炎、肝機能障害、呼吸困難、蛋白尿、発疹、皮膚乾燥 動脈血栓塞症、静脈血栓塞症、心筋梗塞、脳血管障害 インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血 骨髄抑制、低アルブミン血症、低ナトリウム血症、ざ瘡様皮膚炎 眼瞼浮腫、顔面浮腫、鼻出血
胃癌 (C16)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞症、インフュージョンリアクション
胃癌 (C16)	AADC-0253	Weekly nab-PTX	nab-PTX 100mg/m ² 週1回投与 3週連続投与1週休薬 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感 脱毛、末梢神経障害、発疹、下痢
胃癌 (C16)	AADC-0206	Trifluridine	トリフルリジン 1回35mg/m ² を1日2回 5日間連続経口投与した後2日間休薬し、これを2回繰り返した後 14日間休む 1コース28日間 副作用: 骨髄抑制、悪心、食欲減退、疲労、下痢、嘔吐、口内炎、感染症、間質性肺炎
胃癌 (C16)	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞症、インフュージョンリアクション
胃癌 (C16) HER2陽性切除不能進行再発	AADC-0273	Trastuzumab Deruxtecan	Trastuzumab Deruxtec 6.4mg/kg day1 3週ごと 副作用: 間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション 骨髄抑制、脱毛、疲労、悪心・嘔吐、下痢、便秘、口内炎
胃癌 (C16)	AADC-0295	Nivolumab+CAPOX	ニボルマブ 360mg/body day1 3週ごと カベシタピン 1日2回 14日間内服7日間休薬 体表面積 1.36m ² 未満 1200mg/回 1.36以上1.66m ² 未満 1500mg/回 1.66以上1.96m ² 未満 1800mg/回 1.96m ² 以上 2100mg/回 L-OHP 130mg/m ² day1 3週ごと 副作用: 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着 発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞症、インフュージョンリアクション
胃癌 (C16)	AADC-0296	Nivolumab+SOX	ニボルマブ 360mg/body day1 3週ごと L-OHP 130mg/m ² day1 3週ごと TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14 3週ごと 体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回 1.25から1.5m ² 未満 50mg/回 1.5m ² 以上 60mg/回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック 発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
胃癌 (C16)	AADC-0297	Nivolumab+mFOLFOX6	ニボルマブ 240mg/body day1 L-OHP 85mg/m ² day1 5-FU (bolus) 400mg/m ² day1 5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46~48hr I-LV 200mg/m ² day1 2週ごと 副作用: 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢 発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
胃癌 (C16)	AADC-0353	Pembrolizumab+CAPOX	ペムブロリズマブ 200mg/body day1 3週ごと カペシタビン 1日2回 14日間内服7日間休薬 体表面積 1.36m ² 未満 1200mg/回 1.36以上1.66m ² 未満 1500mg/回 1.66以上1.96m ² 未満 1800mg/回 1.96m ² 以上 2100mg/回 L-OHP 130mg/m ² day1 3週ごと 副作用: 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着 発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
胃癌 (C16)	AADC-0354	Zolbetuximab+CAPOX	ゾルベツキシマブ 初回 800mg/m ² (2回目以降は600mg/ 3週ごと 1日2回 14日間内服7日間休薬 カペシタビン 体表面積 1.36m ² 未満 1200mg/回 1.36以上1.66m ² 未満 1500mg/回 1.66以上1.96m ² 未満 1800mg/回 1.96m ² 以上 2100mg/回 L-OHP 130mg/m ² day1 3週ごと 副作用: 重度の悪心・嘔吐、過敏症、インフュージョンリアクション 手足症候群、骨髄抑制、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着
胃癌 (C16)	AADC-0355	Zolbetuximab+mFOLFOX6	ゾルベツキシマブ 初回 800mg/m ² (2回目以降は600mg/ 3週ごと L-OHP 85mg/m ² day1 5-FU (bolus) 400mg/m ² day1 5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46~48hr I-LV 200mg/m ² day1 2週ごと 副作用: 重度の悪心・嘔吐、過敏症、インフュージョンリアクション 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、倦怠感、下痢 発熱、高血圧
胃癌 (C16) HER2陽性かつCPS≥1の進行再発胃癌	AADC-0370	Pembrolizumab+Trastuzumab+CAPOX	ペムブロリズマブ 200mg/body day1 トラスツズマブ 8mg/kg day1 (2回目からは6mg/kg) カペシタビン 1日2回 14日間内服7日間休薬 体表面積 1.36m ² 未満 1200mg/回 1.36以上1.66m ² 未満 1500mg/回 1.66以上1.96m ² 未満 1800mg/回

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメ名称	用法等
			L-OHP 1.96㎡以上 2100mg/回 3週ごと day1
			副作用: 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着 発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
胃癌 (C16) HER2陽性かつCPS≥1の進行再発胃癌	AADC-0371	Pembrolizumab+Trastuzumab+FP	ペムブロリズマブ 1回200mg day1 トラスツズマブ 8mg/kg (2回目からは6mg/kg) day1 CDDP 80 mg/㎡ day1 5FU 800 mg/㎡ day1からday5 3週毎
			副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎 インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感 肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 下垂体機能障害、1型糖尿病 膝炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
GIST(C16~C17)	AADC-0009	Glivec	イマチニブ 1日1回400mgを食後に投与 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、浮腫、発疹、倦怠感、電解質異常 肝機能障害、血中アルブミン減少
GIST(C16~C17)	AADC-0112	Sutent	スニチニブ 1日1回50mg 4週間連続投与2週間休薬 副作用: 骨髄抑制、皮膚変色、手足症候群、食欲不振、肝機能異常、疲労感 味覚異常、口内炎、下痢、悪心、歯肉炎、代謝異常、浮腫、発熱、高血圧
GIST(C16~C17)	AADC-0316	Pimipespib	ピミテスピブ 1日1回 160mg 空腹時 5日間連続経口投与後2日間休薬 副作用: 下痢、食欲不振、倦怠感、悪心、血清クレアチニン上昇 腎機能低下、夜盲症、貧血
大腸癌 (C18)	AADC-0001	S-1(CG)	用法 a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的) 用量 朝食後および夕食後の1日2回 体表面積 1.25㎡未満 40mg/回 1.25から1.5㎡未満 50mg/回 1.5㎡以上 60mg/回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
大腸癌 (C18)	AADC-0010	UFT(UFTE)	用法・用量 1日量としてテガフル300-600mgを1日2-3回に分けて投与 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
大腸癌 (C18)	AADC-0011	UFT(UFT-E)/LV療法	UFT-E 300mg/㎡/日 1日3回に分けて LV 75mg/日 1日3回に分けて 食間に服用 4週投与 1週休薬 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
大腸癌 (C18)	AADC-0014	mFOLFOX6療法	L-OHP 85mg/m ² day1
			5-FU (bolus) 400mg/m ² day1
			5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46~48hr
			l-LV 200mg/m ² day1
			2週ごと
			副作用: 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢発熱
大腸癌 (C18)	AADC-0084	FOLFIRI療法	5-FU (bolus) 400mg/m ² day1
			5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46~48hr
			l-LV 200mg/m ² day1
			CPT-11 150mg/m ² day1
			2週ごと
			副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛
大腸癌 (C18)	AADC-0092	Bevacizumab based mFOLFOX6療法	ベバシズマブ 1回5mg/kgまたは10mg/kg day1
			L-OHP 85mg/m ² day1
			5-FU (bolus) 400mg/m ² day1
			5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46~48hr
			l-LV 200mg/m ² day1
			2週ごと
副作用: 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢発熱、消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症			
大腸癌 (C18)	AADC-0093	Bevacizumab based FOLFIRI療法	ベバシズマブ 1回5mg/kgまたは10mg/kg day1
			5-FU (bolus) 400mg/m ² day1
			5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46~48hr
			l-LV 200mg/m ² day1
			CPT-11 150mg/m ² day1
			2週ごと
副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛、発熱、消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症			
大腸癌 (C18)	AADC-0099	5-FU/LV療法	5-FU (bolus) 400mg/m ² day1
			5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46~48hr
			l-LV 200mg/m ² day1
			2週ごと
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、口内炎、手足症候群、脱毛
			全身倦怠感、肝機能障害、下痢
大腸癌 (C18)	AADC-0102	Xeloda	カベシタピン 1日2回 2週連続投与 1週休薬
			体表面積 1.33m ² 未満 1500mg/回
			1.33から1.57m ² 未満 1800mg/回
			1.57から1.81m ² 未満 2100mg/回
			1.81m ² 以上 2400mg/回
			副作用: 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加
大腸癌 (C18)	AADC-0107	Bevacizumab based 5-FU/LV療法	ベバシズマブ 1回5mg/kgまたは10mg/kg day1
			5-FU (bolus) 400mg/m ² day1

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46~48hr I-LV 200mg/m ² day1 2週ごと 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、口内炎、手足症候群、脱毛 全身倦怠感、肝機能障害、下痢、高血圧性クレーゼ 消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症
大腸癌 (C18)	AADC-0108	UFT/LV+IMRT療法	UFT 300mg/m ² /日 1日3回に分けて LV 75mg/日 1日3回に分けて 食間に服用 トモセラピー実施日day1~5 トモセラピー 2Gy/day (day1~5まで行い、day6,7は中止) 4週連続投与(到達目標40Gy) 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
大腸癌 (C18)	AADC-0109	Cetuximab + FOLFIRI 療法	セツキシマブ 初回 400mg/m ² (2回目以降は250mg/m ²) day1 週1回 CPT-11 150mg/m ² (75歳以上は120mg/m ²) day1 2週ごと I-LV 200mg/m ² day1 2週ごと 5-FU (bolus) 400mg/m ² day1 2週ごと 5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46~48hr 2週ごと 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛、発熱 ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction
大腸癌 (C18)	AADC-0110	Cetuximab + CPT-11 療法	セツキシマブ 初回 400mg/m ² (2回目以降は250mg/m ²) day1 週1回 CPT-11 150mg/m ² (75歳以上は120mg/m ²) day1 2週ごと 副作用: ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、食欲不振、下痢、悪心・嘔吐 脱毛、疲労感、骨髄抑制
大腸癌 (C18)	AADC-0115	Cetuximab	セツキシマブ 初回 400mg/m ² (2回目以降は250mg/m ²) day1 週1回 副作用: ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、下痢
大腸癌 (C18)	AADC-0134	XELOX 療法	カベシタピン 1日2回 14日間内服7日間休薬 体表面積 1.36m ² 未満 1200mg/回 1.36以上1.66m ² 未満 1500mg/回 1.66以上1.96m ² 未満 1800mg/回 1.96m ² 以上 2100mg/回 L-OHP 130mg/m ² day1 3週ごと 副作用: 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着
大腸癌 (C18)	AADC-0135	Bevacizumab based XELOX 療法	ベバシズマブ 7.5mg/kg day1 3週ごと カベシタピン 1日2回 14日間内服7日間休薬 体表面積 1.36m ² 未満 1200mg/回 1.36以上1.66m ² 未満 1500mg/回 1.66以上1.96m ² 未満 1800mg/回 1.96m ² 以上 2100mg/回 L-OHP 130mg/m ² day1 3週ごと 副作用: 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着 消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症 高血圧性クレーゼ

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
大腸癌 (C18)	AADC-0136	IRIS(大腸)	CPT-11 125 mg/m ² 2週ごと
			TS-1 80~120mg/body 2週投与2週休薬
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹、脱毛
大腸癌 (C18)	AADC-0140	Bevacizumab based XELODA 療法	ベバシズマブ 7.5mg/kg day1 3週ごと
			カベシタピン 1日2回 14日間内服7日間休薬
			体表面積 1.36m ² 未満 1200mg/回
			1.36以上1.66m ² 未満 1500mg/回
			1.66以上1.96m ² 未満 1800mg/回
			1.96m ² 以上 2100mg/回
副作用: 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着 消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症 高血圧性クレーゼ			
大腸癌 (C18)	AADC-0146	Panitumumab	パニツムマブ 6mg/kg 点滴静注 2週毎
			副作用: infusion reaction、ざ瘡、皮膚乾燥、発疹、掻痒、爪周炎、低マグネシウム血症 疲労、口内炎、食欲不振、下痢、間質性肺疾患
大腸癌 (C18)	AADC-0147	Panitumumab based FORFIRI療法	パニツムマブ 6mg/kg 点滴静注
			5-FU (bolus) 400mg/m ² day1
			5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46~48hr
			l-LV 200mg/m ² day1
			CPT-11 150mg/m ² (76才以上は120mg/m ²) day1
			2週毎 副作用: infusion reaction、ざ瘡、皮膚乾燥、発疹、掻痒、爪周炎、低マグネシウム血症 疲労、口内炎、食欲不振、下痢、間質性肺疾患、悪心・嘔吐、骨髄抑制 肝機能障害、脱毛
大腸癌 (C18)	AADC-0148	Panitumumab based FOLFOX療法	パニツムマブ 6mg/kg 点滴静注
			L-OHP 85mg/m ² day1
			5-FU (bolus) 400mg/m ² day1
			5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46~48hr
			l-LV 200mg/m ² day1
			2週毎 副作用: infusion reaction、ざ瘡、皮膚乾燥、発疹、掻痒、爪周炎、低マグネシウム血症 疲労、口内炎、食欲不振、下痢、間質性肺疾患、発熱 末梢神経障害、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐、倦怠感、
大腸癌 (C18)	AADC-0168	Cetuximab based mFOLFOX6 療法	セツキシマブ 初回 400mg/m ² (2回目以降は250mg/m ²) day1 週1回
			L-OHP 85mg/m ² day1 2週ごと
			5-FU (bolus) 400mg/m ² day1 2週ごと
			5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46~48hr 2週ごと
			l-LV 200mg/m ² day1 2週ごと
			副作用: ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪周炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、食欲不振、下痢、悪心・嘔吐、発熱 脱毛、疲労感、骨髄抑制、末梢神経障害、注射部位反応、
大腸癌 (C18) 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	AADC-0191	Regorafenib	レゴラフェニブ 1日1回160mgを3週間連日経口投与、その後1週間休薬 これを繰り返す
			副作用: 手足症候群、TEN、Stevens-Johnson症候群、多形紅斑 肝機能障害、出血、血栓塞栓症、高血圧、高血圧クレーゼ、可逆性後白質脳症 消化管穿孔、下痢、食欲不振、口内炎、悪心・嘔吐、頻脈、発声障害、骨髄抑制 脱毛、掻痒、多汗症

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
大腸癌 (C18) 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	AADC-0192	BV/SOX	ペバシズマブ 5mg/kg day1 3週ごと	
			L-OHP 130mg/m ² day1 3週ごと	
			TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14 3週ごと	
			体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回	
			1.25から1.5m ² 未満 50mg/回	
			1.5m ² 以上 60mg/回	
		副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック、消化管穿孔 創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ 可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、間質性肺炎 肝機能障害、脱毛、	
大腸癌 (C18)	AADC-0206	Trifluridine	トリフルリジン 1回35mg/m ² を1日2回	
			5日間連続経口投与した後2日間休薬し、これを2回繰り返した後	
			14日間休む	
			1コース28日間	
		副作用:	骨髄抑制、悪心、食欲減退、疲労、下痢、嘔吐、口内炎、感染症、間質性肺炎	
大腸癌 (C18)	AADC-0213	SOX	L-OHP 130mg/m ² day1 3週ごと	
			TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14 3週ごと	
			体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回	
			1.25から1.5m ² 未満 50mg/回	
			1.5m ² 以上 60mg/回	
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック
大腸癌 (C18)	AADC-0214	Panitumumab+5-FU/LV	パニツムマブ 6mg/kg day1	
			5-FU (bolus) 400mg/m ² day1	
			5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46～48hr	
			l-LV 200mg/m ² day1	
			2週毎	
			副作用:	Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、低マグネシウム血症、口内炎 ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎 骨髄抑制、感染症、肝機能障害、手足症候群
大腸癌 (C18)	AADC-0215	Cetuximab+5-FU/LV	セツキシマブ 初回 400mg/m ² (2回目以降は250mg/m ²) day1 週1回	
			5-FU (bolus) 400mg/m ² day1 2週ごと	
			5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46～48hr 2週ごと	
			l-LV 200mg/m ² day1 2週ごと	
			副作用:	Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、心不全、血栓塞栓症、口内炎 ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎 骨髄抑制、感染症、肝機能障害、手足症候群、低マグネシウム血症 末梢神経障害
大腸癌 (C18)	AADC-0216	Panitumumab+CPT-11	パニツムマブ 6mg/kg 点滴静注	
			CPT-11 150mg/m ² (76才以上は120mg/m ²) day1	
			2週毎	
			副作用:	Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、低マグネシウム血症、口内炎 ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎 骨髄抑制、腸管穿孔、消化管出血、腸閉塞、末梢神経障害、脱毛 腎機能障害、血栓塞栓症

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメ名称	用法等
大腸癌 (C18)	AADC-0223	bevacizumab+XELIRI	ベバシズマブ 7.5mg/kg day1
			CPT-11 200mg/m ² day1
			XELODA 1600mg/m ² /日 day1~14
			3週毎
			副作用: infusion reaction、消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、高血圧性脳症 可逆性後白質脳症候群、ネフローゼ症候群、骨髄抑制、感染症 うっ血性心不全、間質性肺炎、神経障害、食欲減退、悪心、口内炎 脱毛、下痢、手足症候群、腎障害、色素沈着
大腸癌 (C18)	AADC-0228	Bevacizumab + FOLFOXIRI	ベバシズマブ 5mg/kg day1
			5-FU (infusion) 3200mg/m ² 46hr
			l-LV 200mg/m ² day1
			L-OHP 85mg/m ² day1
			CPT-11 165mg/m ² day1
			2週毎 副作用: 骨髄抑制、下痢、悪心、嘔吐、口内炎、無力症、末梢神経障害 高血圧、静脈血栓塞栓症、アナフィラキシー反応、間質性肺炎 腸管穿孔、創傷治癒遅延、白質脳症
大腸癌 (C18)	AADC-0229	Capecitabine + IMRT	カベシタビン 1日2回 週5日
			体表面積 1.31m ² 未満 900mg/回
			1.31以上1.64m ² 未満 1200mg/回
			1.64以上 1500mg/回
			トモセラビー 2Gy/day day1-5実施、day6-7中止 最大50Gy (2Gy×25回 5週間) 副作用: 骨髄抑制、手足症候群、下痢、悪心・嘔吐、口内炎、腹痛 疲労、無力症、脱毛、皮膚の発赤、掻痒感
大腸癌 (C18)	AADC-0230	RAM + FOLFIRI	ラムシルマブ 8mg/kg day1
			5-FU (bolus) 400mg/m ² day1
			5-FU (infusion) 2400mg/m ² day1~3
			l-LV 200mg/m ² day1
			CPT-11 150mg/m ² day1 2週毎 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛 口内炎、鼻出血、高血圧、動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症 消化管穿孔
大腸癌 (C18) 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	AADC-0259	bevacizumab+S-1(3週毎)	ベバシズマブ 7.5mg/kg day1 3週ごと
			TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1~day14 3週ごと
			体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回
			1.25から1.5m ² 未満 50mg/回
			1.5m ² 以上 60mg/回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 消化管穿孔、肝機能障害 創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クローゼ 可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、間質性肺炎
大腸癌 (C18) 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	AADC-0260	bevacizumab+S-1(4週毎)	ベバシズマブ 5mg/kg day1、15
			TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1~day14
			体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回
			1.25から1.5m ² 未満 50mg/回
			1.5m ² 以上 60mg/回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			消化管穿孔、肝機能障害 創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ 可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、間質性肺炎
大腸癌 (C18) 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	AADC-0261	bevacizumab+IRIS	ベバシズマブ 5mg/kg day1, 15 CPT-11 150mg/m ² day1, 15 TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14 体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回 1.25から1.5m ² 未満 50mg/回 1.5m ² 以上 60mg/回
			副作用： 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック、消化管穿孔 創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ 可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、間質性肺炎 肝機能障害、脱毛
大腸癌 (C18) MSI-high	AADC-0252	Nivolumab+Ipilimumab	Nivolumab 240mg/body Ipilimumab 1mg/kg 3週毎4コースまで 5コースから Nivolumab 240mg/body 2週毎 又は 480mg/body 4週毎
			副作用： 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核
大腸癌 (C18) BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	AADC-0284	Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab	Cetuximab 初回 400mg/m ² (2回目以降は250mg/m ²)を週1回 Encorafenib 1回300mg 1日1回経口投与 Binimetinib 1回45mg 1日2回経口投与
			副作用： ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、下痢、悪心嘔吐、疲労 手足症候群、眼障害、心機能障害、肝障害、横紋筋融解症
大腸癌 (C18) BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	AADC-0285	Encorafenib+Cetuximab	Cetuximab 初回 400mg/m ² (2回目以降は250mg/m ²)を週1回 Encorafenib 1回300mg 1日1回経口投与
			副作用： ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、下痢、悪心嘔吐、疲労 皮膚悪性腫瘍、手足症候群、眼障害、横紋筋融解症
大腸癌 (C18) Her2陽性大腸癌 RAS野生型	AADC-0303	Pertuzumab+Trastuzumab(Her2陽性大腸癌)	Pertuzumab 初回840mg/body 2回目以降420mg/body day1 Trastuzumab 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg day1 3週ごと
			副作用： インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感 間質性肺炎、悪心、口内炎
大腸癌 (C18)	AADC-0317	Bevacizumab+Trifluridine	ベバシズマブ 5mg/kg day1, 15 トリフルリジン 1回35mg/m ² を1日2回 5日間連続経口投与した後2日間休薬し、これを2回繰り返した後 14日間休む 1コース28日間
			副作用： 骨髄抑制、悪心、食欲減退、疲労、下痢、嘔吐、口内炎、感染症、間質性肺炎 創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ
大腸癌 (C18)	AADC-0321	bi weekly cetuximab	セツキシマブ 500mg/m ² day1

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			2週毎 副作用: ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、掻痒感、infusion reaction、下痢
大腸癌 (C18)	AADC-0322	bi weekly cetuximab+mFOLFOX6	セツキシマブ 500mg/m ² day1 L-OHP 85mg/m ² day1 5-FU (bolus) 400mg/m ² day1 5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46~48hr l-LV 200mg/m ² day1
			2週毎 副作用: ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、掻痒感、infusion reaction、食欲不振、下痢、悪心・嘔吐、発熱、脱毛、疲労感、骨髄抑制、末梢神経障害、注射部位反応、
大腸癌 (C18)	AADC-0323	bi weekly cetuximab+FOLFIRI	セツキシマブ 500mg/m ² day1 CPT-11 150mg/m ² (75歳以上は120mg/m ²) day1 l-LV 200mg/m ² day1 5-FU (bolus) 400mg/m ² day1 5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46~48hr
			2週毎 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛、発熱、ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、掻痒感、infusion reaction
大腸癌 (C18)	AADC-0324	bi weekly cetuximab+5FU+l-LV	セツキシマブ 500mg/m ² day1 5-FU (bolus) 400mg/m ² day1 5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46~48hr l-LV 200mg/m ² day1
			2週毎 副作用: Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、心不全、血栓塞栓症、口内炎、ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎、骨髄抑制、感染症、肝機能障害、手足症候群、低マグネシウム血症
大腸癌 (C18)	AADC-0329	Cetuximab+CPT-11 (bi-weekly)	セツキシマブ 500mg/m ² day1 CPT-11 150mg/m ² (76才以上は120mg/m ²) day1
			2週毎 副作用: Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、低マグネシウム血症、口内炎、ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎、骨髄抑制、腸管穿孔、消化管出血、腸閉塞、末梢神経障害、脱毛、腎機能障害、血栓塞栓症
大腸癌 (C18)	AADC-0330	IRIS+bev (TRICOLORE)	ベバシズマブ 7.5mg/kg day1 CPT-11 150mg/m ² day1 TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1~day14 体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回 1.25から1.5m ² 未満 50mg/回 1.5m ² 以上 60mg/回
			3週毎 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹、末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック、消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ、可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、間質性肺炎、肝機能障害、脱毛

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
大腸癌 (C18) Her2陽性大腸癌 RAS野生型	AADC-0344	PHESGO	ペルツマブ、トラスツマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として
			初回 (IN) それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1
			2回目以降 (MA) それぞれ 600mg、600mg、20000U day1
			初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与
			3週ごと
			副作用： インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感 間質性肺炎、悪心、口内炎
大腸癌 (C18)	AADC-0356	Bevacizumab+mFOLFOXIRI	ベバシズマブ 5mg/kg day1
			5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46hr
			l-LV 200mg/m ² day1
			L-OHP 85mg/m ² day1
			CPT-11 150mg/m ² day1
			2週毎
			副作用： 骨髄抑制、下痢、悪心、嘔吐、口内炎、無力症、末梢神経障害 高血圧、静脈血栓塞栓症、アナフィラキシー反応、間質性肺炎 腸管穿孔、創傷治癒遅延、白質脳症
大腸癌 (C18) がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発大腸癌	AADC-0364	Fruquintinib	フルキンチニブ 1日1回 5mgを3週間連日経口投与、その後1週間休薬 これを繰り返す
			副作用： 手足症候群、蛋白尿、創傷治癒遅延、甲状腺機能低下症、動脈解離 肝機能障害、出血、血栓塞栓症、高血圧、高血圧クリーゼ、可逆性後白質脳症 消化管穿孔、下痢、食欲不振、口内炎、悪心・嘔吐、頻脈、発声障害、骨髄抑制
大腸癌 (C18) がん化学療法後に増悪したKRAS G12C変異陽性の 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	AADC-0378	Sotorasib+Panitumumab	ソトラシブ 1日1回 960mg(8錠)を連日経口投与
			パニツムマブ 6mg/kg 点滴静注 2週毎
			副作用： 食欲不振、悪心、嘔吐、下痢 肝機能障害、間質性肺疾患 infusion reaction、ざ瘡、皮膚乾燥、発疹、掻痒、爪周炎 疲労、口内炎、低マグネシウム血症
大腸癌 (C18) BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	AADC-0387	ENCO+Cmab+mFOLFOX6	セツキシマブ 500mg/m ² day1
			Encorafenib 1回300mg 1日1回経口投与
			L-OHP 85mg/m ² day1
			5-FU (bolus) 400mg/m ² day1
			5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46~48hr
			l-LV 200mg/m ² day1
			2週毎
			副作用： ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、食欲不振、下痢、悪心・嘔吐、発熱 脱毛、疲労感、骨髄抑制、末梢神経障害、注射部位反応 皮膚悪性腫瘍、手足症候群、眼障害、横紋筋融解症
大腸癌 (C18) BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	AADC-0388	Bi weekly Encorafenib+Cetuximab	Cetuximab 500mg/m ² 2週毎
			Encorafenib 1回300mg 1日1回経口投与
			副作用： ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、下痢、悪心嘔吐、疲労 皮膚悪性腫瘍、手足症候群、眼障害、横紋筋融解症
大腸癌 (C18) BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	AADC-0389	Bi weekly Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab	Cetuximab 500mg/m ² 2週毎
			Encorafenib 1回300mg 1日1回経口投与
			Binimetinib 1回45mg 1日2回経口投与
			副作用： ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、下痢、悪心嘔吐、疲労 手足症候群、眼障害、心機能障害、肝障害、横紋筋融解症

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
肛門管癌 (C21.1)	AADC-0196	5-FU+MMC+RT	5-FU (infusion) 1000mg/ m ² /day day1~4 29~32
			MMC(bolus) 10mg/ m ² /day day1,29
			RT 1.8Gy/day 週5回 計33回 総線量 59.4Gy
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、全身倦怠感、体重減少、脱毛、口内炎 出血傾向、溶血性尿毒症症候群、腎障害、間質性肺炎、下痢、色素沈着 肝機能障害、アナフィラキシーショック、白質脳症、うつ血性心不全、手足症候群 食道炎、
肝癌 (C22)	AADC-0017	Epirubicin 肝動注	1日60mg/ m ² を動脈内投与 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、脱毛、悪心・嘔吐
肝癌 (C22)	AADC-0141	Miriplitin肝動注	1日1回70mg を肝動脈内投与(1回120mgを上限) 繰り返し投与する場合は4週間以上の観察期間をおく 副作用: 肝機能障害、骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、発熱、投与部位の疼痛 腎機能障害、全身倦怠感
肝癌 (C22)	AADC-0160	Sorafenib	用法・用量 1回400mg 1日2回 経口投与 適宜増減 副作用: 手足症候群。剥脱性皮膚炎、発疹、脱毛、下痢、高血圧、疲労 食欲不振、そう痒感、体重減少、肝機能障害、出血 間質性肺炎、急性肺障害、高血圧クリーゼ、可逆性後白室脳症 皮膚粘膜眼症候群、消化管穿孔、心筋虚血・心筋梗塞
肝癌 (C22)	AADC-0240	Lenvatinib	用法・用量 体重60kg以上 1日1回12mg経口投与 体重60kg未満 1日1回8mg経口投与 副作用: 高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労 口内炎、蛋白尿、手掌・足底発赤知覚不全症候群、出 動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔 可逆性後白質脳症症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延 低カルシウム血症
肝癌 (C22) 切除不能肝細胞癌	AADC-0293	Atezolizumab+Bevacizumab	アテゾリズマブ 1200mg day1 ベバシズマブ 15mg/kg day1 3週ごと 副作用: 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害 消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧
肝癌 (C22) 進行再発肝細胞癌	AADC-0327	Durvalumab+Tremelimumab	Durvalumab 1500mg (体重30kg以下の場合は20mg/kg) 4週間隔 Tremelimumab 300mg (体重30kg以下の場合は4mg/kg) 初回単回のみ 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
肝癌 (C22) 進行再発肝細胞癌	AADC-0348	Durvalumab	Durvalumab 1500mg/body day1 体重30kg以下の場合は1回20mg/kg 4週毎 副作用: 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー
肝癌 (C22) がん化学療法後に増悪した切除不能な肝細胞癌	AADC-0278	Cabozantinib	カボザンチニブ 1回60mg 1日1回空腹時 副作用： 高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労 口内炎、蛋白尿、手足症候群、横紋筋融解症 動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔 可逆性後白質脳症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延 低カルシウム血症
肝癌 (C22) 切除不能肝細胞癌	AADC-0309	Nivolumab+ipilimumab	Nivolumab 80mg/body Ipilimumab 3mg/kg 3週毎 4回投与後、Nivolumab 240mg/bodyを2週毎、又は480mg/bodyを4週毎 で継続 副作用： 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 肝機能障害、肝炎、血球貪食症候群、結核
胆道癌 (C22～24)	AADC-0001	S-1(CG)	用法 a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的) 用量 朝食後および夕食後の1日2回 体表面積 1.25㎡未満 40mg/回 1.25から1.5㎡未満 50mg/回 1.5㎡以上 60mg/回 副作用： 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
胆道癌 (C22～24)	AADC-0015	GEM	GEM 1000 mg/㎡を週1回 3回投与 1週休薬 1000 mg/㎡を2週間に1回 副作用： 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感
胆道癌 (C22～24)	AADC-0163	GC療法	GEM 1000mg/㎡ day1.8 CDDP 25mg/㎡ day1.8 1クール:3週 副作用： 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱
胆道癌 (C22～24)	AADC-0320	Durvalumab+GEM+CDDP	Durvalumab 1500mg/body day1 GEM 1000mg/㎡ day1.8 CDDP 25mg/㎡ day1.8 1クール:3週 副作用： 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー
胆道癌 (C22～24)	AADC-0347	GCS	GEM 1000mg/㎡ day1 CDDP 25mg/㎡ day1 S-1 80mg/㎡ day1-7 1クール:2週 副作用： 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 下痢、色素沈着、発疹

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
胆道癌 (C22~24)	AADC-0352	Pembrolizumab+GEM+CDDP	Pembrolizumab 200mg/body day1
			GEM 1000mg/m ² day1.8
			CDDP 25mg/m ² day1.8
			1クール:3週 CDDPは最大8クールまで、以降Pembrolizumab+GEM or Pembrolizumab単剤で継続
			副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー
膵癌 (C25)	AADC-0001	S-1(CG)	用法 a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的)
			用量 朝食後および夕食後の1日2回
			体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回
			1.25から1.5m ² 未満 50mg/回
			1.5m ² 以上 60mg/回
膵癌 (C25)	AADC-0015	GEM	GEM 1000 mg/m ² を週1回 3回投与 1週休薬 1000 mg/m ² を2週間に1回
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感
膵癌 (C25)	AADC-0143	GEM +IMRT療法	GEM 1000 mg/m ² を週1回 3回投与 1週休薬
			放射線照射 1.8Gy×28Fr total50.4Gy
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感
膵癌 (C25)	AADC-0159	Erlotinib+GEM療法	Erlotinib 100mg/day 連日経口投与
			GEM 1000 mg/m ² を週1回 3回投与 1週休薬
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、ざ瘡様皮疹等の発疹、悪心・嘔吐、下痢 間質性肺炎
膵癌 (C25) 治癒切除不能膵癌	AADC-0200	FOLFIRINOX	L-OHP 85mg/m ² day1
			5-FU (bolus) 400mg/m ² day1
			5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46hr
			I-LV 200mg/m ² day1
			CPT-11 180mg/m ² day1
			2週ごと
			副作用: 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐、倦怠感、下痢 発熱、脱毛、肝機能障害
膵癌 (C25) 治癒切除不能膵癌	AADC-0212	GEM+nab-PTX	GEM 1000mg/m ² day1
			nab-PTX 125mg/m ² day1
			3週投与1週休薬
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感 脱毛、末梢神経障害、発疹、下痢
膵癌 (C25)	AADC-0248	Olaparib	オラパリブ 1回300mgを1日2回経口投与 副作用: 悪心、嘔吐、味覚異常

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			貧血、好中球減少、血小板減少、リンパ球減少 疲労、無力症、間質性肺炎 下痢、頭痛
膵癌 (C25) 切除可能膵癌術前	AADC-0256	GEM+S-1(膵癌NAC)	GEM 1000 mg/m ² day1.day8 30分かけて点滴静注 S-1 体表面積毎(80mg~120mg) 14日間 分2で内服 (day1の夕方からday15の朝まで) これを2コース繰り返す。 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感 下痢、口内炎、色素沈着、発疹
膵癌 (C25) 治癒切除不能膵癌	AADC-0318	Nal-IRI+5FU/LV	Liposomal Irinotecan 70mg/m ² day1 5-FU (infusion) 2400mg/m ² day1~3 I-LV 200mg/m ² day1 2週毎 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、肝機能障害、脱毛 倦怠感、好中球減少、貧血、低カリウム血症
膵癌 (C25) 治癒切除不能膵癌	AADC-0014	mFOLFOX6療法	L-OHP 85mg/m ² day1 5-FU (bolus) 400mg/m ² day1 5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46hr I-LV 200mg/m ² day1 2週ごと 副作用: 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐、倦怠感、下痢 発熱、肝機能障害
膵内分泌腫瘍 (C25.4)	AADC-0169	Everolimus	Everolimus 10mg/day 連日経口投与 副作用: 口内炎、発疹、下痢、疲労、末梢性浮腫、悪心・嘔吐、食欲不振 鼻出血、貧血、味覚障害、体重減少、頭痛、掻痒症、高血糖 血小板減少、無力症、間質性肺炎、腎不全、アナフィラキシー様症状 急性呼吸窮迫症候群、肺塞栓症、深部静脈血栓症、好中球減少 悪性腫瘍(二次発癌)、皮膚乾燥、爪の障害、心嚢液貯留 進行性多巣性白室脳症、BKウイルス腎症、細胞蛋白症
消化管神経内分泌腫瘍 (C26.9)	AADC-0188	サントスタチンLAR	サントスタチンLAR 1回30mgを4週毎に臀部筋肉内に注射 副作用: 注射部位硬結、注射部位疼痛、胆石症、下痢
膵・消化管神経内分泌腫瘍 (C25.4、C26.9)	AADC-0257	Lanreotide	Lanreotide 1回120mgを4週毎に深部皮下内に注射 副作用: 注射部位硬結、注射部位疼痛、徐脈 胆石症、下痢、白色便
膵・消化管神経内分泌腫瘍 (C25.4、C26.9)	AADC-0277	Streptozocin	Streptozocin 1000 mg/m ² 1週間毎 30分かけて点滴静注 副作用: 腎障害、骨髄抑制、耐糖能異常、肝障害 血管痛、悪心、便秘、味覚異常、倦怠感
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0001	S-1(CG)	用法 a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的) 用量 朝食後および夕食後の1日2回 体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			1.25から1.5㎡未満 50 mg/回 1.5㎡以上 60mg/回
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0010	UFT(UFTE)	用法・用量 1日量としてテガフル300-600mgを1日2-3回に分割投与 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0015	GEM	GEM 1000 mg/㎡を週1回 3回投与 1週休薬 副作用: 1000 mg/㎡を2週間に1回 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0019	PTX + CBDCA療法(TC)	PTX 200mg/㎡ day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 3週ごと 副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0020	DTX + CDDP療法(DC)	DTX 60mg/㎡ day1 CDDP 80mg/㎡ day1 3~4週ごと 副作用: 悪心・嘔吐、腎機能障害、神経毒性、聴覚障害、電解質異常、浮腫、倦怠感、味覚異常、爪の変形、骨髄抑制、脱毛
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0022	Iressa	250mgを1日1回経口投与 副作用: 下痢、皮膚乾燥症、ニキビ様皮疹、肝機能障害、間質性肺炎
肺癌 (C34) 非細胞肺癌	AADC-0025	CPT-11	CPT-11 100mg/㎡ day1.8.15 1週間隔で3回投与、1週休薬 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、間質性肺炎
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0091	tri-weekly DTX	DTX 60mg/㎡ day1 3週ごと 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0098	CPT-11+CDDP療法(IP)	CDDP 80mg/㎡ day1 CPT-11 60mg/㎡ day1.8.15 4週ごと 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、倦怠感、腎機能障害、下痢、間質性肺炎、食欲不振、末梢神経障害、脱毛、
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0106	Tarceva	エルロチニブ 150mg 1日1回経口投与 副作用: 発疹、下痢、皮膚乾燥、搔痒感、間質性肺炎、肝機能障害
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0111	VNR	ビノレルピン 25mg/㎡ day1.8 3週ごと(4クール以上、最大6クール)
肺癌 (C34)	AADC-0114	Pemetrexed+ CDDP療法	

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
非小細胞肺癌			Pemetrexed 500mg/m ² day1 CDDP 75mg/m ² day1 3週毎 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、倦怠感、口内炎、神経障害
肺癌 (C34)	AADC-0119	CDDP+VNR+IMRT療法	
非小細胞肺癌			CDDP 80mg/m ² day1 VNR 20mg/m ² day1, 8 3週ごと 4コース 放射線療法 2Gy/日 5回/週 計6週30回60Gy (化学療法1コース目のday3から開始) 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、間質性肺炎、食欲不振、口内炎、倦怠感 腎機能障害
肺癌 (C34)	AADC-0149	Bevacizumab based TC療法	
非小細胞肺癌			PTX 200mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 ペバシズマブ 15mg/kg day1 3週ごと CBDCA+PTX+ペバシズマブを3週間間隔で4~6サイクル実施後、アバスタチン単独を3週間間隔で投与する 副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、喀血、肺出血、血栓塞栓症
肺癌 (C34)	AADC-0151	CDDP+VNR療法	
非小細胞肺癌			CDDP 80mg/m ² day1 VNR 25mg/m ² day1, 8 3週ごと 4コース 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、間質性肺炎、食欲不振、口内炎、倦怠感 腎機能障害
肺癌 (C34)	AADC-0170	Pemetrexed	
非小細胞肺癌			Pemetrexed 500mg/m ² day1 3週毎 4コース 副作用: 肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心
肺癌 (C34)	AADC-0180	CBDCA+Pemetrexed	
非小細胞肺癌			Pemetrexed 500mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 3週毎 4コース 副作用: 肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり
肺癌 (C34)	AADC-0176	Crizotinib	
ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行再発非小細胞肺癌			Crizotinib 1回250mg1日2回内服
ROS1融合遺伝子陽性の切除不能な進行再発非小細胞肺癌			副作用: 悪心・嘔吐、視力障害、下痢、便秘、末梢性浮腫、間質性肺炎 肝機能障害、QT間隔延長、骨髄抑制
肺癌 (C34)	AADC-0181	PEM+CBDCA+BV followed by PEM+BV	
進行性非扁平非小細胞肺癌			Pemetrexed 500mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 ペバシズマブ 15mg/kg day1 3~4週毎4コース後 CR、PR、SDなら維持療法へ 維持療法 Pemetrexed 500mg/m ² day1 ペバシズマブ 15mg/kg day1 3週毎PDになるまで継続 副作用: 肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、喀血、肺出血、血栓塞栓症
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0186	CBDCA+S-1療法	CBDCA 目標AUC=5 day1 TS-1 80~120mg/body day1~14 3週毎 副作用 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 神経障害、関節痛、脱毛
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0189	IMRT+CBDCA	CBDCA 30mg/m ² day1~day5 IMRT 2Gy/日 day1~day5 1週毎 CBDCAは4週間実施、IMRTは6週間実施 副作用: 嘔気・嘔吐、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、発熱、骨髄抑制、肝機能障害 アナフィラキシー様症状、間質性肺炎、急性腎不全、肝不全、 消化管壊死、消化管出血、出血性腸炎、偽膜性大腸炎、麻痺性イレウス 脳梗塞、肺梗塞、血栓・塞栓症、心筋梗塞、うっ血性心不全、溶血性尿毒症症候群 急性呼吸窮迫症候群、DIC、急性睪炎、難聴、皮膚炎、放射線肺炎、放射線食道炎 脊髄症
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0194	nab-paclitaxel + Carboplatin	アブラキサン 100mg/m ² day1, 8, 15 CBDCA 目標AUC=6/body day1 4週毎 副作用: 脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹 食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、脳神経麻痺、アナフィラキシー 間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0201	AVAPERL	Pemetrexed 500mg/m ² day1 CDDP 75mg/m ² day1 ペバシズマブ 7.5mg/kg day1 3週毎4コース後 SDもしくはresponse(+)なら維持療法へ 維持療法 Pemetrexed 500mg/m ² day1 ペバシズマブ 7.5mg/kg day1 3週毎PDになるまで継続 副作用: 腎機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり 高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、喀血、肺出血、血栓塞栓症
肺癌 (C34) 局所進行非小細胞肺癌	AADC-0202	S-1+CDDP+RT	CDDP 60mg/m ² day1 TS-1 1回40mg/m ² 1日2回 day1~14 4週毎2コース施行中に放射線治療施行 1回2Gy 週5日 30回照射 計60Gy(6週間) 上記化学放射線療法終了後2週間後から CDDP 60mg/m ² day1 TS-1 1回40mg/m ² 1日2回 day1~14 4週毎2コース施行 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
肺癌 (C34)	AADC-0204	Afatinib	Afatinib 1日1回40mg経口投与

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
EGFR遺伝子変異陽性の手術不能または再発 非小細胞肺癌			患者の状態により適宜増減 1日50mgまで 副作用: 下痢、発疹、爪囲炎、口内炎、間質性肺炎、皮膚障害、肝機能障害 鼻出血、食欲減退、疲労、粘膜の炎症、体重減少、味覚異常 結膜炎、心障害
肺癌 (C34) 小細胞肺癌	AADC-0010	UFT(UFTE)	用法・用量 1日量としてテガフル300-600mgを1日2-3回に分割投与 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
肺癌 (C34) 小細胞肺癌	AADC-0023	CBDCA+ETP療法(CE)	VP-16 80mg/m ² day1~3 CBDCA 目標AUC=5/body day1 3~4週ごと 副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振
肺癌 (C34) 小細胞肺癌	AADC-0024	CPT-11+ CDDP療法(IP)	CDDP 60mg/m ² day1 CPT-11 60mg/m ² day1.8.15 4週ごと 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、倦怠感、腎機能障害、下痢、間質性肺炎、食欲不振 末梢神経障害、脱毛、
肺癌 (C34) 小細胞肺癌	AADC-0025	CPT-11	CPT-11 100mg/m ² day1.8.15 1週間隔で3回投与、2週休薬 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、間質性肺炎
肺癌 (C34) 小細胞肺癌	AADC-0100	PE(CDDP+ETP)+IMRT療法	CDDP 80mg/m ² day1 VP-16 100mg/m ² day1~3 3~4週ごと 4コース 副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振
肺癌 (C34)	AADC-0137	AMR	AMR 35~40mg/m ² 3日間連続投与 3週ごと 3~6コース 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、脱毛、肝機能障害、発熱
肺癌 (C34)	AADC-0145	GC療法	GEM 1000mg/m ² day1.8 CDDP 80mg/m ² day1 3週毎 4~6コース 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱
肺癌 (C34) ALK陽性・ROS1陽性肺癌	AADC-0176	Crizotinib	クリゾチニブ 1回250mgを1日2回経口投与 副作用: 間質性肺疾患、肝機能障害、QT間隔延長、徐脈 血液障害、心不全、発疹、便秘、口内炎、悪心 腎機能障害、倦怠感、筋肉痛、光線過敏性
肺癌 (C34) CPT-11が使用できない進展型小細胞肺癌	AADC-0177	CDDP+VP-16	CDDP 80mg/m ² day1 VP-16 100mg/m ² day1~3 副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振
肺癌 (C34)	AADC-0210	Alectinib	アレクチニブ 1回300mg1日2回経口投与 副作用: 間質性肺疾患、肝機能障害、骨髄抑制、消化管穿孔 血栓塞栓症、味覚異常、発疹、便秘、口内炎、悪心 腎機能障害、倦怠感、筋肉痛、光線過敏性

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
肺癌 (C34) EGFR遺伝子変異陽性肺癌	AADC-0211	Erlotinib+Bevacizumab併用療法	ベバシズマブ 15mg/kg 3週間毎 エルロチニブ 100~150mg 1日1回経口投与 副作用: 発疹、下痢、皮膚乾燥、掻痒感、肝機能障害、神経毒性、食欲減退 口内炎、嘔吐、高血圧、脱毛、関節痛、疲労、倦怠感、卵巣機能不全 重大な副作用: ショック、アナフィラキシー、消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血 血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧クリーゼ、可逆性後白質脳症症候群 ネフローゼ症候群、骨髄抑制、感染症、うつ血性心不全、間質性肺炎 血栓性微小血管症、
肺癌 (C34) 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
肺癌 (C34)	AADC-0231	Osimertinib	タグリッソ 1日1回80mg 副作用: 発疹、ざ瘡、下痢、皮膚乾燥、爪の障害、間質性肺炎、QT間隔延長 骨髄抑制、肝機能障害
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0232	RAM+DTX	RAM 10mg/kg day1 3週ごと DTX 60mg/m ² day1 3週ごと 副作用: 腹痛、高血圧、下痢、 動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害 インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血 骨髄抑制、低カリウム血症、低ナトリウム血症 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、
肺癌 (C34) PD-L1陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 PD-L1陽性の未治療非小細胞肺癌	AADC-0235	Pembrolizumab	ペムブロリズマブ 1回200mg 3週間隔 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
肺癌 (C34)	AADC-0237	Ceritinib	セリチニブ 1日1回750mg空腹時に経口投与 副作用: 間質性肺炎、肝機能障害、QT間隔延長、徐脈、下痢 高血糖、眼障害、皮下組織障害、胃腸障害、疲労 腎及び尿路障害
肺癌 (C34) 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	AADC-0241	Atezolizumab	アテゾリズマブ 1200mg day1 3週ごと 副作用: 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害
肺癌 (C34)	AADC-0243	Lorlatinib	ロルラチニブ 1日1回100mgを経口投与 副作用: 間質性肺炎、肝機能障害、QT間隔延長、徐脈、下痢 膵炎、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症 末梢性ニューロパシー
肺癌 (C34)	AADC-0245	CBDCA+PEM+Pembrolizumab→PEM+Pembrolizumab	

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
進行性非扁平上皮非小細胞肺癌			Pemetrexed 500mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=5 day1 Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎4コース後 維持療法へ 維持療法 Pemetrexed 500mg/m ² day1 Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎 副作用: 肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 膝炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
肺癌 (G34)	AADC-0246	CBDCA+nab-PTX+Pembrolizumab→Pembrolizumab	
扁平上皮癌			アブラキサン 100mg/m ² day1, 8, 15 CBDCA 目標AUC=6/body day1 Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎4コース後 維持療法へ 維持療法 Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎 副作用: 脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹 食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー 間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 膝炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
肺癌 (G34)	AADC-0247	CBDCA+PTX+Bevacizumab+Atezolizumab→Bevacizumab+Atezolizumab維持療法	
非扁平上皮非小細胞肺癌			PTX 200mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 ベバシズマブ 15mg/kg day1 アテゾリズマブ 1200mg/body day1 3週毎4-6コース後 維持療法へ 維持療法 ベバシズマブ 15mg/kg day1 アテゾリズマブ 1200mg/body day1 3週毎 副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、悪心・嘔吐 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膝炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害
肺癌 (G34)	AADC-0254	CBDCA+VP-16+Atezolizumab f/b Atezolizumab	
小細胞肺癌			VP-16 100mg/m ² day1~3 CBDCA 目標AUC=5 day1 アテゾリズマブ 1200mg/body day1 3週毎4コース後 維持療法へ 維持療法 アテゾリズマブ 1200mg/body day1 3週毎

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振、疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害
肺癌 (C34) 進行性非扁平上皮非小細胞肺癌	AADC-0262	CBDCA+PEM+Atezolizumab→PEM+Atezolizumab	Pemetrexed 500mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 Atezolizumab 1200mg/body day1 3週毎4-6コース後 維持療法へ 維持療法 Pemetrexed 500mg/m ² day1 Atezolizumab 1200mg/body day1 3週毎 副作用: 肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
肺癌 (C34) HER2遺伝子変異陽性 非小細胞肺癌	AADC-0264	Trastuzumab Deruxtecan	Trastuzumab Deruxtec 5.4mg/kg day1 3週ごと 副作用: 間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション 骨髄抑制、脱毛、疲労、悪心・嘔吐、下痢、便秘、口内炎
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0268	Pembrolizumab(6週間)	ペムブロリズマブ 1回400mg 6週間隔 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
肺癌 (C34) 小細胞肺癌	AADC-0270	CDDP+VP-16+Durvalumab→維持療法Durvalumab	VP-16 80-100mg/m ² day1~3 CDDP 75-80mg/m ² day1 Durvalumab 1500mg/body day1 3週毎4コース後 維持療法へ 維持療法 Durvalumab 1500mg/body day1 4週毎 副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振 腎機能障害、疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害
肺癌 (C34) 小細胞肺癌	AADC-0271	CBDCA+VP-16+Durvalumab→維持療法Durvalumab	VP-16 80-100mg/m ² day1~3 CBDCA 目標AUC=5-6 day1 Durvalumab 1500mg/body day1 3週毎4コース後 維持療法へ 維持療法 Durvalumab 1500mg/body day1 4週毎

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振、疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢、間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎、髄膜炎、神経障害
肺癌 (C34) 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症、大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害、腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0274	Ipilimumab+Nivolumab	Ipilimumab 1mg/kg 6週間隔 Nivolumab 360mg/body 3週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症、大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害、腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション、血球貪食症候群、結核
肺癌 (C34) 小細胞肺癌	AADC-0275	Nogitecan	Nogitecan 1mg/m ² 5日間連続投与 3週ごと 副作用: 骨髄抑制、消化管出血、間質性肺炎、血栓塞栓症、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、発熱、易疲労感
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 (前治療2レジメン以内)	AADC-0276	nab-PTX単剤	nab-PTX 100mg/m ² day1,8,15 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感、脱毛、末梢神経障害、発疹、下痢
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0279	Ipilimumab+Nivolumab+PEM+CDDP	Ipilimumab 1mg/kg 6週間隔 Nivolumab 360mg/body 3週間隔 Pemetrexed 500mg/m ² 3週間隔 CDDP 75mg/m ² 3週間隔 ★CDDP+Pemetrexedは2コースで終了 ★維持療法はNivolumab (±Pemetrexed)を3週毎+Ipilimumab6週毎 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症、大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害、腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション、血球貪食症候群、結核、悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0280	Ipilimumab+Nivolumab+PEM+CBDCA	Ipilimumab 1mg/kg 6週間隔 Nivolumab 360mg/body 3週間隔 Pemetrexed 500mg/m ² 3週間隔 CBDCA 目標AUC=6 3週間隔 ★CBDCA+Pemetrexedは2コースで終了 ★維持療法はNivolumab (±Pemetrexed)を3週毎+Ipilimumab6週毎 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症、大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害、腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション、血球貪食症候群、結核、発疹、骨髄抑制、悪心、下痢、味覚異常、便秘、しゃっくり
肺癌 (C34)	AADC-0281	Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX	Ipilimumab 1mg/kg 6週間隔

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
非小細胞肺癌			Nivolumab 360mg/body 3週間隔
			PTX 200mg/m ² 3週間隔
			CBDCA 目標AUC=6 3週間隔
			★CBDCA+PTXは2コースで終了
			★維持療法はNivolumabを3週毎+Ipilimumab6週毎
			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、悪心・嘔吐
肺癌 (C34) 扁平上皮癌	AADC-0282	Nectinumab+GEM+CDDP	Necitumumab 800mg day1.8 GEM 1250mg/m ² day1.8 CDDP 75mg/m ² day1 3週毎 ★CDDP+GEMは最大6コース ★維持療法はNecitumumab単剤でPDまで継続 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、インフュージョンリアクション、下痢
肺癌 (C34)	AADC-0299	CBDCA+PTX+Pembrolizumab	CBDCA 目標AUC=6/body day1 PTX 200mg/m ² day1 Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎4コース後 維持療法へ 維持療法 Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎 副作用: 脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹 食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー 間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 睥炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
肺癌 (C34) EGFR遺伝子変異陽性肺癌	AADC-0304	Erlotinib+Ramucirumab	ラムシルマブ 10mg/kg 2週間毎 エルロチニブ 150mg 1日1回 空腹時 連日経口投与 副作用: 高血圧、動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害 インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血 発疹、下痢、皮膚乾燥、掻痒感、間質性肺炎患、肝機能障害
肺癌 (C34) EGFR遺伝子変異陽性肺癌	AADC-0305	Gefitinib+Ramucirumab	ラムシルマブ 10mg/kg 2週間毎 ゲフィチニブ 250mg 1日1回 連日経口投与 副作用: 高血圧、動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害 インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血 発疹、下痢、皮膚乾燥、掻痒感、間質性肺炎患、肝機能障害
肺癌 (C34) BRAF遺伝子変異陽性肺癌	AADC-0306	Dabrafenib+Trametinib	ダブラフェニブ 1回150mg 1日2回 空腹時連日経口投与 トラメチニブ 1回2mg 1日1回 空腹時連日経口投与 副作用: 発熱、肝機能障害、眼障害、心障害 静脈血栓塞栓症、脳血管障害 有棘細胞癌、横紋筋融解症、間質性肺炎患

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
肺癌 (C34) 局所進行非小細胞肺癌	AADC-0307	CBDCA+PTX+RT	PTX 40mg/m ² day1
			CBDCA 目標AUC=2 day1
			毎週投与 計6回(放射線療法を行っている間)
			副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 非扁平上皮癌	AADC-0315	Atezolizumab+nab-PTX+CBDCA→Atezolizumab	アブラキサン 100mg/m ² day1, 8, 15
			CBDCA 目標AUC=6/body day1
			Atezolizumab 1200mg/body day1
			3週毎4コース後 維持療法へ
			維持療法
			Atezolizumab 1200mg/body day1
			3週毎
副作用: 脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹、食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー、間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全、難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群、急性腎不全、白質脳症、大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病、肺炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎			
肺癌 (C34) ALK陽性肺癌	AADC-0325	Brigatinib	ブリグチニブ 1日1回90mgを7日間経口投与後、1日1回180mgを経口投与(14日以上休薬した場合は90mgにて再開)
			副作用: 間質性肺疾患、高血圧、徐脈、高血糖、視覚障害、CK上昇、リバーゼorアミラーゼ上昇(膵炎)、下痢、悪心、肝機能障害、口内炎、発疹
肺癌 (C34) KRAS G12C変異陽性肺癌	AADC-0328	Sotorasib	ソトラスピブ 1日1回 960mg(8錠)を連日経口投与
			副作用: 食欲不振、悪心、嘔吐、下痢、肝機能障害、間質性肺疾患
肺癌 (C34) ROS1融合遺伝子陽性肺癌	AADC-0331	Entrectinib	エストレクチニブ 1日1回 600mg(3Cap)を連日経口投与
			副作用: 心臓障害、QT延長、認知障害・運動失調、間質性肺疾患、失神、成長発達遅延、味覚異常、浮動性めまい、末梢感覚ニューロパチー
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0332	Tremelimumab+durvalumab+PEM+CBDCA	Tremelimumab 75mg/body day1
			Durvalumab 1500mg/body day1
			Pemetrexed 500mg/m ² day1
			CBDCA 目標AUC=6 day1
			3週毎 CBDCAは4コースで終了
			維持療法は4週毎にPemetrexed+Durvalumab
			★維持療法の2回目のみ Pemetrexed+Durvalumab+Tremelimumab
副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症、大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害、腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション、血球貪食症候群、結核、発疹、骨髄抑制、悪心、下痢、味覚異常、便秘、しゃっくり			
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0333	Tremelimumab+durvalumab+nab-PTX+CBDCA	Tremelimumab 75mg/body day1
			Durvalumab 1500mg/body day1

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			nab-PTX 100mg/m ² day1、8、15 CBDCA 目標AUC=6 day1 3週毎 CBDCA+nab-PTXは4コースで終了 維持療法は4週毎にDurvalumab ★維持療法の2回のみ Durvalumab+Tremelimumab 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、悪心・嘔吐
肺癌 (C34) 術前 Stage IIIA (Stage II でも症例によって考慮)	AADC-0334	Nivolumab+PTX+CBDCA(術前のみ)	Nivolumab 360mg/body day1 CBDCA 目標AUC=5 or 6 day1 PTX 175mg/m ² day1 3週毎 最大3コース 副作用: 脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹 食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー 間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 肺炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
肺癌 (C34) 肺腺癌術前 Stage IIIA (Stage II でも症例によって考慮)	AADC-0335	Nivolumab+CDDP+PEM(術前のみ)	Nivolumab 360mg/body day1 Pemetrexed 500mg/m ² day1 CDDP 75mg/m ² day1 3週毎 最大3コース 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎
肺癌 (C34) 切除可能非小細胞肺癌	AADC-0338	Nivolumab+GEM+CDDP(術前のみ)	Nivolumab 360mg/body day1 CDDP 75mg/m ² day1 GEM 1000mg/m ² day1,day8 3週毎 最大3コース 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎
肺癌 (C34) 切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における 根治的放射線療法後の維持療法 投与期間は12ヶ月まで	AADC-0345	Durvalumab	Durvalumab 1500mg/body day1 体重30kg以下の場合は1回20mg/kg 4週毎 副作用: 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー
肺癌 (C34) METエクソン14スキッピング変異陽性 切除不能な進行・再発非小細胞性肺癌	AADC-0350	Capmatinib	カプマチニブ 1日2回 1回400mg を連日経口投与 副作用: 間質性肺疾患、体液貯留、肝機能障害、腎機能障害 悪心・嘔吐、下痢、リバーゼ増加、疲労 低リン酸血症、発疹、便秘、血中ビリルビン増加

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
肺癌 (C34) EGFR変異陽性肺癌	AADC-0359	Osimertinib+PEM+CDDP	Osimertinib 1日1回80mg を連日経口投与
			CDDP 75mg/m ² day1
			Pemetrexed 500mg/m ² day1
			3週毎 CDDP併用は最大4コース
			維持療法はPEM 500mg/m ² day1 3週毎 + Osimertinib 80mg 連日 副作用: 悪心・嘔吐、下痢、便秘、食欲不振、口内炎 皮疹、皮膚乾燥、浮腫 貧血、好中球減少、血小板減少
肺癌 (C34) 肺扁平上皮癌(周術期)	AADC-0361	Pembrolizumab+GEM+CDDP	Pembrolizumab 200mg/body day1
			CDDP 75mg/m ² day1
			GEM 1000mg/m ² day1,day8
			(術前) 3週毎 最大4コース Pembrolizumab 200 or 400mg/body day1
			(術後) 200mg 3週毎 もしくは 400mg6週毎 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎
肺癌 (C34) 非扁平上皮非小細胞肺癌(周術期)	AADC-0362	Pembrolizumab+PEM+CDDP	Pembrolizumab 200mg/body day1
			Pemetrexed 500mg/m ² day1
			CDDP 75mg/m ² day1
			(術前) 3週毎 最大4コース Pembrolizumab 200 or 400mg/body day1
			(術後) 200mg 3週毎 もしくは 400mg6週毎 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎
肺癌 (C34) 白金製剤を含む化学療法後に増悪した小細胞肺癌	AADC-0366	Tarlatab	Tarlatab 1mg day1 10mg day8
			10mg day15 以降
			2週毎 副作用: サイトカイン放出症候群 (CRS) 免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群 (ICANS) を含む神経学的事象 骨髄抑制、間質性肺疾患、食欲不振、味覚異常
肺癌 (C34) 限局型小細胞肺癌における 根治的放射線療法後の維持療法 投与期間は24ヶ月まで	AADC-0368	Durvalumab	Durvalumab 1500mg/body day1
			体重30kg以下の場合は1回20mg/kg
			4週毎 副作用: 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー
肺癌 (C34) EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 EGFR遺伝子変異陽性の 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	AADC-0369	Amivantamab+CBDCA+PEM	Amivantamab 80kg未満 80kg以上
			350mg/body 350mg/body day1
			1050mg/body 1400mg/body day2
			1400mg/body 1750mg/body day8, day15 1400mg/body 1750mg/body day1 (2サイクル目)

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			1750mg/body 2100mg/body day1 (3サイクル目以降)
			目標AUC=5 day1
			Pemetrexed 500mg/m ² day1
			3週毎 CBDCAは4コースで終了
			副作用: ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、低マグネシウム血症、体液貯留
			掻痒感、インフュージョンリアクション、下痢、静脈血栓塞栓症
			肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感
			下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり
肺癌 (C34) 切除可能な非小細胞癌(扁平上皮癌) II A～III B(N2)期	AADC-0379	Durvalumab+PTX+CBDCA	Durvalumab 1500mg/body day1
			CBDCA 目標AUC=6 day1
			PTX 200mg/m ² day1
			術前 3週毎 4コース
			Durvalumab 1500mg/body day1
			術後 4週毎 12コース
			副作用: 脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹
			食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー
			間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全
			難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群
			急性腎不全、白質脳症、
			大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病
			肺炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
肺癌 (C34) 切除可能な非小細胞癌(扁平上皮癌) II A～III B(N2)期	AADC-0380	Durvalumab+CBDCA+GEM	Durvalumab 1500mg/body day1
			CBDCA 目標AUC=5 day1
			GEM 1000mg/m ² day1,day8
			術前 3週毎 4コース
			Durvalumab 1500mg/body day1
			術後 4週毎 12コース
			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
			血球貪食症候群、結核
			悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎
肺癌 (C34) 切除可能な非小細胞癌(扁平上皮癌) II A～III B(N2)期	AADC-0381	Durvalumab+CDDP+GEM	Durvalumab 1500mg/body day1
			CDDP 75mg/m ² day1
			GEM 1000mg/m ² day1,day8
			術前 3週毎 4コース
			Durvalumab 1500mg/body day1
			術後 4週毎 12コース
			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
			血球貪食症候群、結核
			悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎
肺癌 (C34) 切除可能な非小細胞癌(非扁平上皮癌) II A～III B(N2)期	AADC-0382	Durvalumab+CBDCA+PEM	Durvalumab 1500mg/body day1
			Pemetrexed 500mg/m ² day1
			CBDCA 目標AUC=5 day1
			術前 3週毎 4コース
			Durvalumab 1500mg/body day1

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			術後 4週毎 12コース 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 発疹、骨髄抑制、悪心、下痢、味覚異常、便秘、しゃっくり
肺癌 (C34) 切除可能な非小細胞癌(非扁平上皮癌) II A~III B(N2)期	AADC-0383	Durvalumab+CDDP+PEM	Durvalumab 1500mg/body day1 Pemetrexed 500mg/m ² day1 CDDP 75mg/m ² day1 術前 3週毎 4コース Durvalumab 1500mg/body day1 術後 4週毎 12コース 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎
肺癌 (C34) PD-L1 50% 以上の非小細胞肺癌	AADC-0390	Cemiplimab	Cemiplimab 1回350mg 3週毎 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 肺炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
肺癌 (C34) 化学療法後に増悪したHER2 (ERBB2) 遺伝子変異陽性の 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	AADC-0391	Zongertinib	Zongertinib 1日1回 1回120mg を連日経口投与 副作用: 肝機能障害、間質性肺炎、心機能障害 重度の下痢、悪心、血球減少 口内炎、皮膚乾燥、そう痒症、爪の障害、発疹
胸腺腫 (C37)	AADC-0308	ADOC	DXR 40mg/m ² day1 CDDP 50mg/m ² day1 VCR 0.6mg/m ² (最大2mg/body) day3 CPA 700mg/m ² day4 3週毎 副作用: 骨髄抑制、心毒性、末梢神経障害、肝障害、悪心・嘔吐、脱毛 腎障害、出血性膀胱炎
胸腺癌 (C37) 進行胸腺癌2次治療以降	AADC-0222	Lenvatinib	用法・用量 1回24mg 1日1回 副作用: 高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労 口内炎、蛋白尿、手掌・足底発赤知覚不全症候群、出 動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔 可逆性後白質脳症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延 低カルシウム血症
胸腺癌 (C37)	AADC-0137	AMR	AMR 35~40mg/m ² 3週ごと 3~6コース 3日間連続投与 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、脱毛、肝機能障害、発熱
悪性胸膜中皮腫 (C38)	AADC-0114	Pemetrexed+ CDDP療法	Pemetrexed 500mg/m ² day1 CDDP 75mg/m ² day1

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			3週毎 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、倦怠感、口内炎、神経障害
悪性胸膜中皮腫 (C38)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
悪性胸膜中皮腫 (C38)	AADC-0274	Ipilimumab+Nivolumab	Ipilimumab 1mg/kg 6週間隔 Nivolumab 360mg/body 3週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核
悪性胸膜中皮腫 (C38)	AADC-0349	CBDCA+Pemetrexed	Pemetrexed 500mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=5 day1 3週毎 副作用: 肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり
骨髄腫 (C42)	AADC-0161	Bortezomib	ボルテゾミブ 1.3mg/m ² 1日1回 day1.4.8.11 3週毎 副作用: 肺障害、心障害、末梢性ニューロパシー、イレウス 骨髄抑制、低血圧、腫瘍崩壊症候群、皮膚粘膜眼症候群 中毒性表皮壊死症、発熱、可逆性後白質脳症症候群 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、肝機能障害
骨髄腫 (C42)	AADC-0165	Bortezomib+Dexamethasone	ボルテゾミブ 1.3mg/m ² 1日1回 day1.4.8.11 デキサメタゾン 20mg 1日1回 day1.2.4.5.8.9.11.12 3週毎 副作用: 肺障害、心障害、末梢性ニューロパシー、イレウス 骨髄抑制、低血圧、腫瘍崩壊症候群、皮膚粘膜眼症候群 中毒性表皮壊死症、発熱、可逆性後白質脳症症候群 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、肝機能障害、血管浮腫 不眠症、無力症、疲労、錯覚症、筋痙攣、高血糖 誘発感染症、続発性副腎皮質機能不全、消化性潰瘍 骨粗鬆症、霧視、紅斑、味覚異常、血栓塞栓症、緑内障、
骨髄腫 (C42) 原発性マクログロブリン血症	AADC-0218	DRC療法	デキサメタゾン 20mg 点滴 day1 リツキシマブ 375mg/m ² 点滴 day1 シクロホスファミド 200mg/m ² 経口 day1~5 3週毎6ヶ月間 副作用: アナフィラキシー様症状、腫瘍崩壊症候群、肝機能障害、 皮膚粘膜症状、皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死融解症 骨髄抑制、間質性肺炎、心障害、消化管穿孔、イレウス、SIADH 横紋筋融解症、悪心・嘔吐、脱毛、色素沈着、食欲不振 口内炎、不眠、高血糖
悪性黒色腫 (C43)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
悪性黒色腫 (C43)	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
悪性軟部腫瘍 (C49)	AADC-0199	Pazopanib	パゾパニブ 1日1回800mg 経口投与 副作用: 下痢、疲労、悪心、高血圧、毛髪変色、食欲減退、体重減少、味覚異常 肝機能障害、心機能障害、動脈血栓性事象、静脈血栓性事象、出血 甲状腺機能障害、ネフローゼ症候群、蛋白尿、感染症、創傷治癒遅延
悪性軟部腫瘍 (C49)	AADC-0265	doxorubicin	doxorubicin 75mg/m ² day1 3週毎 total 6回施行 (心毒性に対する用量制限) 副作用: 悪心・嘔吐、白血球減少、食欲不振、脱毛、肝機能異常、下痢・軟便 全身倦怠感、口内炎
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経前	AADC-0027	Tamoxifen	TAM 1日1回20mg 副作用: 無月経、月経異常、悪心・嘔吐、食欲不振
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経前	AADC-0069	Zoladex	ゴセリン 4週に1回3.6mgを皮下投与 副作用: 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経前	AADC-0070	Zoladex LA	ゴセリン 10.8mgを前腹部に12~13週毎に1回投与 副作用: 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経前	AADC-0094	Leuprorelin	リュープロレリン 4週に1回3.75mgを皮下投与 12週に1回11.25mgを皮下投与へ切り替え使用あり 副作用: 間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、肝機能障害、黄疸、うつ状態 熱感、ほてり、のぼせ、頭痛・頭重、発汗、寝汗、注射部位障害 悪心・嘔吐、体重増加
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経前	AADC-0095	Leuprorelin + TAM療法	リュープロレリン 4週に1回3.75mgを皮下投与 12週に1回11.25mgを皮下投与へ切り替え使用あり TAM 1日1回20mg 副作用: 間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、肝機能障害、黄疸、うつ状態 熱感、ほてり、のぼせ、頭痛・頭重、発汗、寝汗、注射部位障害 悪心・嘔吐、体重増加、無月経、月経異常
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経前	AADC-0096	Leuprorelin + Femara療法	リュープロレリン 4週に1回3.75mgを皮下投与 12週に1回11.25mgを皮下投与へ切り替え使用あり レトロゾール 1日1回2.5mg 副作用: 間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、肝機能障害、黄疸、うつ状態 熱感、ほてり、のぼせ、頭痛・頭重、発汗、寝汗、注射部位障害 悪心・嘔吐、体重増加、関節痛、発疹、掻痒感、血栓症、塞栓症
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経前	AADC-0097	Femara	レトロゾール 1日1回2.5mg 副作用: ほてり、頭痛、関節痛、悪心、発疹、掻痒感、肝機能障害 塞栓症、血栓症
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経後	AADC-0030	Arimidex	アナストロゾール 1日1回 1mg 副作用: ほてり、嘔気、脱毛、性器出血
乳癌 (C50)	AADC-0031	Aromasin	

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
内分泌療法 閉経後			エキセメスタン 1日1回 25mg 副作用: ほてり、多汗、高血圧、めまい、悪心、疲労
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経後	AADC-0032	Fareston	トレミフェン 1日1回40mg 副作用: 肝機能障害、白血球減少
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経後	AADC-0033	high dose Fareston	トレミフェン 1日1回120mg 副作用: 肝機能障害、白血球減少
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経後	AADC-0034	Hysron-H	MPA 1日600から1200mg 分3 副作用: 体重増加、満月様顔貌、子宮出血、浮腫、血栓症、月経異常
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0001	S-1(CG)	用法 a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的) 用量 朝食後および夕食後の1日2回 体表面積 1.25㎡未満 40mg/回 1.25から1.5㎡未満 50 mg/回 1.5㎡以上 60mg/回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0010	UFT(UFTE)	用法・用量 1日量としてテガフル300-600mgを1日2-3回に分割投与 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0035	Xeloda	カベシタビン 1日2回 3週連続投与 1週休薬 体表面積 1.31㎡未満 900mg/回 1.31から1.64㎡未満 1200mg/回 1.64㎡以上 1500mg/回 副作用: 手足症候群、骨髄抑制
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0036	weekly PTX	PTX 100mg/㎡ 6週投与2週休薬 副作用: 脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛、関節痛 悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0038	tri-weekly DTX	DTX 60~75mg/㎡ day1 3週毎 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0040	FEC100療法	5-FU 500mg/㎡ day1 EPI 100mg/㎡ day1 CPA 500mg/㎡ day1 3週毎 副作用: 悪心・嘔吐、白血球減少、食欲不振、脱毛、肝機能異常、下痢・軟便 全身倦怠感、口内炎
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0042	weekly Trastuzumab	トラスツズマブ 初回 4mg/kg 2回目以降 2mg/kg 毎週投与 副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0043	bi weekly Trastuzumab	トラスツズマブ* 4mg/kg day1 2週毎 副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0044	bi weekly PTX + Trastuzumab療法	PTX 80mg/㎡ day1

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			トラスツズマブ 4mg/kg day1 2週毎
			副作用: 脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛、関節痛、悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常、発熱、悪寒
乳癌 (C50)	AADC-0045	VNR	アントラサイクリン系・タキサン系無効例
化学療法			VNR 25mg/m ² 1週間間隔で2回投与 1週休薬
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、嘔気・嘔吐、静脈炎、発熱、口内炎、電解質異常
乳癌 (C50)	AADC-0046	VNR + Trastuzumab療法	
化学療法			VNR 25mg/m ² day1 2回投与1週休薬
			トラスツズマブ 2mg/kg day1 毎週投与 (初回は4mg/kg)
			3週毎
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、嘔気・嘔吐、静脈炎、発熱、口内炎、電解質異常、悪寒
乳癌 (C50)	AADC-0087	tri-weekly Trastuzumab	
化学療法			トラスツズマブ 初回8mg/kg day1
			2回目以降 6mg/kg day1
			3週毎
			副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制
乳癌 (C50)	AADC-0088	weekly trastuzumab + PTX療法	
化学療法			PTX 80mg/m ² day1
			トラスツズマブ 2mg/kg day1
			毎週投与
			副作用: 脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛、関節痛、悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常、発熱、悪寒
乳癌 (C50)	AADC-0129	Tykerb + Xeloda 療法	
化学療法			タイケルブ 1回1250mg 1日1回 連日投与
			カベシタピン 1回1000mg/m ² 1日2回 2週連続投与 1週休薬
			副作用: 手足症候群、骨髄抑制、下痢、口内炎、倦怠感、嘔気・嘔吐
乳癌 (C50)	AADC-0130	DTX+Cyclophosphamide療法	
化学療法			DTX 60~75mg/m ² day1
			CPA 500~600mg/m ² day1
			3週毎
			副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害
乳癌 (C50)	AADC-0131	DTX +Xeloda療法	
化学療法			DTX 60~75mg/m ² day1 3週毎
			カベシタピン 1回1250mg/m ² 1日2回 2週連続投与 1週休薬
			副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、手足症候群
乳癌 (C50)	AADC-0132	DTX+tri-weekly Trastuzumab 療法	
化学療法			DTX 60~75mg/m ² day1 3週毎
			トラスツズマブ 初回8mg/kg 2回目以降 6mg/kg day1 3週毎
			副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害
乳癌 (C50)	AADC-0144	XELODA + Trastuzumab療法	
化学療法			カベシタピン 1回1250mg/m ² 1日2回 2週連続投与 1週休薬
			トラスツズマブ 6mg/kg day1 3週毎
			副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制、手足症候群
乳癌 (C50)	AADC-0149	Bevacizumab based TC療法	
トリプルネガティブ			PTX 200mg/m ² day1
			CBDCA 目標AUC=6 day1
			ベバシズマブ 15mg/kg day1 3週ごと
			CBDCA+PTX+ベバシズマブを3週間間隔で4~6サイクル実施後、アバスチン単独を

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			3週間間隔で投与する
			副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、喀血、肺出血、血栓塞栓症
乳癌 (C50) 進行・再発乳癌 化学療法	AADC-0150	tri-weekly Abraxane	アブラキサシ 1回 260mg/m ² 3週毎
乳癌 (C50) アントサイクリン及びタキサンを含む抗がん剤治療後 再発・転移乳癌 化学療法	AADC-0166	Eribulin	副作用: 脱毛、疲労、筋痛、末梢神経障害、骨髄抑制、下痢、悪心嘔吐
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経後	AADC-0167	Fulvestrant	ハラヴェン 1,4mg/m ² day1, 8 3週ごと 副作用: 骨髄抑制、脱毛、疲労、食欲減退、発熱、便秘、下痢、嘔吐、口内炎、味覚異常、末梢神経障害、肝機能障害、間質性肺炎
乳癌 (C50)	AADC-0172	CMF(経口法)	フルベストラント 1回2筒(1筒250mg) 左右の臀部に1筒ずつ筋肉内投与 初回、2週後、4週後、その後4週ごとに1回 副作用: 注射部位疼痛、注射部位硬結、ほてり、注射部位搔痒感、肝機能障害、血栓塞栓症、悪心、便秘、卵巣腫大、頭痛、感覚異常、不眠症、背部痛、筋肉痛、高TG血症、高コレステロール血症
乳癌 (C50)	AADC-0173	CMF(静注法)	MTX 40mg/m ² day1, 8 5-FU 600mg/m ² day1, 8 CPA 1回50mg 1日2回 day1~15 4週ごと 副作用: 嘔気・嘔吐、食欲不振、脱毛、肝機能障害、口内炎、骨髄抑制
乳癌 (C50)	AADC-0174	Bevacizumab + PTX療法	MTX 40mg/m ² day1 5-FU 600mg/m ² day1 CPA 600mg/m ² day1 3週ごと 副作用: 嘔気・嘔吐、食欲不振、脱毛、肝機能障害、口内炎、骨髄抑制
乳癌 (C50)	AADC-0190	Gemcitabine 手術不能又は再発乳癌	PTX 90mg/m ² day1,8,15 ベバシズマブ 10mg/kg day1,15 4週ごと 副作用: 嘔気・嘔吐、食欲不振、脱毛、肝機能障害、口内炎、骨髄抑制、末梢神経障害、関節痛、筋肉痛、下痢、高血圧、蛋白尿、出血、消化管穿孔、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ、可逆性後白質脳症候群、創傷治癒遅延、味覚異常、爪の障害
乳癌 (C50) 進行・再発乳癌 補助化学療法	AADC-0195	THP療法	GEM 1250mg/m ² day1,8 3週ごと 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感、間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、心筋梗塞、うっ血性心不全、肺水腫、気管支痙攣、ARDS、腎不全、溶血性尿毒症症候群
			用法・用量 1クール目 Pertuzumab 840mg/body day1 Trastuzumab 8mg/kg day1 DTX 75mg/m ² day1 2クール目 Pertuzumab 420mg/body day1 Trastuzumab 6mg/kg day1 DTX 75mg/m ² day1 1クール=3週間

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			DTX を6サイクルまで投与し、7サイクル以降が主治医の判断で継続 副作用 下痢、脱毛、爪の異常、倦怠感、嘔気・嘔吐、しびれ、発疹、骨髄抑制 インフュージョンリアクション、うつ血性心不全
乳癌 (C50)	AADC-0203	Everolimus	Everolimus 1日1回10mgを経口投与 (ホルモン療法併用) 副作用: 口内炎、発疹、疲労、食欲減退、下痢、味覚異常、悪心 感染症、体重減少、貧血、鼻出血、高血糖、血小板減少 掻痒症
乳癌 (C50)	AADC-0207	P/T+Eribulin	Pertuzumab 初回840mg/body 2回目以降420mg/body day1 Trastuzumab 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg day1 Eribulin 1.4mg/m ² day1, day8 3週ごと 副作用: インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、脱毛、倦怠感 骨髄抑制、悪心、爪の異常、ニューロパチー、発疹、間質性肺炎 流涙増加、肝機能障害、アナフィラキシー、浮腫、疼痛
乳癌 (C50)	AADC-0209	T-DM1(手術不能または再発乳癌)	T-DM1 3.6mg/kg day1 3週ごと 副作用: 倦怠感、鼻出血、悪心、発熱、食欲減退、骨髄抑制、肝機能障害 間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション 末梢神経障害
乳癌 (C50)	AADC-0217	EC療法	EPI 100mg/m ² day1 CPA 600mg/m ² day1 3週毎 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎 出血性膀胱炎、下痢、口内炎、アナフィラキシー、排尿障害 イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、
乳癌 (C50)	AADC-0221	AC療法	ADM 60mg/m ² day1 CPA 600mg/m ² day1 3週毎 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎 口内炎、心電図異常、出血性膀胱炎、下痢、肝機能障害 イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、急性腎不全 アナフィラキシー、排尿障害
乳癌 (C50)	AADC-0226	Leuproterin Pro	Leuproterin Pro22.5mg 24週毎皮下注射 副作用: 注射部位硬結、注射部位紅斑、注射部位疼痛、糖尿病、ほてり 間質性肺炎、アナフィラキシー、肝機能障害、血栓塞栓症
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0234	TC+tri weekly Trastuzumab	DTX 75mg/m ² day1 CPA 600mg/m ² day1 トラスツズマブ 初回8mg/kg 2回目以降 6mg/kg day1 3週毎 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害
乳癌 (C50)	AADC-0238	Palbociclib + Letrozole	バルボシクリブ 1日1回125mg 3週連続投与1週休薬 レトロゾール 1日1回2.5mg 連続投与 4週毎 副作用: ほてり、頭痛、関節痛、悪心、発疹、掻痒感、肝機能障害 塞栓症、血栓症

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			骨髄抑制、脱毛、疲労、感染症、口内炎、下痢、間質性肺炎
乳癌 (C50)	AADC-0239	Palbociclib + fulvestrant	<p>バルボシクリブ 1日1回125mg 3週連続投与1週休薬</p> <p>フルベストラント 1回2筒(1筒250mg) 左右の臀部に1筒ずつ筋肉内投与</p> <p>day1, day15 その後はサイクル1の1日目から換算して18日(±7日)毎</p> <p>副作用: 注射部位疼痛、注射部位硬結、ほてり、注射部位掻痒感 肝機能障害、血栓塞栓症、悪心、便秘、卵巣腫大、頭痛 感覚異常、不眠症、背部痛、筋肉痛、高TG血症、高コレステロール血症 骨髄抑制、脱毛、疲労、感染症、口内炎、下痢、間質性肺炎</p>
乳癌 (C50)	AADC-0244	Abemaciclib	<p>アベマシクリブ 1回150mgを1日2回経口投与 (フルベストラントorレトゾールorアナストゾールと併用)</p> <p>副作用: 肝機能障害、骨髄抑制、下痢、間質性肺炎 静脈血栓塞栓症、感染症、悪心、嘔吐 疲労、脱毛症 血清クレアチニン上昇</p>
乳癌 (C50)	AADC-0248	Olaparib	<p>オラパリブ 1回300mgを1日2回経口投与</p> <p>副作用: 悪心、嘔吐、味覚異常 貧血、好中球減少、血小板減少、リンパ球減少 疲労、無力症、間質性肺炎 下痢、頭痛</p>
乳癌 (C50)	AADC-0249	nab-PTX+trasutuzumab	<p>nab-PTX 1回 260mg/m² 3週毎</p> <p>トラスツズマブ[*] 初回8mg/kg day1 2回目以降 6mg/kg day1</p> <p>3週毎</p> <p>副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制 脱毛、筋痛、末梢神経障害、下痢</p>
乳癌 (C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行	AADC-0255	nab-PTX+Atezolizumab	<p>Atezolizumab 840mg/回 点滴静注 day1, day15</p> <p>nab-PTX 100mg/m² 点滴静注 day1, day8, day15</p> <p>その後13日間休薬 28日で1コース</p> <p>副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制 脱毛、筋痛、末梢神経障害、下痢 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膝炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害</p>
乳癌 (C50)	AADC-0258	DD-EC	<p>EPI 90mg/m² day1</p> <p>CPA 600mg/m² day1</p> <p>ヘグフィルグラスチム 3.6mg day2</p> <p>2週毎</p> <p>副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎 出血性膀胱炎、下痢、口内炎、アナフィラキシー、排尿障害 イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、</p>
乳癌 (C50)	AADC-0263	DD-PTX	<p>PTX 175mg/m² day1</p> <p>ヘグフィルグラスチム 3.6mg day2</p> <p>2週毎</p> <p>副作用: 脱毛、疲労、筋痛、末梢神経障害、骨髄抑制、下痢、悪心嘔吐</p>
乳癌 (C50)	AADC-0264	Trastuzumab Deruxtec	<p>Trastuzumab Deruxtec 5.4mg/kg day1</p>

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
進行再発乳癌			3週ごと 副作用: 間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション 骨髄抑制、脱毛、疲労、悪心・嘔吐、下痢、便秘、口内炎
乳癌 (C50)	AADC-0269	T-DM1(術後)	T-DM1 3.6mg/kg day1 3週ごと (投与回数は14回まで) 副作用: 倦怠感、鼻出血、悪心、発熱、食欲減退、骨髄抑制、肝機能障害 間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション 末梢神経障害
乳癌 (C50)	AADC-0286	CBDCA+GEM	GEM 1000mg/m ² day1.8 CBDCA AUC2 day1.8 3週毎 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、発熱、皮疹
乳癌 (C50)	AADC-0287	Pembrolizumab+CBDCA+GEM	Pembrolizumab 200mg/body day1 GEM 1000mg/m ² day1.8 CBDCA AUC2 day1.8 3週毎 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、発熱、皮疹 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害
乳癌 (C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行	AADC-0288	Pembrolizumab+CBDCA+GEM	Pembrolizumab 200mg/body day1 GEM 1000mg/m ² day1.8 day22.29 CBDCA AUC2 day1.8 day22.29 6週毎 副作用: AADC-0287と同様
乳癌 (C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行	AADC-0289	Pembrolizumab+nab-PTX	Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎 nab-PTX 100mg/m ² 点滴静注 day1,8,15 4週毎 副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制 脱毛、筋痛、末梢神経障害、下痢 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害
乳癌 (C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行	AADC-0290	Pembrolizumab+nab-PTX	Pembrolizumab 200mg/body day1 6週毎 nab-PTX 100mg/m ² 点滴静注 day1,8,15 4週毎 副作用: AADC-0289と同様
乳癌 (C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行	AADC-0291	Pembrolizumab+PTX 3週	Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎 PTX 90mg/m ² 点滴静注 day1,8,15 4週毎 副作用: 脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛、関節痛 悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害
乳癌 (C50)	AADC-0292	Pembrolizumab+PTX 6週	Pembrolizumab 200mg/body day1 6週毎

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行			PTX 90mg/m ² 点滴静注 day1,8,15 4週毎 副作用: AADC-0291と同様
乳癌 (C50) トリプルネガティブ進行乳癌 術前	AADC-0311	Pembrolizumab+CBDC+PTX	Pembrolizumab 200mg/body day1 CBDC 目標AUC=5/l day1 PTX 80mg/m ² day1,8,15 3週毎 術前4コース 副作用: 脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹 食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー 間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 肺炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
乳癌 (C50) トリプルネガティブ進行乳癌 術前	AADC-0312	Pembrolizumab+EC	Pembrolizumab 200mg/body day1 EPI 90mg/m ² day1 CPA 600mg/m ² day1 3週毎 術前4コース 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎 出血性膀胱炎、下痢、口内炎、アナフィラキシー、排尿障害 イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 肺炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
乳癌 (C50) トリプルネガティブ進行乳癌 術後 9回まで	AADC-0313	Pembrolizumab 200mg 3週毎	ペムブロリズマブ 1回200mg day1 3週毎 術後9コースまで 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 肺炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
乳癌 (C50) トリプルネガティブ進行乳癌 術後 5回まで	AADC-0314	Pembrolizumab 400mg 6週毎	ペムブロリズマブ 1回400mg day1 6週毎 術後5コースまで 副作用: AADC-0313と同様
乳癌 (C50) HER2陽性乳癌	AADC-0326	PT+PTX	用法・用量 1クール目 Pertuzumab 840mg/body day1 Trastuzumab 8mg/kg day1 PTX 80mg/m ² day1, 8, 15 2クール目以降 Pertuzumab 420mg/body day1 Trastuzumab 6mg/kg day1 PTX 80mg/m ² day1, 8, 15 1クール=3週間 副作用 下痢、脱毛、倦怠感、しびれ、骨髄抑制 インフュージョンリアクション、うっ血性心不全
乳癌 (C50) HER2陽性乳癌	AADC-0339	P/T+nab-PTX	用法・用量 1クール目 Pertuzumab 840mg/body day1

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			Trastuzumab 8mg/kg day1 nab-PTX 260mg/m ² day1 2クール目以降 Pertuzumab 420mg/body day1 Trastuzumab 6mg/kg day1 nab-PTX 260mg/m ² day1 1クール=3週間
			副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制 脱毛、筋痛、末梢神経障害、下痢 インフュージョンリアクション、うつ血性心不全
乳癌 (C50) HER2陽性乳癌	AADC-0340	PHESGO+DTX	バルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として 初回 (IN) それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1 2回目以降 (MA) それぞれ 600mg、600mg、20000U day1 初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与 DTX 75mg/m ² day1 3週ごと 副作用: インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感 間質性肺炎、悪心、口内炎 脱毛、筋痛、末梢神経障害、爪の異常
乳癌 (C50) HER2陽性乳癌	AADC-0341	PHESGO+Eribulin	バルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として 初回 (IN) それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1 2回目以降 (MA) それぞれ 600mg、600mg、20000U day1 初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与 Eribulin 1.4mg/m ² day1、8 3週ごと 副作用: インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感 間質性肺炎、悪心、口内炎、末梢神経障害
乳癌 (C50) HER2陽性乳癌	AADC-0342	PHESGO+PTX	バルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として 初回 (IN) それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1 2回目以降 (MA) それぞれ 600mg、600mg、20000U day1 初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与 PTX 80mg/m ² day1、8、15 3週ごと 副作用: インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感 間質性肺炎、悪心、口内炎 脱毛、筋痛、末梢神経障害
乳癌 (C50) HER2陽性乳癌	AADC-0343	PHESGO+nab-PTX	バルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として 初回 (IN) それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1 2回目以降 (MA) それぞれ 600mg、600mg、20000U day1 初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与 nab-PTX 260mg/m ² day1 3週ごと 副作用: インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感 間質性肺炎、悪心、口内炎 脱毛、筋痛、末梢神経障害
乳癌 (C50) HER2陽性乳癌 術前・術後の場合は投与期間は12ヶ月まで	AADC-0344	PHESGO	バルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として 初回 (IN) それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1 2回目以降 (MA) それぞれ 600mg、600mg、20000U day1 初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			3週ごと 副作用: インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感 間質性肺炎、悪心、口内炎
乳癌 (C50)	AADC-0351	Capivasertib	カピバセルチブ 1回400mgを1日2回 経口投与 4日間服用3日間休薬 副作用: 高血糖、下痢、皮膚障害 悪心・嘔吐、口内炎、発疹、疲労 味覚不全、腎機能障害
乳癌 (C50) BRCA遺伝子変異陽性かつHER2陰性乳癌	AADC-0358	Talazoparib	タラゾパリブ 1回1mgを1日1回 経口投与 副作用: 骨髄抑制、間質性肺疾患、血栓塞栓症、二次性悪性腫瘍 口内炎、倦怠感、悪心、脱毛 下痢、頭痛
乳癌 (C50) 化学療法歴のあるホルモン受容体陰性かつHER2陰性乳癌	AADC-0363	Sacituzumab Govitecan	サシツズマブ ゴビテカ 10mg/kg day1, 8 3週ごと 副作用: 骨髄抑制、下痢・腸炎、悪心・嘔吐、インフュージョンリアクション 間質性肺疾患、肝機能障害、脱毛、倦怠感
乳癌 (C50) 化学療法歴のあるホルモン受容体陽性かつHER2陰性乳癌	AADC-0365	Datopotamab Deruxtec	Datopotamab Deruxtec 6mg/kg day1 3週ごと 副作用: 間質性肺疾患、角膜障害、口内炎、過敏症、インフュージョンリアクション 骨髄抑制、脱毛、疲労、悪心・嘔吐、下痢、便秘
子宮頸癌 (C53)	AADC-0082	NDP+CPT-11療法	CPT-11 60mg/m ² day1, 8 ネダプラチン 100mg/m ² day1 3週毎 副作用: 下痢、悪心・嘔吐、骨髄抑制、腎機能障害、肝機能障害
子宮体癌 (C54)	AADC-0019	PTX + CBDCA療法(TC)	PTX 180mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=5 day1 3~4週ごと 副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振 悪心・嘔吐、肝機能障害
子宮体癌 (C54)	AADC-0080	DTX+CBDC療法(DC)	DTX 60~75mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=5 day1 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害
子宮体癌 (C54)	AADC-0081	CPA+ADM+CDDP療法(CAP)	CPA 500mg/m ² day1 DXR 50mg/m ² day1 CDDP 50mg/m ² day1 4週ごと 副作用: 脱毛、骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、口内炎、全身倦怠感
卵巣癌 (C56)	AADC-0019	PTX + CBDCA療法(TC)	PTX 180mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=5 day1 3~4週ごと 副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振 悪心・嘔吐、肝機能障害
卵巣癌 (C56)	AADC-0080	DTX+CBDC療法(DC)	DTX 60~75mg/m ² day1

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			CBDCA 目標AUC=5 day1 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害
卵巣癌 (C56)	AADC-0081	CPA+ADM+CDDP療法(CAP)	CPA 500mg/m ² day1 DXR 50mg/m ² day1 CDDP 50mg/m ² day1 4週ごと 副作用: 脱毛、骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、口内炎、全身倦怠感
卵巣癌 (C56)	AADC-0133	DOXIL	DXR 50mg/m ² を1mg/分で静注 day1 4週ごと 副作用: 骨髄抑制、アナフィラキシー用症状、手足症候群、口内炎、肝機能障害 悪心、食欲不振、発疹、疲労、体重減少、心筋障害
卵巣癌 (C56)	AADC-0375	TC(術後補助化学療法)	PTX 175mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 (MAX 800mg/body) 3週毎 最大6コース 副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振 悪心・嘔吐、肝機能障害
卵巣杯細胞性悪性腫瘍 (C56)	AADC-0075	EP療法	VP-16 100mg/m ² day1~5 CDDP 20mg/m ² day1~5 1クール:3週 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、
卵巣杯細胞性悪性腫瘍 (C56)	AADC-0083	BEP療法	BLM 30mg/body day2,9,16 VP-16 100mg/m ² day1~5 CDDP 20mg/m ² day1~5 1クール:3週 副作用: 間質性肺炎、肺繊維症、皮膚の硬化、色素沈着、発熱・悪寒、脱毛、食欲不振 体重減少、全身倦怠感、悪心・嘔吐、骨髄抑制、
前立腺癌 (C61)	AADC-0038	tri-weekly DTX	DTX 60~75mg/m ² day1 3週毎 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害
前立腺癌 (C61)	AADC-0064	Prostal	クロルマジン 1回50mg1日2回 副作用: インボテンツ、浮腫、体重増加、女性化乳房
前立腺癌 (C61)	AADC-0065	Casodex	ピカルタミド 1回80mg1日1回 副作用: 乳房腫脹、乳房圧痛、肝機能障害、勃起力低下
前立腺癌 (C61)	AADC-0066	Odyne	フルタミド 1回125mg 1日3回 副作用: 肝機能障害、女性型乳房、悪心・嘔吐
前立腺癌 (C61)	AADC-0067	Estracyt	エストラムスチン 1回280mg 1日2回 副作用: 女性化乳房、食欲不振、浮腫、貧血、肝機能異常
前立腺癌 (C61)	AADC-0068	Leuplin	リュープロレリン 4週に1回3.75mgを皮下投与 副作用: 肝機能障害、ほてり、熱感
前立腺癌 (C61)	AADC-0070	Zoladex LA	

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			ゴセレリン 10.8mgを前腹部に12～13週毎に1回投与 副作用： 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下
前立腺癌 (C61)	AADC-0103	多剤ホルモン療法無効前立腺癌 Prosexol	エチニルエストラジオール 1回0.5～1.0mg 1日3回 副作用： 血栓症、心不全、狭心症、発疹、肝機能障害、血圧上昇、電解質異常
前立腺癌 (C61)	AADC-0124	Casodex + ZoladexLA 療法	ビカルタミド [†] 1回80mg1日1回 ゴセレリン 10.8mgを前腹部に12～13週毎に1回投与 副作用： 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下 乳房腫脹、乳房疼痛、肝機能障害
前立腺癌 (C61)	AADC-0125	Casodex + Leuplin 療法	ビカルタミド [†] 1回80mg1日1回 リュープロレリン 4週ごとに3.75mgまたは12週ごとに11.25mgを皮下投与 副作用： 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下 ほてり、熱感
前立腺癌 (C61)	AADC-0127	Odyne + ZoladexLA 療法	フルタミド [†] 1回125mg 1日3回 ゴセレリン 10.8mgを前腹部に12～13週毎に1回投与 副作用： 肝機能障害、女性型乳房、悪心・嘔吐 代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下
前立腺癌 (C61)	AADC-0187	Degarelix	デガレリクス 初回240mgを1箇所あたり120mgずつ腹部2箇所に皮下投与 2回目以降80mgを腹部1箇所に皮下投与 4週毎 副作用： 注射部位疼痛、注射部位硬結、注射部位紅斑、ほてり、体重増加 発熱、高血圧、注射部位熱感、間質性肺炎、肝機能障害、糖尿病憎悪 心不全、血栓塞栓症、アナフィラキシー
前立腺癌 (C61)	AADC-0128	Odyne + Leuplin 療法	フルタミド [†] 1回125mg 1日3回 リュープロレリン 4週ごとに3.75mgまたは12週ごとに11.25mgを皮下投与 副作用： 肝機能障害、女性型乳房、悪心・嘔吐、ほてり、熱感
前立腺癌 (C61) 去勢抵抗性前立腺癌	AADC-0205	Enzalutamide	エンザルタミド 1回160mg 1日1回 経口投与 連日 副作用： 疲労、悪心、食欲減退、無力症、痙攣発作、下痢、
前立腺癌 (C61) 去勢抵抗性前立腺癌	AADC-0208	Abiraterone	Abiraterone 1回1000mg 1日1回 経口投与 連日 プレドニン 1回5mg 1日2回 経口投与 連日 副作用： 肝機能障害、心障害、疲労、ほてり、悪心・嘔吐、低カリウム血症 高血圧、消化器症状、高脂血症
前立腺癌 (C61) 去勢抵抗性前立腺癌	AADC-0224	Cabazitaxel	Cabazitaxel 20～25mg/m ² day1 Pegfilgrastin 3.6mg day2 3週毎 副作用： 好中球減少症、骨髄抑制、疲労、悪心、下痢、食欲減退 貧血、腎不全、消化管出血、アナフィラキシーショック 心不全、末梢神経障害、DIC、皮膚粘膜眼症候群、心タンポナーデ 心筋梗塞、静脈血栓塞栓症、間質性肺炎、口内炎、SIADH
前立腺癌 (C61)	AADC-0226	Leuproterin Pro	Leuproterin Pro22.5mg 24週毎皮下注射 副作用： 注射部位硬結、注射部位紅斑、注射部位疼痛、糖尿病、ほてり 間質性肺炎、アナフィラキシー、肝機能障害、血栓塞栓症

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
前立腺癌 (C61)	AADC-0250	Degarelix(12週毎)	デガレリクス 初回240mgを1箇所あたり120mgずつ腹部2箇所に皮下投与 2回目以降は初回投与4週間後より480mgを維持用量として 腹部2箇所に皮下投与し、12週間間隔で投与を繰り返す。 副作用: 注射部位疼痛、注射部位硬結、注射部位紅斑、ほてり、体重増加 発熱、高血圧、注射部位熱感、間質性肺炎、肝機能障害、糖尿病憎悪 心不全、血栓塞栓症、アナフィラキシー
前立腺癌 (C61)	AADC-0251	Apalutamide	アパルタミド 1回240mg 1日1回 経口投与 連日 副作用: 疲労、皮疹、甲状腺機能低下症、掻痒症、体重減少 痙攣発作、心房細動、心筋梗塞、悪心、下痢
前立腺癌 (C61) 遠隔転移を有しない去勢抵抗性前立腺癌	AADC-0266	Darolutamide	ダロルタミド 1回600mg(300mgを2錠) 1日2回 食後経口投与 連日 副作用: 心臓障害、間質性肺疾患、疲労、皮疹、頭痛、めまい 悪心、下痢、ほてり、高血圧、女性化乳房
前立腺癌 (C61) BRCA遺伝子変異陽性の遠隔転移を有する去勢抵抗性前立腺癌	AADC-0248	Olaparib	オラパリブ 1回300mgを1日2回経口投与 副作用: 悪心、嘔吐、味覚異常 貧血、好中球減少、血小板減少、リンパ球減少 疲労、無力症、間質性肺炎 下痢、頭痛
前立腺癌 (C61) CDK12陽性の前立腺癌	AADC-0367	Cisplatin (CDK12陽性)	CDDP 75mg/m ² day2 3週毎 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、腎機能障害
精巣腫瘍 (C63)	AADC-0074	BEP療法	BLM 30mg/body day1.8.15 VP-16 100mg/m ² day1~5 CDDP 20mg/m ² day1~5 1クール:3週 副作用: 間質性肺炎、肺繊維症、皮膚の硬化、色素沈着、発熱・悪寒、脱毛、食欲不振 体重減少、全身倦怠感、悪心・嘔吐、骨髄抑制、
精巣腫瘍 (C63)	AADC-0075	EP療法	VP-16 100mg/m ² day1~5 CDDP 20mg/m ² day1~5 1クール:3週 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、
精巣腫瘍 (C63) セミノーマ	AADC-0171	CBDCA	CBDCA AUC=7 単回投与 副作用: 嘔気・嘔吐、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、発熱、骨髄抑制、肝機能障害
腎癌 (C64)	AADC-0076	Sumiféron	IFN-α 1日1回300万~600万IU 連日または週1~3回 副作用: 発熱、全身倦怠感、食欲不振、骨髄抑制、肝機能障害
腎癌 (C64)	AADC-0077	Imunace	テセロイキン 1日1回70万単位 連日 副作用: 発熱、悪寒、倦怠感、食欲不振、悪心・嘔吐、好酸球増多、肝機能障害、浮腫
腎癌 (C64)	AADC-0112	Sutent	スニチニブ 1日1回50mg 4週間連続投与2週間休薬 副作用: 骨髄抑制、皮膚変色、手足症候群、食欲不振、肝機能異常、疲労感 味覚異常、口内炎、下痢、悪心、歯肉炎、代謝異常、浮腫、発熱、高血圧
腎癌 (C64) 根治切除不能または転移性の腎細胞癌	AADC-0160	Sorafenib	用法・用量 1回400mg 1日2回 経口投与 適宜増減

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			副作用: 手足症候群、剥脱性皮膚炎、発疹、脱毛、下痢、高血圧、疲労 食欲不振、そう痒感、体重減少、肝機能障害、出血 間質性肺炎、急性肺障害、高血圧クレーゼ、可逆性後白室脳症 皮膚粘膜眼症候群、消化管穿孔、心筋虚血・心筋梗塞
腎癌 (C64) 根治切除不能または転移性の腎細胞癌	<i>AADC-0169</i>	<i>Everolimus</i>	Everolimus 10mg/day 連日経口投与 副作用: 口内炎、発疹、貧血、疲労、下痢、無力症、食欲減退、高コレステロール血症 悪心、粘膜の炎症、嘔吐、末梢性浮腫、高トリグリセリド血症、咳嗽、搔痒症 感染症、皮膚乾燥、鼻出血、呼吸困難、味覚異常、間質性肺炎、腎不全 高血糖、アナフィラキシー様症状、急性呼吸窮迫症候群、肺塞栓症、心嚢液貯留 進行性多巣性白質脳症、BKウイルス腎症、血栓性微小血管障害、肺胞蛋白症
腎癌 (C64)	<i>AADC-0178</i>	<i>Temsirolimus</i>	テムシロリムス 25mgを1週間に1回点滴 副作用: 発疹、口内炎、食欲不振、肝機能障害、高血糖、間質性肺疾患 infusion reaction、脂質代謝異常、創傷治癒遅延、腎不全 消化管穿孔、心嚢液貯留、胸水、痙攣、脳出血、感染症 皮膚粘膜眼症候群、横紋筋融解症、骨髄抑制
腎癌 (C64) 進行再発腎癌	<i>AADC-0183</i>	<i>Axitinib</i>	アキシチニブ 1回5mg1日2回経口投与 患者の状態により増減可、増量は1回10mgまで 副作用: 高血圧、甲状腺機能障害、創傷治癒遅延、蛋白尿、手足症候群 肝機能障害、下痢、疲労、悪心嘔吐、発声障害、無力症、体重減少 粘膜炎症、口内炎、味覚異常、鼻出血、
腎癌 (C64)	<i>AADC-0199</i>	<i>Pazopanib</i>	パゾパニブ 1日1回800mg 経口投与 副作用: 下痢、疲労、悪心、高血圧、毛髪変色、食欲減退、体重減少、味覚異常 肝機能障害、心機能障害、動脈血栓性事象、静脈血栓性事象、出血 甲状腺機能障害、ネフローゼ症候群、蛋白尿、感染症、創傷治癒遅延
腎癌 (C64)	<i>AADC-0225</i>	<i>Nivolumab</i>	ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
腎癌 (C64)	<i>AADC-0252</i>	<i>Nivolumab+Ipilimumab</i>	Nivolumab 240mg/body Ipilimumab 1mg/kg 3週毎4コースまで 5コースから Nivolumab 240mg/body 2週毎継続 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核
腎癌 (C64)	<i>AADC-0272</i>	<i>4週毎 Nivolumab</i>	ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
腎癌 (C64)	<i>AADC-0268</i>	<i>Pembrolizumab(6週間)</i>	ペムブロリズマブ 1回400mg 6週間隔 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 肺炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
腎癌 (C64)	AADC-0278	Cabozantinib	カボザンチニブ 1回60mg 1日1回空腹時 副作用: 高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労 口内炎、蛋白尿、手足症候群、横紋筋融解症 動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔 可逆性後白質脳症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延 低カルシウム血症
腎う癌 (C65)	AADC-0121	GC療法	GEM 1000mg/m ² day1.8.15 CDDP 70mg/m ² day2 1クール: 4週 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱
腎う癌 (C65)	AADC-0268	Pembrolizumab(6週間)	ペムブロリズマブ 1回400mg 6週間隔 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 肺炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
腎う癌 (C65) 根治切除不能尿路上皮癌における化学療法後の維持療法	AADC-0283	Avelumab	Avelumab 10mg/kg day1 2週毎 副作用: 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー
腎う癌 (C65) がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌	AADC-0294	Enfortumab Vedotin	Enfortumab Vedotin 1.25mg/kg day1.8.15 4週毎 副作用: 皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパシー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患 肝機能障害、Infusion reaction
腎う癌 (C65) 筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
腎う癌 (C65) 筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
腎う癌 (C65) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌	AADC-0336	GEM+PTX	GEM 1000mg/m ² day1.8.15 PTX 200mg/m ² day1 4週毎 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 関節痛、筋肉痛、末梢神経障害
腎う癌 (C65) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌	AADC-0337	GEM+CBDCA	GEM 1000mg/m ² day1.8 CBDCA 目標AUC=5 day1 3週毎 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、発熱

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
腎う癌 (C65) 根治切除不能な尿路上皮癌の一次治療	AADC-0360	Pembrolizumab+Enfortumab Vedotin	Pembrolizumab 200mg/body day1
			Enfortumab Vedotin 1.25mg/kg day1.8 3週毎
			副作用: 皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患 肝機能障害、Infusion reaction 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、静脈血栓塞栓症
腎う癌 (C65) 根治切除不能な尿路上皮癌	AADC-0377	Nivolumab+GC	Nivolumab 360mg/body day1
			CDDP 70mg/m ² day1
			GEM 1000mg/m ² day1,day8
			3週毎 最大6コース
			Nivolumab 480mg/body day1 4週毎 最長2年間
			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貧食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎
尿管癌 (C66)	AADC-0121	GC療法	GEM 1000mg/m ² day1.8.15
			CDDP 70mg/m ² day2 1クール:4週
			副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱
尿管癌 (C66)	AADC-0268	Pembrolizumab(6週間)	ペムブロリズマブ 1回400mg 6週間隔
			副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 肺炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
尿管癌 (C66) 根治切除不能尿路上皮癌における化学療法後の維持療法	AADC-0283	Avelumab	Avelumab 10mg/kg day1
			2週毎 副作用: 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー
尿管癌 (C66) がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌	AADC-0294	Enfortumab Vedotin	Enfortumab Vedotin 1.25mg/kg day1.8.15
			4週毎 副作用: 皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患 肝機能障害、Infusion reaction
尿管癌 (C66) 筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ 240mg/body 2週間隔
			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
尿管癌 (C66) 筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ 480mg/body 4週間隔
			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
尿管癌 (C66) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌	AADC-0336	GEM+PTX	GEM 1000mg/m ² day1.8.15
			PTX 200mg/m ² day1
			4週毎
			副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 関節痛、筋肉痛、末梢神経障害
尿管癌 (C66) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌	AADC-0337	GEM+CBDCA	GEM 1000mg/m ² day1.8
			CBDCA 目標AUC=5 day1
			3週毎
			副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、発熱
尿管癌 (C66) 根治切除不能な尿路上皮癌の一次治療	AADC-0360	Pembrolizumab+Enfortumab Vedotin	Pembrolizumab 200mg/body day1
			Enfortumab Vedotin 1.25mg/kg day1.8
			3週毎
			副作用: 皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパシー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患 肝機能障害、Infusion reaction 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、静脈血栓塞栓症
尿管癌 (C66) 根治切除不能な尿路上皮癌	AADC-0377	Nivolumab+GC	Nivolumab 360mg/body day1
			CDDP 70mg/m ² day1
			GEM 1000mg/m ² day1,day8
			3週毎 最大6コース
			Nivolumab 480mg/body day1
			4週毎 最長2年間
膀胱癌 (C67)	AADC-0012	Furtulon	5'-DFUR 800-1200mgを3-4回に分けて服用
			副作用: 食欲不振、下痢、白血球減少
膀胱癌 (C67)	AADC-0071	Epirubicin 膀胱内注入	EPI 40mgを週1回膀胱内へ注入 10回
膀胱癌 (C67)	AADC-0072	Immunobladder 膀胱内注入	副作用: 悪心・嘔吐、白血球減少、食欲不振、脱毛
膀胱癌 (C67)	AADC-0121	GC療法	BCG 40mgまたは80mgを週1回膀胱内へ注入 10回
			副作用: BCG感染、排尿痛、頻尿、肉眼的血尿、肝機能障害、発熱、
			GEM 1000mg/m ² day1.8.15
膀胱癌 (C67)	AADC-0268	Pembrolizumab(6週間)	CDDP 70mg/m ² day2
			1クール:4週
			副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱
			副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱
膀胱癌 (C67)	AADC-0268	Pembrolizumab(6週間)	ペムブロリズマブ 1回400mg 6週間隔
			副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 肺炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
膀胱癌 (C67) 根治切除不能尿路上皮癌における化学療法後の維持療法	AADC-0283	Avelumab	Avelumab	10mg/kg	day1
			2週毎	副作用: 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー	
膀胱癌 (C67) がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌	AADC-0294	Enfortumab Vedotin	Enfortumab Vedotin	1.25mg/kg	day1.8.15
			4週毎	副作用: 皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患 肝機能障害、Infusion reaction	
膀胱癌 (C67) 筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ	240mg/body	2週間隔
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
膀胱癌 (C67) 筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ	480mg/body	4週間隔
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
膀胱癌 (C67) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌	AADC-0336	GEM+PTX	GEM	1000mg/m ²	day1.8.15
			PTX	200mg/m ²	day1
			4週毎	副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 関節痛、筋肉痛、末梢神経障害	
膀胱癌 (C67) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌	AADC-0337	GEM+CBDC	GEM	1000mg/m ²	day1.8
			CBDC	目標AUC=5	day1
			3週毎	副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、発熱	
膀胱癌 (C67) 根治切除不能な尿路上皮癌の一次治療	AADC-0360	Pembrolizumab+Enfortumab Vedotin	Pembrolizumab	200mg/body	day1
			Enfortumab Vedotin	1.25mg/kg	day1.8
			3週毎	副作用: 皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患 肝機能障害、Infusion reaction 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、静脈血栓塞栓症	
膀胱癌 (C67) 根治切除不能な尿路上皮癌	AADC-0377	Nivolumab+GC	Nivolumab	360mg/body	day1
			CDDP	70mg/m ²	day1
			GEM	1000mg/m ²	day1,day8
			3週毎 最大6コース	Nivolumab 480mg/body day1	
			4週毎 最長2年間	副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎	
膀胱癌 (C67)	AADC-0385	Durvalumab+GEM+CDDP (CCr>60ml/min)	Durvalumab	1500mg/body day1	BW≤30kgは20mg/kg

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等			
術前・術後補助療法			CDDP 70mg/m ² day1			
			GEM 1000mg/m ² day1,day8			
			術前 3週毎 最大4コース			
			Durvalumab 1500mg/body day1 BW ≤30kgは20mg/kg			
			術後 4週毎 最大8コース			
			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核			
			悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎			
膀胱癌 (C67)	AADC-0386	Durvalumab+GEM+CDDP (CCr=40-60ml/min)	Durvalumab 1500mg/body day1 BW ≤30kgは20mg/kg			
術前・術後補助療法			CDDP 35mg/m ² day1,day8			
			GEM 1000mg/m ² day1,day8			
			術前 3週毎 最大4コース			
			Durvalumab 1500mg/body day1 BW ≤30kgは20mg/kg			
			術後 4週毎 最大8コース			
			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核			
			悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎			
悪性膠芽腫、乏突起神経膠腫 (G71)	AADC-0078	IFN β +MCNU+IMRT(IMR療法)	IFN β またはフェロン 300万単位 5投2休(5週間)、1回/週(6週目以降)			
			サイメリン 1mg/kg 2ヶ月に1回			
			放射線照射			
			副作用: 発熱、骨髄抑制、蛋白尿、食欲不振、悪心嘔吐			
			悪性神経膠腫 (G71)	AADC-0104	Temodal	テモダール 経口又は点滴静注
						初発)放射線照射との併用
						テモゾロミドとして1回75mg/m ² 1日1回連日42日間投与し4週間休薬
						その後に本剤単独にて、テモゾロミドとして1回150mg/m ² を1日1回連日5日間投与し、23日間休薬。28日間1クール
再発)						
テモゾロミドとして1回150mg/m ² 1日1回連日5日間投与し23日間休薬						
28日間1クール						
副作用: 放射線照射との併用 脱毛、悪心・嘔吐、疲労 併用後の単独投与時 疲労、脱毛、悪心・嘔吐、食欲不振、頭痛、便秘						
悪性神経膠腫 (G71)	AADC-0197	BV+RT/TMZ 療法	ベバシズマブ 1回10mg/kgを2週間間隔で計4回点滴静注			
			テモダール 1回75mg/m ² 1日1回連日経口投与			
			放射線照射 2Gy/日 週5日 総線量60Gy			
			その後			
			ベバシズマブ 1回10mg/kgを2週間間隔点滴静注			
			テモダール 1回150mg~200mg/m ² 1日1回連日5日間経口投与し23日間休薬			
			28日間1クール			
			その後			
ベバシズマブ 1回15mg/kgを3週間間隔点滴静注 PDになるまで						
副作用: 脳出血、粘膜皮膚出血、動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、創傷治癒遅延 骨髄抑制、感染症、高血圧、蛋白尿、可逆性後白質脳症候群、消化管穿孔 うつ血性心不全、疲労、脱毛、悪心・嘔吐、食欲不振、頭痛、便秘						

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
悪性神経膠腫 (C71)	AADC-0198	<i>Gliadel</i>	ギリアデル 腫瘍切除腔の大きさや形状に応じて、8枚または適宜減じた枚数を 脳腫瘍切除術時の切除面を被覆するように留置 副作用： 脳浮腫、発熱、リンパ球数減少、片麻痺、悪心、嘔吐、食欲減退 頭痛、肝機能異常、痙攣、創傷治癒不良、血栓塞栓症
悪性リンパ腫 (C72)	AADC-0116	髄注MTX+PSL療法	MTX 15mg PSL 20mg 髄液中悪性リンパ腫細胞が陰性化するまで2回/週 繰り返し施行 副作用： 骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、口内炎、下痢、腎機能障害、
悪性リンパ腫 (C72)	AADC-0118	<i>high dose MTX</i>	MTX 3.5g/m ² 24時間点滴 LV 15mg/body 静注 LVはMTX終了12時間後から6時間毎に投与 副作用： 骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、口内炎、下痢、腎機能障害、 肝機能障害、食欲不振
悪性リンパ腫 (C72)	AADC-0267	<i>Tirabrutinib</i>	チラブルチニブ 1回480mg (80mgを6錠) 1日1回 空腹時経口投与 連日 副作用： 感染症、皮膚障害、骨髄抑制、過敏症、間質性肺疾患 肝機能障害、出血、下痢、悪心嘔吐 高カリウム血症、高トリグリセリド血症
甲状腺癌 (C73)	AADC-0160	<i>Sorafenib</i>	用法・用量 1回400mg 1日2回 経口投与 適宜増減 副作用： 手足症候群、剥脱性皮膚炎、発疹、脱毛、下痢、高血圧、疲労 食欲不振、そう痒感、体重減少、肝機能障害、出血 間質性肺炎、急性肺障害、高血圧クライゼ、可逆性後白室脳症 皮膚粘膜眼症候群、消化管穿孔、心筋虚血・心筋梗塞
甲状腺癌 (C73)	AADC-0222	<i>Lenvatinib</i>	用法・用量 1回24mg 1日1回 副作用： 高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労 口内炎、蛋白尿、手掌・足底発赤知覚不全症候群、出 動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔 可逆性後白質脳症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延 低カルシウム血症
甲状腺癌 (C73) BRAF遺伝子変異陽性	AADC-0357	<i>Encorafenib+Binimetinib</i>	Encorafenib 1回450mg 1日1回経口投与 Binimetinib 1回45mg 1日2回経口投与 副作用： 手足症候群、眼障害、心機能障害、肝障害、横紋筋融解症 高血圧、出血、腫瘍崩壊症候群
甲状腺癌 (C73) RET遺伝子変異陽性	AADC-0384	<i>Selpercatinib</i>	Selpercatinib 1回160mg 1日2回経口投与 副作用： 肝機能障害、QT間隔延長、過敏症、高血圧 間質性肺疾患、骨端離開および骨成長の異常、出血 口内乾燥、下痢、疲労、便秘、悪心、口内炎、腹痛 浮腫、発熱、食欲減退、頭痛、発疹 骨髄抑制、血中クレアチニン増加
悪性リンパ腫 (C77) 非ホジキンリンパ腫	AADC-0048	CHOP療法	CPA 750mg/m ² day1 DXR 50mg/m ² day1

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			VCR 1.4mg/m ² day1 PSL 100mg/body day1~5 1クール:3週 副作用: 骨髄抑制、心毒性、末梢神経障害、肝障害、悪心・嘔吐、脱毛、出血性膀胱炎
悪性リンパ腫(C77) 非ホジキンリンパ腫	AADC-0049	R-CHOP療法	リツキシマブ [*] 375mg/m ² (CHOP療法の前日) CPA 750mg/m ² day1 DXR 50mg/m ² day1 VCR 1.4mg/m ² day1 PSL 100mg/body day1~5 1クール:3週 副作用: 全身浮腫、呼吸障害、発熱、悪寒、頭痛、血圧上昇、発疹、骨髄抑制、悪心・嘔吐、出血性膀胱炎、心毒性、末梢神経障害、肝障害、脱毛、下肢深部反射減弱・消失、
悪性リンパ腫(C77) 非ホジキンリンパ腫	AADC-0236	High dose MTX + High dose Ara-C	MTX 200mg/m ² day1 MTX 800mg/m ² 持続 day1 ソル・メルコト 50mg/body day1~3 キロサ仆 6000mg/m ² /日 day2~3 1クール:3週 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、口内炎、下痢、腎機能障害、肝機能障害、食欲不振、間質性肺炎、急性呼吸促進症候群、中枢神経障害、代謝異常
原発不明癌(C80)	AADC-0015	GEM	GEM 1000 mg/m ² を週1回 3回投与 1週休薬 1000 mg/m ² を2週間に1回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感
原発不明癌(C80)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症、大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害、腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
原発不明癌(C80)	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症、大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害、腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
リンパ性白血病(C91) 再発又は難治性の慢性リンパ性白血病	AADC-0319	Acalabrutinib	用法・用量 1回100mg 1日2回 経口投与 副作用: 下痢、悪心・嘔吐、頭痛、骨髄抑制、感染症、出血、不整脈、虚血性心疾患、間質性肺疾患、腫瘍崩壊症候群、二次性悪性腫瘍
骨髄異形成症候群(D46)	AADC-0301	Azacitidine 皮下注	アザシチジン 75mg/m ² day1-7 皮下注 21日間休薬 副作用: 骨髄抑制、感染症、出血、腎尿管アシドーシス、低血圧、食欲不振、便秘、悪心、口内炎、下痢、発疹、掻痒、倦怠感、発熱、注射部位反応、注射部位紅斑
骨髄異形成症候群(D46)	AADC-0302	Azacitidine 点滴静注	アザシチジン 75mg/m ² day1-7 10分かけて点滴静注 21日間休薬 副作用: 骨髄抑制、感染症、出血、腎尿管アシドーシス、低血圧、食欲不振、便秘、悪心、口内炎、下痢

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			発疹、掻痒、倦怠感、発熱
固形癌 (MSI-High)	AADC-0235	Pembrolizumab	ペムブロリズマブ 1回200mg 3週間隔 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 睪炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
固形癌 (MSI-High)	AADC-0268	Pembrolizumab(6週間)	ペムブロリズマブ 1回400mg 6週間隔 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 睪炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
固形癌 (NTRK融合遺伝子陽性)	AADC-0346	Larotrectinib	ラトロレクチニブ 1回 100mg、1日2回、連日経口投与 副作用: 浮動性めまい、頭痛、末梢性感覚ニューロパチー 肝機能障害、骨髄抑制 疲労、筋肉痛、関節痛
固形癌 (RET融合遺伝子陽性)	AADC-0384	Selpercatinib	Selpercatinib 1回160mg 1日2回経口投与 副作用: 肝機能障害、QT間隔延長、過敏症、高血圧 間質性肺疾患、骨端離開および骨成長の異常、出血 口内乾燥、下痢、疲労、便秘、悪心、口内炎、腹痛 浮腫、発熱、食欲減退、頭痛、発疹 骨髄抑制、血中クレアチニン増加
小細胞癌 (臓器横断的)	AADC-0023	CBDCA+ETP療法(CE)	VP-16 80mg/m ² day1~3 CBDCA 目標AUC=5/body day1 3~4週ごと 副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振
フォン・ヒッペル・リンドウ病関連腫瘍	AADC-0376	Belzutifan	ベルズチファン 1回 120mg、1日1回、連日経口投与 副作用: 貧血、低酸素症 出血、骨折