

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|------------------|-----------|--------------------|---|
| 頭頸部癌 (C00) | AADC-0001 | S-1(CG) | 用法 |
| | | | a.4週投与 2週休薬法 |
| | | | b.2週投与 1週休薬法 (副作用の軽減を目的) |
| | | | 用量 |
| | | | 朝食後および夕食後の1日2回 |
| | | | 体表面積 1.25㎡未満 40mg/回 |
| | | | 1.25から1.5㎡未満 50mg/回 |
| | | | 1.5㎡以上 60mg/回 |
| | | | 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹、流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、 |
| 頭頸部癌 (C00) | AADC-0091 | tri-weekly DTX | DTX 60mg/㎡ day1 |
| | | | 3週ごと |
| | | | 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害 |
| 頭頸部癌 (C00) | AADC-0008 | DCF 療法 | CDDP 80 mg/㎡ day1 |
| | | | TXT 70mg/㎡ day1 |
| | | | 5Fu 800 mg/㎡ day1からday5 |
| | | | 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛、食欲不振、全身倦怠感、発熱、 |
| 頭頸部癌 (C00) | AADC-0182 | Cetuximab + FP | セツキシマブ 初回400 mg/㎡、2回目以降250 mg/㎡ 毎週点滴静注 |
| | | | CDDP 100 mg/㎡ day1 3週に1回 |
| | | | 5Fu 1000 mg/㎡/day day1～day4 3週に1回 |
| | | | 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛、掻痒感、infusion reaction、食欲不振、疲労感、心不全、血栓塞栓症 |
| 頭頸部癌 (C00) | AADC-0225 | Nivolumab | ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 |
| | | | 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症、大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害、腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション |
| 頭頸部癌 (C00) | AADC-0272 | 4週毎 Nivolumab | ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 |
| | | | 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症、大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害、腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション |
| 頭頸部癌 (C00) | AADC-0235 | Pembrolizumab | ペムブロリズマブ 1回200mg 3週間隔 |
| | | | 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐、口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害、肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害、膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎 |
| | | | |
| | | | |
| 頭頸部癌 (C00) | AADC-0268 | Pembrolizumab(6週間) | ペムブロリズマブ 1回400mg 6週間隔 |
| | | | 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐、口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害、肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害、膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎 |
| | | | |
| | | | |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|---|-----------|-------------------|---|
| 食道癌 (C15) | AADC-0007 | CDDP+5-FU 療法(FP) | CDDP 10 mg/body day1からday5 |
| | | | 5Fu 500 mg/m ² day1からday5 |
| | | | 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛 |
| 食道癌 (C15) | AADC-0008 | DCF 療法 | CDDP 80 mg/m ² day1 |
| | | | TXT 70mg/m ² day1 |
| | | | 5Fu 800 mg/m ² day1からday5 |
| | | | 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛、食欲不振、全身倦怠感、発熱、 |
| 食道癌 (C15) | AADC-0105 | FP+IMRT療法 | 5-FU 500 mg/body day1からday5 |
| | | | CDDP 5 mg/body day1からday5 |
| | | | トモセラピー 2Gy/body day1からday5 |
| | | | day6,7は休薬 6週連続 (到達目標60Gy) |
| | | | 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛 |
| 食道癌 (C15) | AADC-0164 | DTX | DTX 70mg/m ² day1 |
| | | | 3週ごと |
| | | | 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害 |
| 食道癌 (C15) | AADC-0184 | IMRT+FP | CDDP 70 mg/m ² day1 |
| | | | 5Fu 700 mg/m ² day1からday5 |
| | | | IMRT 50Gy 25分割 |
| | | | 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛、食道炎、心嚢水貯留、胸水貯留、肺臓炎 |
| | | | 化学療法は4週毎に繰り返す |
| 食道癌 (C15) | AADC-0185 | FP | CDDP 80 mg/m ² day1 |
| | | | 5Fu 800 mg/m ² day1からday5 |
| | | | 4週毎 |
| | | | 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛 |
| 食道癌 (C15) | AADC-0227 | PTX(6投2休) | PTX 100 mg/m ² day1.8.15.22.29.36 少なくとも2週休薬 |
| | | | 副作用: 脱毛、発疹、爪の障害、感覚減退、味覚異常、浮動性めまい、疲労、浮腫、発熱、悪心、嘔吐、下痢、便秘、食欲不振、口内炎、筋痛、関節痛、骨髄抑制、末梢神経障害、間質性肺炎 |
| | | | |
| 食道癌 (C15) | AADC-0233 | Nedaplatin + 5-FU | Nedaplatin 90 mg/m ² day1 |
| | | | 5Fu 800 mg/m ² /day day1からday5 |
| | | | 4週毎 |
| | | | 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、腎機能障害、口内炎、脱毛、肝機能異常、色素沈着、ショック、アナフィラキシー、電解質異常、間質性肺炎 |
| 食道癌 (C15) | AADC-0014 | mFOLFOX6療法 | L-OHP 85mg/m ² day1 |
| | | | 5-FU (bolus) 400mg/m ² day1 |
| | | | 5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46~48hr |
| | | | l-LV 200mg/m ² day1 |
| | | | 2週ごと |
| 副作用: 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢、発熱 | | | |
| 食道癌 (C15) | AADC-0225 | Nivolumab | ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 (術後補助の場合投与は1年間) |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|---|-----------|-------------------------|--|
| がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発 術前治療でpCRでなかったStage II/IIIの術後補助 | | | 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション |
| 食道癌 (C15) がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発 術前治療でpCRでなかったStage II/IIIの術後補助 | AADC-0272 | 4週毎 Nivolumab | ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 (術後補助の場合投与は1年間) 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション |
| 食道癌 (C15) | AADC-0298 | Pembrolizumab+5-FU+CDDP | ペムブロリズマブ 1回200mg day1 CDDP 80 mg/m ² day1 5FU 800 mg/m ² day1からday5 3週毎 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎 インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感 肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 下垂体機能障害、1型糖尿病 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎 |
| 食道癌 (C15) 切除可能、局所進行食道扁平上皮癌(cT1N1-3M0,cT2-3N0-3M0) 年齢20歳以上75歳以下mECOG PS 0-1 | AADC-0300 | DCF療法(術前) | CDDP 70 mg/m ² day1 DTX 70mg/m ² day1 5Fu 750 mg/m ² day1からday5 3週毎に3回施行 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、発熱、 |
| 食道癌 (C15) | AADC-0309 | Nivolumab+ipilimumab | Nivolumab 240mg/body 2週間隔 Ipilimumab 1mg/kg 6週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 |
| 食道癌 (C15) | AADC-0310 | Nivolumab+FP | ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 CDDP 80 mg/m ² day1 5Fu 800 mg/m ² day1からday5 4週毎 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎 インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感 肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 下垂体機能障害、1型糖尿病 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎 |
| 食道癌 (C15) 根治切除不能な進行・再発 | AADC-0373 | Tislelizumab+FP | Tislelizumab 200mg/body day1 CDDP 80 mg/m ² day1 5FU 800 mg/m ² day1からday5 3週毎 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎 インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感 肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|--------------------------------------|-----------|----------------------|--|
| | | | 下垂体機能障害、1型糖尿病 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎 |
| 食道癌(C15) がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発 | AADC-0374 | Tislelizumab | Tislelizumab 200mg/body 3週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション |
| 胃癌(C16) | AADC-0001 | S-1(CG) | 用法 a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的) 用量 朝食後および夕食後の1日2回 体表面積 1.25㎡未満 40mg/回 1.25から1.5㎡未満 50mg/回 1.5㎡以上 60mg/回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、 |
| 胃癌(C16) | AADC-0002 | S-1+CDDP療法 | TS-1 3週投与2週休薬 TS-1開始8日目にCDDP60 mg/㎡ 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、 |
| 胃癌(C16) | AADC-0003 | PTX | a. 70 mg/㎡を1週に1回 3回投与 1週休薬 b. 80 mg/㎡を2週に1回 もしくは 3週に1回 副作用: 脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害 筋肉痛、関節痛、悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常 |
| 胃癌(C16) | AADC-0006 | CPT-11+ CDDP療法(IP) | CDDP 80 mg/㎡ day1 CPT-11 70 mg/㎡ day1,15 4週毎 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、全身倦怠感 末梢神経障害、脱毛 |
| 胃癌(C16) | AADC-0014 | mFOLFOX6療法 | L-OHP 85mg/㎡ day1 5-FU (bolus) 400mg/㎡ day1 5-FU (infusion) 2400mg/㎡ 46~48hr l-LV 200mg/㎡ day1 2週ごと 副作用: 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢 発熱 |
| 胃癌(C16) | AADC-0085 | CPT-11 | CPT-11 150 mg/㎡ 2週に1回 副作用: 下痢、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、骨髄抑制、肝機能障害 |
| 胃癌(C16) | AADC-0101 | 外来 CPT-11+CDDP療法(IP) | CDDP 30 mg/㎡ day1,15 CPT-11 60 mg/㎡ day1,15 4週毎 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、全身倦怠感 末梢神経障害、脱毛 |
| 胃癌(C16) | AADC-0122 | S-1+DTX療法 | TS-1 2週投与1週休薬 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|------------------------------|-----------|-------------------------------|--|
| | | | 朝食後および夕食後の1日2回 80 mg/m ² /day |
| | | | DTX 40 mg/m ² day1 |
| | | | 3週毎 |
| | | | 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、色素沈着、神経障害、脱毛 浮腫、悪心・嘔吐、流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、 |
| 胃癌 (C16) | AADC-0134 | XELOX 療法 | カペシタビン 1日2回 14日間内服7日間休薬 体表面積 1.36m ² 未満 1200mg/回 1.36以上1.66m ² 未満 1500mg/回 1.66以上1.96m ² 未満 1800mg/回 1.96m ² 以上 2100mg/回 |
| | | | L-OHP 130mg/m ² day1 3週ごと |
| | | | 副作用: 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着 |
| 胃癌 (C16) | AADC-0150 | tri-weekly Abraxane | アブラキサシ 1回 260mg/m ² 3週毎 |
| | | | 副作用: 脱毛、疲労、筋痛、末梢神経障害、骨髄抑制、下痢、悪心嘔吐 |
| 胃癌 (C16) | AADC-0153 | tri weekly Trastuzumab + XP療法 | トラスツズマブ [®] 8mg/kg day1 (2回目からは6mg/kg) CDDP 80 mg/m ² day1 カペシタビン 1日2回1回1000mg/m ² day1夕からday15朝まで内服その後7日間休薬 3週毎 |
| | | | 副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制、下痢、口内炎、色素沈着 手足症候群、血中ビリルビン増加、腎機能障害、脱毛、末梢神経障害 |
| 胃癌 (C16) | AADC-0154 | DCS療法 | TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 80 mg/m ² /day day1夕からday15朝まで内服その後14日間休薬 |
| | | | DTX 35 mg/m ² day1, day15 |
| | | | CDDP 35 mg/m ² day1, day15 |
| | | | 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、色素沈着、神経障害、脱毛 浮腫、悪心・嘔吐、腎機能障害、下痢 |
| 胃癌 (C16) | AADC-0179 | DTX | DTX 75mg/m ² day1 |
| | | | 3週ごと |
| | | | 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害、間質性肺炎 |
| 胃癌 (C16) | AADC-0213 | SOX | L-OHP 130mg/m ² day1 3週ごと |
| | | | TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1~day14 3週ごと |
| | | | 体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回 1.25から1.5m ² 未満 50mg/回 1.5m ² 以上 60mg/回 |
| | | | 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック |
| 胃癌 (C16) 一次治療が無効の治癒切除不能胃癌 | AADC-0219 | RAM療法 | RAM 8mg/kg day1 2週ごと |
| | | | 副作用: 腹痛、高血圧、下痢、 動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害 インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血 骨髄抑制、低カリウム血症、低ナトリウム血症 |
| 胃癌 (C16) 一次治療が無効の治癒切除不能胃癌 | AADC-0220 | PTX+RAM療法 | RAM 8mg/kg day1 2週ごと PTX 70mg/m ² day1, 8 2週ごと |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|----------------------------|-----------|----------------------|---|
| | | | 副作用: 腹痛、高血圧、下痢、疲労、無力症、末梢性浮腫 口内炎、肝機能障害、呼吸困難、蛋白尿、発疹、皮膚乾燥 動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害 インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血 骨髄抑制、低アルブミン血症、低ナトリウム血症、ざ瘡様皮膚炎 眼瞼浮腫、顔面浮腫、鼻出血 |
| 胃癌 (C16) | AADC-0225 | Nivolumab | ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション |
| 胃癌 (C16) | AADC-0253 | Weekly nab-PTX | nab-PTX 100mg/m ² 週1回投与 3週連続投与1週休薬 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感 脱毛、末梢神経障害、発疹、下痢 |
| 胃癌 (C16) | AADC-0206 | Trifluridine | トリフルリジン 1回35mg/m ² を1日2回 5日間連続経口投与した後2日間休薬し、これを2回繰り返した後 14日間休む 1コース28日間 副作用: 骨髄抑制、悪心、食欲減退、疲労、下痢、嘔吐、口内炎、感染症、間質性肺炎 |
| 胃癌 (C16) | AADC-0272 | 4週毎 Nivolumab | ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション |
| 胃癌 (C16) HER2陽性切除不能進行再発 | AADC-0273 | Trastuzumab Deruxtec | Trastuzumab Deruxtec 6.4mg/kg day1 3週ごと 副作用: 間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション 骨髄抑制、脱毛、疲労、悪心・嘔吐、下痢、便秘、口内炎 |
| 胃癌 (C16) | AADC-0295 | Nivolumab+CAPOX | ニボルマブ 360mg/body day1 3週ごと カペシタビン 1日2回 14日間内服7日間休薬 体表面積 1.36m ² 未満 1200mg/回 1.36以上1.66m ² 未満 1500mg/回 1.66以上1.96m ² 未満 1800mg/回 1.96m ² 以上 2100mg/回 L-OHP 130mg/m ² day1 3週ごと 副作用: 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着 発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション |
| 胃癌 (C16) | AADC-0296 | Nivolumab+SOX | ニボルマブ 360mg/body day1 3週ごと L-OHP 130mg/m ² day1 3週ごと TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14 3週ごと 体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回 1.25から1.5m ² 未満 50mg/回 1.5m ² 以上 60mg/回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック 発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|----------------------------------|-----------|---------------------------------|--|
| | | | 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション |
| 胃癌 (C16) | AADC-0297 | Nivolumab+mFOLFOX6 | ニボルマブ 240mg/body day1 L-OHP 85mg/m ² day1 5-FU (bolus) 400mg/m ² day1 5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46~48hr I-LV 200mg/m ² day1 2週ごと 副作用: 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢 発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション |
| 胃癌 (C16) | AADC-0353 | Pembrolizumab+CAPOX | ペムブロリズマブ 200mg/body day1 3週ごと カペシタビン 1日2回 14日間内服7日間休薬 体表面積 1.36m ² 未満 1200mg/回 1.36以上1.66m ² 未満 1500mg/回 1.66以上1.96m ² 未満 1800mg/回 1.96m ² 以上 2100mg/回 L-OHP 130mg/m ² day1 3週ごと 副作用: 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着 発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション |
| 胃癌 (C16) | AADC-0354 | Zolbetuximab+CAPOX | ゾルベツキシマブ 初回 800mg/m ² (2回目以降は600mg/ 3週ごと カペシタビン 1日2回 14日間内服7日間休薬 体表面積 1.36m ² 未満 1200mg/回 1.36以上1.66m ² 未満 1500mg/回 1.66以上1.96m ² 未満 1800mg/回 1.96m ² 以上 2100mg/回 L-OHP 130mg/m ² day1 3週ごと 副作用: 重度の悪心・嘔吐、過敏症、インフュージョンリアクション 手足症候群、骨髄抑制、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着 |
| 胃癌 (C16) | AADC-0355 | Zolbetuximab+mFOLFOX6 | ゾルベツキシマブ 初回 800mg/m ² (2回目以降は600mg/ 3週ごと L-OHP 85mg/m ² day1 5-FU (bolus) 400mg/m ² day1 5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46~48hr I-LV 200mg/m ² day1 2週ごと 副作用: 重度の悪心・嘔吐、過敏症、インフュージョンリアクション 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、倦怠感、下痢 発熱、高血圧 |
| 胃癌 (C16) HER2陽性かつCPS≥1の進行再発胃癌 | AADC-0370 | Pembrolizumab+Trastuzumab+CAPOX | ペムブロリズマブ 200mg/body day1 トラスツズマブ 8mg/kg day1 (2回目からは6mg/kg) カペシタビン 1日2回 14日間内服7日間休薬 体表面積 1.36m ² 未満 1200mg/回 1.36以上1.66m ² 未満 1500mg/回 1.66以上1.96m ² 未満 1800mg/回 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|----------------------------------|-----------|------------------------------|--|
| | | | 1.96㎡以上 2100mg/回 L-OHP 130mg/㎡ day1 3週ごと 副作用: 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着 発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション |
| 胃癌 (C16) HER2陽性かつCPS≥1の進行再発胃癌 | AADC-0371 | Pembrolizumab+Trastuzumab+FP | ペムプロリズマブ 1回200mg day1 トラスツズマブ 8mg/kg (2回目からは6mg/kg) day1 CDDP 80 mg/㎡ day1 5FU 800 mg/㎡ day1からday5 3週毎 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎 インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感 肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 下垂体機能障害、1型糖尿病 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎 |
| GIST(C16~C17) | AADC-0009 | Glivec | イマチニブ 1日1回400mgを食後に投与 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、浮腫、発疹、倦怠感、電解質異常 肝機能障害、血中アルブミン減少 |
| GIST(C16~C17) | AADC-0112 | Sutent | スニチニブ 1日1回50mg 4週間連続投与2週間休薬 副作用: 骨髄抑制、皮膚変色、手足症候群、食欲不振、肝機能異常、疲労感 味覚異常、口内炎、下痢、悪心、歯肉炎、代謝異常、浮腫、発熱、高血圧 |
| GIST(C16~C17) | AADC-0316 | Pimipespib | ピミテスピブ 1日1回 160mg 空腹時 5日間連続経口投与後2日間休薬 副作用: 下痢、食欲不振、倦怠感、悪心、血清クレアチニン上昇 腎機能低下、夜盲症、貧血 |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0001 | S-1(CG) | 用法 a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法 (副作用の軽減を目的) 用量 朝食後および夕食後の1日2回 体表面積 1.25㎡未満 40mg/回 1.25から1.5㎡未満 50mg/回 1.5㎡以上 60mg/回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0010 | UFT(UFTE) | 用法・用量 1日量としてテガフル300-600mgを1日2-3回に分割投与 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害 |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0011 | UFT(UFT-E)/LV療法 | UFT-E 300mg/㎡/日 1日3回に分けて LV 75mg/日 1日3回に分けて 食間に服用 4週投与 1週休薬 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 | | | |
|------------------|--|------------------------------|-----------------|--|---------|----------|
| 大腸癌 (C18) | AADC-0014 | mFOLFOX6療法 | L-OHP | 85mg/m ² | day1 | |
| | | | 5-FU (bolus) | 400mg/m ² | day1 | |
| | | | 5-FU (infusion) | 2400mg/m ² | 46～48hr | |
| | | | l-LV | 200mg/m ² | day1 | |
| | | | | | 2週ごと | |
| | | | 副作用: | 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢発熱 | | |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0084 | FOLFIRI療法 | 5-FU (bolus) | 400mg/m ² | day1 | |
| | | | 5-FU (infusion) | 2400mg/m ² | 46～48hr | |
| | | | l-LV | 200mg/m ² | day1 | |
| | | | CPT-11 | 150mg/m ² | day1 | |
| | | | | | 2週ごと | |
| | | | 副作用: | 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛 | | |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0092 | Bevacizumab based mFOLFOX6療法 | ベバシズマブ | 1回5mg/kgまたは10mg/kg | day1 | |
| | | | L-OHP | 85mg/m ² | day1 | |
| | | | 5-FU (bolus) | 400mg/m ² | day1 | |
| | | | 5-FU (infusion) | 2400mg/m ² | 46～48hr | |
| | | | l-LV | 200mg/m ² | day1 | |
| | | | | | 2週ごと | |
| 副作用: | 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢発熱、消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症 高血圧性クレーゼ | | | | | |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0093 | Bevacizumab based FOLFIRI療法 | ベバシズマブ | 1回5mg/kgまたは10mg/kg | day1 | |
| | | | 5-FU (bolus) | 400mg/m ² | day1 | |
| | | | 5-FU (infusion) | 2400mg/m ² | 46～48hr | |
| | | | l-LV | 200mg/m ² | day1 | |
| | | | CPT-11 | 150mg/m ² | day1 | |
| | | | | | 2週ごと | |
| 副作用: | 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛、発熱 消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症 高血圧性クレーゼ | | | | | |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0099 | 5-FU/LV療法 | 5-FU (bolus) | 400mg/m ² | day1 | |
| | | | 5-FU (infusion) | 2400mg/m ² | 46～48hr | |
| | | | l-LV | 200mg/m ² | day1 | |
| | | | | | 2週ごと | |
| | | | 副作用: | 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、口内炎、手足症候群、脱毛 全身倦怠感、肝機能障害、下痢 | | |
| | | | 大腸癌 (C18) | AADC-0102 | Xeloda | カペシタビン |
| | 体表面積 | 1.33m ² 未満 | | | | 1500mg/回 |
| | | 1.33から1.57m ² 未満 | | | | 1800mg/回 |
| | | 1.57から1.81m ² 未満 | | | | 2100mg/回 |
| | | 1.81m ² 以上 | | | | 2400mg/回 |
| 副作用: | 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎 | | | | | |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0107 | Bevacizumab based 5-FU/LV療法 | ベバシズマブ | 1回5mg/kgまたは10mg/kg | day1 | |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|------------------|-----------|----------------------------|---|
| | | | 5-FU (bolus) 400mg/m ² day1 |
| | | | 5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46~48hr |
| | | | 1-LV 200mg/m ² day1 |
| | | | 2週ごと |
| | | | 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、口内炎、手足症候群、脱毛 全身倦怠感、肝機能障害、下痢、高血圧性クレーゼ 消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症 |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0108 | UFT/LV+IMRT療法 | UFT 300mg/m ² /日 1日3回に分けて LV 75mg/日 1日3回に分けて 食間に服用 トモセラピー実施日 day1~5 トモセラピー 2Gy/day (day1~5まで行い、day6,7は中止) 4週連続投与 (到達目標40Gy) 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害 |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0109 | Cetuximab + FOLFIRI 療法 | セツキシマブ 初回 400mg/m ² (2回目以降は250mg/m ²) day1 週1回 CPT-11 150mg/m ² (75歳以上は120mg/m ²) day1 2週ごと 1-LV 200mg/m ² day1 2週ごと 5-FU (bolus) 400mg/m ² day1 2週ごと 5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46~48hr 2週ごと 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛、発熱 ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0110 | Cetuximab + CPT-11 療法 | セツキシマブ 初回 400mg/m ² (2回目以降は250mg/m ²) day1 週1回 CPT-11 150mg/m ² (75歳以上は120mg/m ²) day1 2週ごと 副作用: ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、食欲不振、下痢、悪心・嘔吐 脱毛、疲労感、骨髄抑制 |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0115 | Cetuximab | セツキシマブ 初回 400mg/m ² (2回目以降は250mg/m ²) day1 週1回 副作用: ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、下痢 |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0134 | XELOX 療法 | カペシタビン 1日2回 14日間内服7日間休薬 体表面積 1.36m ² 未満 1200mg/回 1.36以上1.66m ² 未満 1500mg/回 1.66以上1.96m ² 未満 1800mg/回 1.96m ² 以上 2100mg/回 L-OHP 130mg/m ² day1 3週ごと 副作用: 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着 |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0135 | Bevacizumab based XELOX 療法 | ベバシズマブ 7.5mg/kg day1 3週ごと カペシタビン 1日2回 14日間内服7日間休薬 体表面積 1.36m ² 未満 1200mg/回 1.36以上1.66m ² 未満 1500mg/回 1.66以上1.96m ² 未満 1800mg/回 1.96m ² 以上 2100mg/回 L-OHP 130mg/m ² day1 3週ごと 副作用: 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着 消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|------------------------------|-----------|-----------------------------|--|
| 大腸癌 (C18) | AADC-0136 | IRIS(大腸) | 高血圧性クリーゼ CPT-11 125 mg/m ² 2週ごと TS-1 80~120mg/body 2週投与2週休薬 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹、脱毛 |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0140 | Bevacizumab based XELODA 療法 | ベバシズマブ 7.5mg/kg day1 3週ごと カペシタビン 1日2回 14日間内服7日間休薬 体表面積 1.36m ² 未満 1200mg/回 1.36以上1.66m ² 未満 1500mg/回 1.66以上1.96m ² 未満 1800mg/回 1.96m ² 以上 2100mg/回 副作用: 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着 消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症 高血圧性クリーゼ |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0146 | Panitumumab | パニツムマブ 6mg/kg 点滴静注 2週毎 副作用: infusion reaction、ざ瘡、皮膚乾燥、発疹、掻痒、爪周炎、低マグネシウム血症 疲労、口内炎、食欲不振、下痢、間質性肺疾患 |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0147 | Panitumumab based FORFIRI療法 | パニツムマブ 6mg/kg 点滴静注 5-FU (bolus) 400mg/m ² day1 5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46~48hr l-LV 200mg/m ² day1 CPT-11 150mg/m ² (76才以上は120mg/m ²) day1 2週毎 副作用: infusion reaction、ざ瘡、皮膚乾燥、発疹、掻痒、爪周炎、低マグネシウム血症 疲労、口内炎、食欲不振、下痢、間質性肺疾患、悪心・嘔吐、骨髄抑制 肝機能障害、脱毛 |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0148 | Panitumumab based FOLFOX療法 | パニツムマブ 6mg/kg 点滴静注 L-OHP 85mg/m ² day1 5-FU (bolus) 400mg/m ² day1 5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46~48hr l-LV 200mg/m ² day1 2週毎 副作用: infusion reaction、ざ瘡、皮膚乾燥、発疹、掻痒、爪周炎、低マグネシウム血症 疲労、口内炎、食欲不振、下痢、間質性肺疾患、発熱 末梢神経障害、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐、倦怠感、 |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0168 | Cetuximab based mFOLFOX6 療法 | セツキシマブ 初回 400mg/m ² (2回目以降は250mg/m ²) day1 週1回 L-OHP 85mg/m ² day1 2週ごと 5-FU (bolus) 400mg/m ² day1 2週ごと 5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46~48hr 2週ごと l-LV 200mg/m ² day1 2週ごと 副作用: ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪周炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、食欲不振、下痢、悪心・嘔吐、発熱 脱毛、疲労感、骨髄抑制、末梢神経障害、注射部位反応、 |
| 大腸癌 (C18) 治癒切除不能な進行・再発大腸癌 | AADC-0191 | Regorafenib | レゴラフェニブ 1日1回160mgを3週間連日経口投与、その後1週間休薬 これを繰り返す 副作用: 手足症候群、TEN、Stevens-Johnson症候群、多形紅斑 肝機能障害、出血、血栓塞栓症、高血圧、高血圧クリーゼ、可逆性後白質脳症 消化管穿孔、下痢、食欲不振、口内炎、悪心・嘔吐、頻脈、発声障害、骨髄抑制 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|------------------------------|-----------|---------------------|---|
| | | | 脱毛、掻痒、多汗症 |
| 大腸癌 (C18) 治癒切除不能な進行・再発大腸癌 | AADC-0192 | BV/SOX | <p>ベバシズマブ 5mg/kg day1 3週ごと</p> <p>L-OHP 130mg/m² day1 3週ごと</p> <p>TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14 3週ごと</p> <p>体表面積 1.25m²未満 40mg/回</p> <p>1.25から1.5m²未満 50mg/回</p> <p>1.5m²以上 60mg/回</p> <p>副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹、末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック、消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ、可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、間質性肺炎、肝機能障害、脱毛、</p> |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0206 | Trifluridine | <p>トリフルリジン 1回35mg/m²を1日2回</p> <p>5日間連続経口投与した後2日間休薬し、これを2回繰り返した後</p> <p>14日間休む</p> <p>1コース28日間</p> <p>副作用: 骨髄抑制、悪心、食欲減退、疲労、下痢、嘔吐、口内炎、感染症、間質性肺炎</p> |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0213 | SOX | <p>L-OHP 130mg/m² day1 3週ごと</p> <p>TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14 3週ごと</p> <p>体表面積 1.25m²未満 40mg/回</p> <p>1.25から1.5m²未満 50mg/回</p> <p>1.5m²以上 60mg/回</p> <p>副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹、末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック</p> |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0214 | Panitumumab+5-FU/LV | <p>パニツムマブ 6mg/kg day1</p> <p>5-FU (bolus) 400mg/m² day1</p> <p>5-FU (infusion) 2400mg/m² 46～48hr</p> <p>l-LV 200mg/m² day1</p> <p>2週毎</p> <p>副作用: Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、低マグネシウム血症、口内炎、ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎、骨髄抑制、感染症、肝機能障害、手足症候群</p> |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0215 | Cetuximab+5-FU/LV | <p>セツキシマブ 初回 400mg/m² (2回目以降は250mg/m²) day1 週1回</p> <p>5-FU (bolus) 400mg/m² day1 2週ごと</p> <p>5-FU (infusion) 2400mg/m² 46～48hr 2週ごと</p> <p>l-LV 200mg/m² day1 2週ごと</p> <p>副作用: Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、心不全、血栓塞栓症、口内炎、ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎、骨髄抑制、感染症、肝機能障害、手足症候群、低マグネシウム血症、末梢神経障害</p> |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0216 | Panitumumab+CPT-11 | <p>パニツムマブ 6mg/kg 点滴静注</p> <p>CPT-11 150mg/m² (76才以上は120mg/m²) day1</p> <p>2週毎</p> <p>副作用: Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、低マグネシウム血症、口内炎、ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎、骨髄抑制、腸管穿孔、消化管出血、腸閉塞、末梢神経障害、脱毛、腎機能障害、血栓塞栓症</p> |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|--|-----------|-------------------------|--|
| 大腸癌 (C18) | AADC-0223 | bevacizumab+XELIRI | ベバシズマブ 7.5mg/kg day1 |
| | | | CPT-11 200mg/m ² day1 |
| | | | XELODA 1600mg/m ² /日 day1~14 |
| | | | 3週毎 |
| | | | 副作用: infusion reaction、消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、高血圧性脳症 可逆性後白質脳症症候群、ネフローゼ症候群、骨髄抑制、感染症 うっ血性心不全、間質性肺炎、神経障害、食欲減退、悪心、口内炎 脱毛、下痢、手足症候群、腎障害、色素沈着 |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0228 | Bevacizumab + FOLFOXIRI | ベバシズマブ 5mg/kg day1 |
| | | | 5-FU (infusion) 3200mg/m ² 46hr |
| | | | I-LV 200mg/m ² day1 |
| | | | L-OHP 85mg/m ² day1 |
| | | | CPT-11 165mg/m ² day1 |
| | | | 2週毎 副作用: 骨髄抑制、下痢、悪心、嘔吐、口内炎、無力症、末梢神経障害 高血圧、静脈血栓塞栓症、アナフィラキシー反応、間質性肺炎 腸管穿孔、創傷治癒遅延、白質脳症 |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0229 | Capecitabine + IMRT | カペシタビン 1日2回 週5日 |
| | | | 体表面積 1.31m ² 未満 900mg/回 |
| | | | 1.31以上1.64m ² 未満 1200mg/回 |
| | | | 1.64以上 1500mg/回 |
| | | | トモセラピー 2Gy/day day1-5実施、day6-7中止 最大50Gy (2Gy×25回 5週間) |
| | | | 副作用: 骨髄抑制、手足症候群、下痢、悪心・嘔吐、口内炎、腹痛 疲労、無力症、脱毛、皮膚の発赤、掻痒感 |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0230 | RAM + FOLFIRI | ラムシルマブ 8mg/kg day1 |
| | | | 5-FU (bolus) 400mg/m ² day1 |
| | | | 5-FU (infusion) 2400mg/m ² day1~3 |
| | | | I-LV 200mg/m ² day1 |
| | | | CPT-11 150mg/m ² day1 |
| | | | 2週毎 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛 口内炎、鼻出血、高血圧、動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症 消化管穿孔 |
| 大腸癌 (C18) 治癒切除不能な進行・再発大腸癌 | AADC-0259 | bevacizumab+S-1(3週毎) | ベバシズマブ 7.5mg/kg day1 3週ごと |
| | | | TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1~day14 3週ごと |
| | | | 体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回 |
| | | | 1.25から1.5m ² 未満 50mg/回 |
| | | | 1.5m ² 以上 60mg/回 |
| 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 消化管穿孔、肝機能障害 創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ 可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、間質性肺炎 | | | |
| 大腸癌 (C18) 治癒切除不能な進行・再発大腸癌 | AADC-0260 | bevacizumab+S-1(4週毎) | ベバシズマブ 5mg/kg day1, 15 |
| | | | TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1~day14 |
| | | | 体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回 |
| | | | 1.25から1.5m ² 未満 50mg/回 |
| | | | 1.5m ² 以上 60mg/回 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|---|-----------|-----------------------------------|--|
| | | | 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 消化管穿孔、肝機能障害 創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ 可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、間質性肺炎 |
| 大腸癌 (C18) 治癒切除不能な進行・再発大腸癌 | AADC-0261 | bevacizumab+IRIS | ベバシズマブ 5mg/kg day1, 15 CPT-11 150mg/m ² day1, 15 TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1~day14 体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回 1.25から1.5m ² 未満 50mg/回 1.5m ² 以上 60mg/回 |
| | | | 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック、消化管穿孔 創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ 可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、間質性肺炎 肝機能障害、脱毛 |
| 大腸癌 (C18) MSI-high | AADC-0252 | Nivolumab+Ipilimumab | Nivolumab 240mg/body Ipilimumab 1mg/kg 3週毎4コースまで 5コースから Nivolumab 240mg/body 2週毎 又は 480mg/body 4週毎 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 |
| 大腸癌 (C18) BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 | AADC-0284 | Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab | Cetuximab 初回 400mg/m ² (2回目以降は250mg/m ²)を週1回 Encorafenib 1回300mg 1日1回経口投与 Binimetinib 1回45mg 1日2回経口投与 副作用: ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、下痢、悪心嘔吐、疲労 手足症候群、眼障害、心機能障害、肝障害、横紋筋融解症 |
| 大腸癌 (C18) BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 | AADC-0285 | Encorafenib+Cetuximab | Cetuximab 初回 400mg/m ² (2回目以降は250mg/m ²)を週1回 Encorafenib 1回300mg 1日1回経口投与 副作用: ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、下痢、悪心嘔吐、疲労 皮膚悪性腫瘍、手足症候群、眼障害、横紋筋融解症 |
| 大腸癌 (C18) Her2陽性大腸癌 RAS野生型 | AADC-0303 | Pertuzumab+Trastuzumab(Her2陽性大腸癌) | Pertuzumab 初回840mg/body 2回目以降420mg/body day1 Trastuzumab 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg day1 3週ごと 副作用: インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感 間質性肺炎、悪心、口内炎 |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0317 | Bevacizumab+Trifluridine | ベバシズマブ 5mg/kg day1, 15 トリフルリジン 1回35mg/m ² を1日2回 5日間連続経口投与した後2日間休薬し、これを2回繰り返した後 14日間休む 1コース28日間 副作用: 骨髄抑制、悪心、食欲減退、疲労、下痢、嘔吐、口内炎、感染症、間質性肺炎 創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|---|-----------|------------------------------|--|
| 大腸癌 (C18) | AADC-0321 | bi weekly cetuximab | セツキシマブ 500mg/m ² day1 |
| | | | 2週毎 |
| | | | 副作用: ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、下痢 |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0322 | bi weekly cetuximab+mFOLFOX6 | セツキシマブ 500mg/m ² day1 |
| | | | L-OHP 85mg/m ² day1 |
| | | | 5-FU (bolus) 400mg/m ² day1 |
| | | | 5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46~48hr |
| | | | l-LV 200mg/m ² day1 |
| | | | 2週毎 |
| 副作用: ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、食欲不振、下痢、悪心・嘔吐、発熱 脱毛、疲労感、骨髄抑制、末梢神経障害、注射部位反応、 | | | |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0323 | bi weekly cetuximab+FOLFIRI | セツキシマブ 500mg/m ² day1 |
| | | | CPT-11 150mg/m ² (75歳以上は120mg/m ²) day1 |
| | | | l-LV 200mg/m ² day1 |
| | | | 5-FU (bolus) 400mg/m ² day1 |
| | | | 5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46~48hr |
| | | | 2週毎 |
| 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛、発熱 ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction | | | |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0324 | bi weekly cetuximab+5FU+l-LV | セツキシマブ 500mg/m ² day1 |
| | | | 5-FU (bolus) 400mg/m ² day1 |
| | | | 5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46~48hr |
| | | | l-LV 200mg/m ² day1 |
| | | | 2週毎 |
| 副作用: Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、心不全、血栓塞栓症、口内炎 ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎 骨髄抑制、感染症、肝機能障害、手足症候群、低マグネシウム血症 | | | |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0329 | Cetuximab+CPT-11(bi-weekly) | セツキシマブ 500mg/m ² day1 |
| | | | CPT-11 150mg/m ² (76才以上は120mg/m ²) day1 |
| | | | 2週毎 |
| | | | 副作用: Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、低マグネシウム血症、口内炎 ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎 骨髄抑制、腸管穿孔、消化管出血、腸閉塞、末梢神経障害、脱毛 腎機能障害、血栓塞栓症 |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0330 | IRIS+bev(TRICOLORE) | ベバシズマブ 7.5mg/kg day1 |
| | | | CPT-11 150mg/m ² day1 |
| | | | TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1~day14 |
| | | | 体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回 |
| | | | 1.25から1.5m ² 未満 50mg/回 |
| | | | 1.5m ² 以上 60mg/回 |
| | | | 3週毎 |
| 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック、消化管穿孔 創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ 可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、間質性肺炎 肝機能障害、脱毛 | | | |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|--|-----------|---|--|
| 大腸癌 (C18) Her2陽性大腸癌 RAS野生型 | AADC-0344 | PHESGO | ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として |
| | | | 初回 (IN) それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1 |
| | | | 2回目以降 (MA) それぞれ 600mg、600mg、20000U day1 |
| | | | 初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与 |
| | | | 3週ごと |
| | | | 副作用: インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感 間質性肺炎、悪心、口内炎 |
| 大腸癌 (C18) | AADC-0356 | Bevacizumab+mFOLFOXIRI | ベバシズマブ 5mg/kg day1 |
| | | | 5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46hr |
| | | | l-LV 200mg/m ² day1 |
| | | | L-OHP 85mg/m ² day1 |
| | | | CPT-11 150mg/m ² day1 |
| | | | 2週毎 |
| | | | 副作用: 骨髄抑制、下痢、悪心、嘔吐、口内炎、無力症、末梢神経障害 高血圧、静脈血栓塞栓症、アナフィラキシー反応、間質性肺炎 腸管穿孔、創傷治癒遅延、白質脳症 |
| 大腸癌 (C18) がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発大腸癌 | AADC-0364 | Fruquintinib | フルキンチニブ 1日1回 5mgを3週間連日経口投与、その後1週間休薬 これを繰り返す |
| | | | 副作用: 手足症候群、蛋白尿、創傷治癒遅延、甲状腺機能低下症、動脈解離 肝機能障害、出血、血栓塞栓症、高血圧、高血圧クリーゼ、可逆性後白質脳症 消化管穿孔、下痢、食欲不振、口内炎、悪心・嘔吐、頻脈、発声障害、骨髄抑制 |
| | | | |
| 大腸癌 (C18) がん化学療法後に増悪したKRAS G12C変異陽性の 治癒切除不能な進行・再発大腸癌 | AADC-0378 | Sotorasib+Panitumumab | ソトラシブ 1日1回 960mg (8錠)を連日経口投与 |
| | | | パニツムマブ 6mg/kg 点滴静注 2週毎 |
| | | | 副作用: 食欲不振、悪心、嘔吐、下痢 肝機能障害、間質性肺疾患 infusion reaction、ざ瘡、皮膚乾燥、発疹、掻痒、爪周炎 疲労、口内炎、低マグネシウム血症 |
| 大腸癌 (C18) BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 | AADC-0387 | ENCO+Cmab+mFOLFOX6 | セツキシマブ 500mg/m ² day1 |
| | | | Encorafenib 1回300mg 1日1回経口投与 |
| | | | L-OHP 85mg/m ² day1 |
| | | | 5-FU (bolus) 400mg/m ² day1 |
| | | | 5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46~48hr |
| | | | l-LV 200mg/m ² day1 |
| | | | 2週毎 |
| | | | 副作用: ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、食欲不振、下痢、悪心・嘔吐、発熱 脱毛、疲労感、骨髄抑制、末梢神経障害、注射部位反応 皮膚悪性腫瘍、手足症候群、眼障害、横紋筋融解症 |
| 大腸癌 (C18) BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 | AADC-0388 | Bi weekly Encorafenib+Cetuximab | Cetuximab 500mg/m ² 2週毎 |
| | | | Encorafenib 1回300mg 1日1回経口投与 |
| | | | 副作用: ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、下痢、悪心嘔吐、疲労 皮膚悪性腫瘍、手足症候群、眼障害、横紋筋融解症 |
| 大腸癌 (C18) BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 | AADC-0389 | Bi weekly Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab | Cetuximab 500mg/m ² 2週毎 |
| | | | Encorafenib 1回300mg 1日1回経口投与 |
| | | | Binimetinib 1回45mg 1日2回経口投与 |
| | | | 副作用: ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、下痢、悪心嘔吐、疲労 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|----------------------|-----------|--------------------------|---|
| | | | 手足症候群、眼障害、心機能障害、肝障害、横紋筋融解症 |
| 肛門管癌 (C21.1) | AADC-0196 | 5-FU+MMC+RT | 5-FU (infusion) 1000mg/m ² /day day1~4 29~32 MMC(bolus) 10mg/m ² /day day1,29 RT 1.8Gy/day 週5回 計33回 総線量 59.4Gy 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、全身倦怠感、体重減少、脱毛、口内炎 出血傾向、溶血性尿毒症症候群、腎障害、間質性肺炎、下痢、色素沈着 肝機能障害、アナフィラキシーショック、白質脳症、うつ血性心不全、手足症候群 食道炎、 |
| 肝癌 (C22) | AADC-0017 | Epirubicin 肝動注 | 1日60mg/m ² を動脈内投与 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、脱毛、悪心・嘔吐 |
| 肝癌 (C22) | AADC-0141 | Miriplatin肝動注 | 1日1回70mg を肝動脈内投与(1回120mgを上限) 繰り返し投与する場合は4週間以上の観察期間をおく 副作用: 肝機能障害、骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、発熱、投与部位の疼痛 腎機能障害、全身倦怠感 |
| 肝癌 (C22) | AADC-0160 | Sorafenib | 用法・用量 1回400mg 1日2回 経口投与 適宜増減 副作用: 手足症候群、剥脱性皮膚炎、発疹、脱毛、下痢、高血圧、疲労 食欲不振、そう痒感、体重減少、肝機能障害、出血 間質性肺炎、急性肺障害、高血圧クリーゼ、可逆性後白室脳症 皮膚粘膜眼症候群、消化管穿孔、心筋虚血・心筋梗塞 |
| 肝癌 (C22) | AADC-0240 | Lenvatinib | 用法・用量 体重60kg以上 1日1回12mg経口投与 体重60kg未満 1日1回8mg経口投与 副作用: 高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労 口内炎、蛋白尿、手掌・足底発赤知覚不全症候群、出 動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔 可逆性後白質脳症症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延 低カルシウム血症 |
| 肝癌 (C22) 切除不能肝細胞癌 | AADC-0293 | Atezolizumab+Bevacizumab | アテゾリズマブ 1200mg day1 ベバシズマブ 15mg/kg day1 3週ごと 副作用: 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害 消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧 |
| 肝癌 (C22) 進行再発肝細胞癌 | AADC-0327 | Durvalumab+Tremelimumab | Durvalumab 1500mg (体重30kg以下の場合は20mg/kg) 4週間隔 Tremelimumab 300mg (体重30kg以下の場合は4mg/kg) 初回単回のみ 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション |
| 肝癌 (C22) 進行再発肝細胞癌 | AADC-0348 | Durvalumab | Durvalumab 1500mg/body day1 体重30kg以下の場合は1回20mg/kg 4週毎 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|-----------------------------------|-----------|----------------------|---|
| | | | 副作用: 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー |
| 肝癌 (C22) がん化学療法後に増悪した切除不能な肝細胞癌 | AADC-0278 | Cabozantinib | カボザンチニブ 副作用: 1回60mg 1日1回空腹時 高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労 口内炎、蛋白尿、手足症候群、横紋筋融解症 動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔 可逆性後白質脳症症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延 低カルシウム血症 |
| 肝癌 (C22) 切除不能肝細胞癌 | AADC-0309 | Nivolumab+ipilimumab | Nivolumab 80mg/body Ipilimumab 3mg/kg 3週毎 4回投与後、Nivolumab 240mg/bodyを2週毎、又は480mg/bodyを4週毎 で継続 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 肝機能障害、肝炎、血球貪食症候群、結核 |
| 胆道癌 (C22~24) | AADC-0001 | S-1(CG) | 用法 a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法 (副作用の軽減を目的) 用量 朝食後および夕食後の1日2回 体表面積 1.25㎡未満 40mg/回 1.25から1.5㎡未満 50mg/回 1.5㎡以上 60mg/回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 |
| 胆道癌 (C22~24) | AADC-0015 | GEM | GEM 1000 mg/㎡を週1回 3回投与 1週休薬 1000 mg/㎡を2週間に1回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感 |
| 胆道癌 (C22~24) | AADC-0163 | GC療法 | GEM 1000mg/㎡ day1.8 CDDP 25mg/㎡ day1.8 1クール:3週 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 |
| 胆道癌 (C22~24) | AADC-0320 | Durvalumab+GEM+CDDP | Durvalumab 1500mg/body day1 GEM 1000mg/㎡ day1.8 CDDP 25mg/㎡ day1.8 1クール:3週 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー |
| 胆道癌 (C22~24) | AADC-0347 | GCS | GEM 1000mg/㎡ day1 CDDP 25mg/㎡ day1 S-1 80mg/㎡ day1-7 1クール:2週 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 下痢、色素沈着、発疹 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|----------------------|-----------|------------------------|---|
| 胆道癌 (C22~24) | AADC-0352 | Pembrolizumab+GEM+CDDP | Pembrolizumab 200mg/body day1 |
| | | | GEM 1000mg/m ² day1.8 |
| | | | CDDP 25mg/m ² day1.8 |
| | | | 1クール:3週 CDDPは最大8クールまで、以降Pembrolizumab+GEM or Pembrolizumab単剤で継続 |
| | | | 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 |
| | | | 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー |
| 膵癌 (C25) | AADC-0001 | S-1(CG) | 用法 a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法 (副作用の軽減を目的) |
| | | | 用量 朝食後および夕食後の1日2回 |
| | | | 体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回 |
| | | | 1.25から1.5m ² 未満 50mg/回 |
| | | | 1.5m ² 以上 60mg/回 |
| 膵癌 (C25) | AADC-0015 | GEM | GEM 1000 mg/m ² を週1回 3回投与 1週休薬 1000 mg/m ² を2週間に1回 |
| | | | 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感 |
| | | | |
| 膵癌 (C25) | AADC-0143 | GEM +IMRT療法 | GEM 1000 mg/m ² を週1回 3回投与 1週休薬 |
| | | | 放射線照射 1.8Gy×28Fr total50.4Gy |
| | | | 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感 |
| 膵癌 (C25) | AADC-0159 | Erlotinib+GEM療法 | Erlotinib 100mg/day 連日経口投与 |
| | | | GEM 1000 mg/m ² を週1回 3回投与 1週休薬 |
| | | | 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、さ瘡様皮疹等の発疹、悪心・嘔吐、下痢 |
| | | | 間質性肺炎 |
| 膵癌 (C25) 治癒切除不能膵癌 | AADC-0200 | FOLFIRINOX | L-OHP 85mg/m ² day1 |
| | | | 5-FU (bolus) 400mg/m ² day1 |
| | | | 5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46hr |
| | | | l-LV 200mg/m ² day1 |
| | | | CPT-11 180mg/m ² day1 |
| | | | 2週ごと |
| | | | 副作用: 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐、倦怠感、下痢 発熱、脱毛、肝機能障害 |
| | | | |
| 膵癌 (C25) 治癒切除不能膵癌 | AADC-0212 | GEM+nab-PTX | GEM 1000mg/m ² day1 |
| | | | nab-PTX 125mg/m ² day1 |
| | | | 3週投与1週休薬 |
| | | | 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感 脱毛、末梢神経障害、発疹、下痢 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|--|-----------|----------------|--|
| 膵癌 (C25) BRCA遺伝子変異陽性、プラチナ製剤を含む化学療法後に疾患進行が認められていない膵癌 | AADC-0248 | Olaparib | オラパリブ 副作用: 1回300mgを1日2回経口投与 悪心、嘔吐、味覚異常 貧血、好中球減少、血小板減少、リンパ球減少 疲労、無力症、間質性肺炎 下痢、頭痛 |
| 膵癌 (C25) 切除可能膵癌術前 | AADC-0256 | GEM+S-1(膵癌NAC) | GEM S-1 副作用: 1000 mg/m ² day1.day8 30分かけて点滴静注 体表面積毎(80mg~120mg) 14日間 分2で内服 (day1の夕方からday15の朝まで) これを2コース繰り返す。 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感 下痢、口内炎、色素沈着、発疹 |
| 膵癌 (C25) 治癒切除不能膵癌 | AADC-0318 | NaI-IRI+5FU/LV | Lipospmal Irinotecan 5-FU (infusion) I-LV 副作用: 70mg/m ² day1 2400mg/m ² day1~3 200mg/m ² day1 2週毎 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、肝機能障害、脱毛 倦怠感、好中球減少、貧血、低カリウム血症 |
| 膵癌 (C25) 治癒切除不能膵癌 | AADC-0014 | mFOLFOX6療法 | L-OHP 5-FU (bolus) 5-FU (infusion) I-LV 副作用: 85mg/m ² day1 400mg/m ² day1 2400mg/m ² 46hr 200mg/m ² day1 2週ごと 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐、倦怠感、下痢 発熱、肝機能障害 |
| 膵内分泌腫瘍 (C25.4) | AADC-0169 | Everolimus | Everolimus 副作用: 10mg/day 連日経口投与 口内炎、発疹、下痢、疲労、末梢性浮腫、悪心・嘔吐、食欲不振 鼻出血、貧血、味覚障害、体重減少、頭痛、掻痒症、高血糖 血小板減少、無力症、間質性肺炎、腎不全、アナフィラキシー様症状 急性呼吸窮迫症候群、肺塞栓症、深部静脈血栓症、好中球減少 悪性腫瘍(二次発癌)、皮膚乾燥、爪の障害、心嚢液貯留 進行性多巣性白室脳症、BKウィルス腎症、細胞蛋白症 |
| 消化管神経内分泌腫瘍 (C26.9) | AADC-0188 | サントスタチンLAR | サントスタチンLAR 副作用: 1回30mgを4週毎に臀部筋肉内に注射 注射部位硬結、注射部位疼痛、胆石症、下痢 |
| 膵・消化管神経内分泌腫瘍 (C25.4、C26.9) | AADC-0257 | Lanreotide | Lanreotide 副作用: 1回120mgを4週毎に深部皮下内に注射 注射部位硬結、注射部位疼痛、徐脈 胆石症、下痢、白色便 |
| 膵・消化管神経内分泌腫瘍 (C25.4、C26.9) | AADC-0277 | Streptozocin | Streptozocin 副作用: 1000 mg/m ² 1週間毎 30分かけて点滴静注 腎障害、骨髄抑制、耐糖能異常、肝障害 血管痛、悪心、便秘、味覚異常、倦怠感 |
| 肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 | AADC-0001 | S-1(CG) | 用法 a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的) |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|---------------------------|-----------|-------------------|--|
| | | | 用量 朝食後および夕食後の1日2回 体表面積 1.25㎡未満 40mg/回 1.25から1.5㎡未満 50 mg/回 1.5㎡以上 60mg/回 |
| | | | 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 |
| 肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 | AADC-0010 | UFT(UFTE) | 用法・用量 1日量としてテガフル300-600mgを1日2-3回に分割投与 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害 |
| 肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 | AADC-0015 | GEM | GEM 1000 mg/㎡を週1回 3回投与 1週休薬 1000 mg/㎡を2週間に1回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感 |
| 肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 | AADC-0019 | PTX + CBDCA療法(TC) | PTX 200mg/㎡ day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 3週ごと 副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害 |
| 肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 | AADC-0020 | DTX + CDDP療法(DC) | DTX 60mg/㎡ day1 CDDP 80mg/㎡ day1 3~4週ごと 副作用: 悪心・嘔吐、腎機能障害、神経毒性、聴覚障害、電解質異常、浮腫、倦怠感 味覚異常、爪の変形、骨髄抑制、脱毛 |
| 肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 | AADC-0022 | Iressa | 250mgを1日1回経口投与 副作用: 下痢、皮膚乾燥症、ニキビ様皮疹、肝機能障害、間質性肺炎 |
| 肺癌 (C34) 非細胞肺癌 | AADC-0025 | CPT-11 | CPT-11 100mg/㎡ day1.8.15 1週間隔で3回投与、1週休薬 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、間質性肺炎 |
| 肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 | AADC-0091 | tri-weekly DTX | DTX 60mg/㎡ day1 3週ごと 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害 |
| 肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 | AADC-0098 | CPT-11+CDDP療法(IP) | CDDP 80mg/㎡ day1 CPT-11 60mg/㎡ day1.8.15 4週ごと 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、倦怠感、腎機能障害、下痢、間質性肺炎、食欲不振 末梢神経障害、脱毛、 |
| 肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 | AADC-0106 | Tarceva | エルロチニブ 150mg 1日1回経口投与 副作用: 発疹、下痢、皮膚乾燥、掻痒感、間質性肺疾患、肝機能障害 |
| 肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 | AADC-0111 | VNR | ビノレルビン 25mg/㎡ day1.8 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|--|------------------|--|---|
| | | | 3週ごと(4クール以上、最大6クール) |
| 肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 | <i>AADC-0114</i> | <i>Pemetrexed+ CDDP療法</i> | Pemetrexed 500mg/m ² day1 CDDP 75mg/m ² day1 3週毎 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、倦怠感、口内炎、神経障害 |
| 肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 | <i>AADC-0119</i> | <i>CDDP+VNR+IMRT療法</i> | CDDP 80mg/m ² day1 VNR 20mg/m ² day1、8 3週ごと 4コース 放射線療法 2Gy/日 5回/週 計6週30回60Gy (化学療法1コース目のday3から開始) 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、間質性肺炎、食欲不振、口内炎、倦怠感、腎機能障害 |
| 肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 | <i>AADC-0149</i> | <i>Bevacizumab based TC療法</i> | PTX 200mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 ベバシズマブ 15mg/kg day1 3週ごと CBDCA+PTX+ベバシズマブを3週間間隔で4~6サイクル実施後、アバスチン単独を3週間間隔で投与する 副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、喀血、肺出血、血栓塞栓症 |
| 肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 | <i>AADC-0151</i> | <i>CDDP+VNR療法</i> | CDDP 80mg/m ² day1 VNR 25mg/m ² day1、8 3週ごと 4コース 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、間質性肺炎、食欲不振、口内炎、倦怠感、腎機能障害 |
| 肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 | <i>AADC-0170</i> | <i>Pemetrexed</i> | Pemetrexed 500mg/m ² day1 3週毎 4コース 副作用: 肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心 |
| 肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 | <i>AADC-0180</i> | <i>CBDCA+Pemetrexed</i> | Pemetrexed 500mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 3週毎 4コース 副作用: 肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感、下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり |
| 肺癌 (C34) ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行再発非小細胞肺癌 ROS1融合遺伝子陽性の切除不能な進行再発非小細胞肺癌 | <i>AADC-0176</i> | <i>Crizotinib</i> | Crizotinib 1回250mg1日2回内服 副作用: 悪心・嘔吐、視力障害、下痢、便秘、末梢性浮腫、間質性肺炎、肝機能障害、QT間隔延長、骨髄抑制 |
| 肺癌 (C34) 進行性非扁平非小細胞肺癌 | <i>AADC-0181</i> | <i>PEM+CBDCA+BV followed by PEM+BV</i> | Pemetrexed 500mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 ベバシズマブ 15mg/kg day1 3~4週毎4コース後 CR、PR、SDなら維持療法へ 維持療法 Pemetrexed 500mg/m ² day1 ベバシズマブ 15mg/kg day1 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|--|
| | | | 3週毎PDになるまで継続 副作用: 肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり 高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、喀血、肺出血、血栓塞栓症 |
| 肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 | AADC-0186 | CBDCA+S-1療法 | CBDCA 目標AUC=5 day1 TS-1 80~120mg/body day1~14 3週毎 副作用 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 神経障害、関節痛、脱毛 |
| 肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 | AADC-0189 | IMRT+CBDCA | CBDCA 30mg/m ² day1~day5 IMRT 2Gy/日 day1~day5 1週毎 CBDCAは4週間実施、IMRTは6週間実施 副作用: 嘔気・嘔吐、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、発熱、骨髄抑制、肝機能障害 アナフィラキシー様症状、間質性肺炎、急性腎不全、肝不全、 消化管壊死、消化管出血、出血性腸炎、偽膜性大腸炎、麻痺性イレウス 脳梗塞、肺梗塞、血栓・塞栓症、心筋梗塞、うっ血性心不全、溶血性尿毒症症候群 急性呼吸窮迫症候群、DIC、急性膵炎、難聴、皮膚炎、放射線肺炎、放射線食道炎 脊髄症 |
| 肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 | AADC-0194 | nab-paclitaxel + Carboplatin | アブラキササン 100mg/m ² day1, 8, 15 CBDCA 目標AUC=6/body day1 4週毎 副作用: 脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹 食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、脳神経麻痺、アナフィラキシー 間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、 |
| 肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 | AADC-0201 | AVAPERL | Pemetrexed 500mg/m ² day1 CDDP 75mg/m ² day1 ペバシズマブ 7.5mg/kg day1 3週毎4コース後 SDもしくはresponse(+)なら維持療法へ 維持療法 Pemetrexed 500mg/m ² day1 ペバシズマブ 7.5mg/kg day1 3週毎PDになるまで継続 副作用: 腎機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり 高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、喀血、肺出血、血栓塞栓症 |
| 肺癌 (C34) 局所進行非小細胞肺癌 | AADC-0202 | S-1+CDDP+RT | CDDP 60mg/m ² day1 TS-1 1回40mg/m ² 1日2回 day1~14 4週毎2コース施行中に放射線治療施行 1回2Gy 週5日 30回照射 計60Gy(6週間) 上記化学放射線療法終了後2週間後から CDDP 60mg/m ² day1 TS-1 1回40mg/m ² 1日2回 day1~14 4週毎2コース施行 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|--|-----------|---------------------|--|
| | | | 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 |
| 肺癌 (C34) EGFR遺伝子変異陽性の手術不能または再発 非小細胞肺癌 | AADC-0204 | Afatinib | Afatinib 1日1回40mg経口投与 患者の状態により適宜増減 1日50mgまで 副作用: 下痢、発疹、爪囲炎、口内炎、間質性肺炎、皮膚障害、肝機能障害 鼻出血、食欲減退、疲労、粘膜の炎症、体重減少、味覚異常 結膜炎、心障害 |
| 肺癌 (C34) 小細胞肺癌 | AADC-0010 | UFT(UFTE) | 用法・用量 1日量としてテガフル300-600mgを1日2-3回に分割投与 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害 |
| 肺癌 (C34) 小細胞肺癌 | AADC-0023 | CBDCA+ETP療法(CE) | VP-16 80mg/m ² day1~3 CBDCA 目標AUC=5/body day1 3~4週ごと 副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振 |
| 肺癌 (C34) 小細胞肺癌 | AADC-0024 | CPT-11+ CDDP療法(IP) | CDDP 60mg/m ² day1 CPT-11 60mg/m ² day1.8.15 4週ごと 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、倦怠感、腎機能障害、下痢、間質性肺炎、食欲不振 末梢神経障害、脱毛、 |
| 肺癌 (C34) 小細胞肺癌 | AADC-0025 | CPT-11 | CPT-11 100mg/m ² day1.8.15 1週間隔で3回投与、2週休薬 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、間質性肺炎 |
| 肺癌 (C34) 小細胞肺癌 | AADC-0100 | PE(CDDP+ETP)+IMRT療法 | CDDP 80mg/m ² day1 VP-16 100mg/m ² day1~3 3~4週ごと 4コース 副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振 |
| 肺癌 (C34) | AADC-0137 | AMR | AMR 35~40mg/m ² 3日間連続投与 3週ごと 3~6コース 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、脱毛、肝機能障害、発熱 |
| 肺癌 (C34) | AADC-0145 | GC療法 | GEM 1000mg/m ² day1.8 CDDP 80mg/m ² day1 3週毎 4~6コース 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 |
| 肺癌 (C34) ALK陽性・ROS1陽性肺癌 | AADC-0176 | Crizotinib | クリゾチニブ 1回250mgを1日2回経口投与 副作用: 間質性肺疾患、肝機能障害、QT間隔延長、徐脈 血液障害、心不全、発疹、便秘、口内炎、悪心 腎機能障害、倦怠感、筋肉痛、光線過敏性 |
| 肺癌 (C34) CPT-11が使用できない進展型小細胞肺癌 | AADC-0177 | CDDP+VP-16 | CDDP 80mg/m ² day1 VP-16 100mg/m ² day1~3 副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振 |
| 肺癌 (C34) | AADC-0210 | Alectinib | アレクチニブ 1回300mg1日2回経口投与 副作用: 間質性肺疾患、肝機能障害、骨髄抑制、消化管穿孔 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|--|-----------|---------------------------|--|
| | | | 血栓塞栓症、味覚異常、発疹、便秘、口内炎、悪心 腎機能障害、倦怠感、筋肉痛、光線過敏性 |
| 肺癌 (C34) EGFR遺伝子変異陽性肺癌 | AADC-0211 | Erlotinib+Bevacizumab併用療法 | ベバシズマブ 15mg/kg 3週間毎 エルロチニブ 100~150mg 1日1回経口投与 副作用: 発疹、下痢、皮膚乾燥、掻痒感、肝機能障害、神経毒性、食欲減退 口内炎、嘔吐、高血圧、脱毛、関節痛、疲労、倦怠感、卵巣機能不全 重大な副作用: ショック、アナフィラキシー、消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血 血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧クレーゼ、可逆性後白質脳症候群 ネフローゼ症候群、骨髄抑制、感染症、うっ血性心不全、間質性肺炎 血栓性微小血管症、 |
| 肺癌 (C34) 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | AADC-0225 | Nivolumab | ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション |
| 肺癌 (C34) | AADC-0231 | Osimertinib | タグリソ 1日1回80mg 副作用: 発疹、ざ瘡、下痢、皮膚乾燥、爪の障害、間質性肺炎、QT間隔延長 骨髄抑制、肝機能障害 |
| 肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 | AADC-0232 | RAM+DTX | RAM 10mg/kg day1 3週ごと DTX 60mg/m ² day1 3週ごと 副作用: 腹痛、高血圧、下痢、 動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害 インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血 骨髄抑制、低カリウム血症、低ナトリウム血症 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、 |
| 肺癌 (C34) PD-L1陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 PD-L1陽性の未治療非小細胞肺癌 | AADC-0235 | Pembrolizumab | ペムブロリズマブ 1回200mg 3週間隔 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎 |
| 肺癌 (C34) | AADC-0237 | Ceritinib | セリチニブ 1日1回750mg空腹時に経口投与 副作用: 間質性肺炎、肝機能障害、QT間隔延長、徐脈、下痢 高血糖、眼障害、皮下組織障害、胃腸障害、疲労 腎及び尿路障害 |
| 肺癌 (C34) 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | AADC-0241 | Atezolizumab | アテゾリズマブ 1200mg day1 3週ごと 副作用: 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害 |
| 肺癌 (C34) | AADC-0243 | Lorlatinib | ロルラチニブ 1日1回100mgを経口投与 副作用: 間質性肺炎、肝機能障害、QT間隔延長、徐脈、下痢 膵炎、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|-----------------------------------|------------------|--|---|
| | | | 末梢性ニューロパチー |
| 肺癌 (C34) 進行性非扁平上皮非小細胞肺癌 | AADC-0245 | CBDCA+PEM+Pembrolizumab→PEM+Pembrolizumab | Pemetrexed 500mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=5 day1 Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎4コース後 維持療法へ 維持療法 Pemetrexed 500mg/m ² day1 Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎 副作用: 肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎 |
| 肺癌 (C34) 扁平上皮癌 | AADC-0246 | CBDCA+nab-PTX+Pembrolizumab→Pembrolizumab | アブラキサン 100mg/m ² day1, 8, 15 CBDCA 目標AUC=6/body day1 Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎4コース後 維持療法へ 維持療法 Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎 副作用: 脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹 食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー 間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎 |
| 肺癌 (C34) 非扁平上皮非小細胞肺癌 | AADC-0247 | CBDCA+PTX+Bevacizumab+Atezolizumab→Bevacizumab+Atezolizumab維持療法 | PTX 200mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 ベバシズマブ 15mg/kg day1 アテゾリズマブ 1200mg/body day1 3週毎4-6コース後 維持療法へ 維持療法 ベバシズマブ 15mg/kg day1 アテゾリズマブ 1200mg/body day1 3週毎 副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、悪心・嘔吐 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害 |
| 肺癌 (C34) 小細胞肺癌 | AADC-0254 | CBDCA+VP-16+Atezolizumab f/b Atezolizumab | VP-16 100mg/m ² day1~3 CBDCA 目標AUC=5 day1 アテゾリズマブ 1200mg/body day1 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|---------------------------------------|-----------|--|---|
| | | | 3週毎4コース後 維持療法へ 維持療法 アテゾリズマブ 1200mg/body day1 3週毎 副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害 |
| 肺癌 (C34) 進行性非扁平上皮非小細胞肺癌 | AADC-0262 | CBDCA+PEM+Atezolizumab→PEM+Atezolizumab | Pemetrexed 500mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 Atezolizumab 1200mg/body day1 3週毎4-6コース後 維持療法へ 維持療法 Pemetrexed 500mg/m ² day1 Atezolizumab 1200mg/body day1 3週毎 副作用: 肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎 |
| 肺癌 (C34) HER2遺伝子変異陽性 非小細胞肺癌 | AADC-0264 | Trastuzumab Deruxtec | Trastuzumab Deruxtec 5.4mg/kg day1 3週ごと 副作用: 間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション 骨髄抑制、脱毛、疲労、悪心・嘔吐、下痢、便秘、口内炎 |
| 肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 | AADC-0268 | Pembrolizumab(6週間) | ペムブロリズマブ 1回400mg 6週間隔 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎 |
| 肺癌 (C34) 小細胞肺癌 | AADC-0270 | CDDP+VP-16+Durvalumab→維持療法Durvalumab | VP-16 80-100mg/m ² day1~3 CDDP 75-80mg/m ² day1 Durvalumab 1500mg/body day1 3週毎4コース後 維持療法へ 維持療法 Durvalumab 1500mg/body day1 4週毎 副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振 腎機能障害、疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害 |
| 肺癌 (C34) 小細胞肺癌 | AADC-0271 | CBDCA+VP-16+Durvalumab→維持療法Durvalumab | VP-16 80-100mg/m ² day1~3 CBDCA 目標AUC=5-6 day1 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|--|-----------|--------------------------------|--|
| | | | Durvalumab 1500mg/body day1 3週毎4コース後 維持療法へ 維持療法 |
| | | | Durvalumab 1500mg/body day1 4週毎 副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害 |
| 肺癌 (C34) 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | AADC-0272 | 4週毎 Nivolumab | ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション |
| 肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 | AADC-0274 | Ipilimumab+Nivolumab | Ipilimumab 1mg/kg 6週間隔 Nivolumab 360mg/body 3週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 |
| 肺癌 (C34) 小細胞肺癌 | AADC-0275 | Nogitecan | Nogitecan 1mg/m ² 5日間連続投与 3週ごと 副作用: 骨髄抑制、消化管出血、間質性肺炎、血栓塞栓症 悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、発熱、易疲労感 |
| 肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 (前治療2レジメン以内) | AADC-0276 | nab-PTX単剤 | nab-PTX 100mg/m ² day1,8,15 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感 脱毛、末梢神経障害、発疹、下痢 |
| 肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 | AADC-0279 | Ipilimumab+Nivolumab+PEM+CDDP | Ipilimumab 1mg/kg 6週間隔 Nivolumab 360mg/body 3週間隔 Pemetrexed 500mg/m ² 3週間隔 CDDP 75mg/m ² 3週間隔 ★CDDP+Pemetrexedは2コースで終了 ★維持療法はNivolumab (±Pemetrexed)を3週毎+Ipilimumab6週毎 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎 |
| 肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 | AADC-0280 | Ipilimumab+Nivolumab+PEM+CBDCA | Ipilimumab 1mg/kg 6週間隔 Nivolumab 360mg/body 3週間隔 Pemetrexed 500mg/m ² 3週間隔 CBDCA 目標AUC=6 3週間隔 ★CBDCA+Pemetrexedは2コースで終了 ★維持療法はNivolumab (±Pemetrexed)を3週毎+Ipilimumab6週毎 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------|---|
| | | | 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 発疹、骨髄抑制、悪心、下痢、味覚異常、便秘、しゃっくり |
| 肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 | AADC-0281 | <i>Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX</i> | Ipilimumab 1mg/kg 6週間隔 Nivolumab 360mg/body 3週間隔 PTX 200mg/m ² 3週間隔 CBDCA 目標AUC=6 3週間隔 ★CBDCA+PTXは2コースで終了 ★維持療法はNivolumabを3週毎+Ipilimumab6週毎 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、悪心・嘔吐 |
| 肺癌 (C34) 扁平上皮癌 | AADC-0282 | <i>Nectinumab+GEM+CDDP</i> | Necitumumab 800mg day1.8 GEM 1250mg/m ² day1.8 CDDP 75mg/m ² day1 3週毎 ★CDDP+GEMは最大6コース ★維持療法はNecitumumab単剤でPDまで継続 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、インフュージョンリアクション、下痢 |
| 肺癌 (C34) | AADC-0299 | <i>CBDCA+PTX+Pembrolizumab</i> | CBDCA 目標AUC=6/body day1 PTX 200mg/m ² day1 Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎4コース後 維持療法へ 維持療法 Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎 副作用: 脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹 食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー 間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎 |
| 肺癌 (C34) EGFR遺伝子変異陽性肺癌 | AADC-0304 | <i>Erlotinib+Ramucirumab</i> | ラムシルマブ 10mg/kg 2週間毎 エルロチニブ 150mg 1日1回 空腹時 連日経口投与 副作用: 高血圧、動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害 インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血 発疹、下痢、皮膚乾燥、掻痒感、間質性肺疾患、肝機能障害 |
| 肺癌 (C34) EGFR遺伝子変異陽性肺癌 | AADC-0305 | <i>Gefitinib+Ramucirumab</i> | ラムシルマブ 10mg/kg 2週間毎 ゲフィチニブ 250mg 1日1回 連日経口投与 副作用: 高血圧、動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害 インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血 発疹、下痢、皮膚乾燥、掻痒感、間質性肺疾患、肝機能障害 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|-----------------------------|-----------|---|---|
| 肺癌 (C34) BRAF遺伝子変異陽性肺癌 | AADC-0306 | Dabrafenib+Trametinib | ダブラフェニブ 1回150mg 1日2回 空腹時連日経口投与 |
| | | | トラメチニブ 1回2mg 1日1回 空腹時連日経口投与 |
| | | | 副作用: 発熱、肝機能障害、眼障害、心障害 静脈血栓塞栓症、脳血管障害 有棘細胞癌、横紋筋融解症、間質性肺疾患 |
| 肺癌 (C34) 局所進行非小細胞肺癌 | AADC-0307 | CBDCA+PTX+RT | PTX 40mg/m ² day1 |
| | | | CBDCA 目標AUC=2 day1 |
| | | | 毎週投与 計6回(放射線療法を行っている間) 副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、 肝機能障害 |
| 肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 非扁平上皮癌 | AADC-0315 | Atezolizumab+nab-PTX+CBDCA→Atezolizumab | アブラキサン 100mg/m ² day1, 8, 15 |
| | | | CBDCA 目標AUC=6/body day1 |
| | | | Atezolizumab 1200mg/body day1 |
| | | | 3週毎4コース後 維持療法へ |
| | | | 維持療法 Atezolizumab 1200mg/body day1 |
| | | | 3週毎 副作用: 脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹 食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー 間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 肺炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎 |
| 肺癌 (C34) ALK陽性肺癌 | AADC-0325 | Brigatinib | ブリグチニブ 1日1回90mgを7日間経口投与後、1日1回180mgを経口投与 (14日以上休薬した場合は90mgにて再開) |
| | | | 副作用: 間質性肺疾患、高血圧、徐脈、高血糖 視覚障害、CK上昇、リパーゼorアミラーゼ上昇(膵炎) 下痢、悪心、肝機能障害、口内炎、発疹 |
| 肺癌 (C34) KRAS G12C変異陽性肺癌 | AADC-0328 | Sotorasib | ソトラスィブ 1日1回 960mg(8錠)を連日経口投与 |
| | | | 副作用: 食欲不振、悪心、嘔吐、下痢 肝機能障害、間質性肺疾患 |
| 肺癌 (C34) ROS1融合遺伝子陽性肺癌 | AADC-0331 | Entrectinib | エントレクチニブ 1日1回 600mg(3Cap)を連日経口投与 |
| | | | 副作用: 心臓障害、QT延長、認知障害・運動失調 間質性肺疾患、失神、成長発達遅延 味覚異常、浮動性めまい、末梢感覚ニューロパチー |
| 肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 | AADC-0332 | Tremelimumab+durvalumab+PEM+CBDCA | Tremelimumab 75mg/body day1 |
| | | | Durvalumab 1500mg/body day1 |
| | | | Pemetrexed 500mg/m ² day1 |
| | | | CBDCA 目標AUC=6 day1 |
| | | | 3週毎 CBDCAは4コースで終了 |
| | | | 維持療法は4週毎にPemetrexed+Durvalumab ★維持療法の2回目のみ Pemetrexed+Durvalumab+Tremelimumab 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|--|-----------|---------------------------------------|--|
| | | | 血球貪食症候群、結核 発疹、骨髄抑制、悪心、下痢、味覚異常、便秘、しゃっくり |
| 肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 | AADC-0333 | Tremelimumab+durvalumab+nab-PTX+CBDCA | Tremelimumab 75mg/body day1 Durvalumab 1500mg/body day1 nab-PTX 100mg/m ² day1、8、15 CBDCA 目標AUC=6 day1 3週毎 CBDCA+nab-PTXは4コースで終了 維持療法は4週毎にDurvalumab ★維持療法の2回目のみ Durvalumab+Tremelimumab 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、悪心・嘔吐 |
| 肺癌 (C34) 術前 Stage IIIA (Stage II でも症例によって考慮) | AADC-0334 | Nivolumab+PTX+CBDCA(術前のみ) | Nivolumab 360mg/body day1 CBDCA 目標AUC=5 or 6 day1 PTX 175mg/m ² day1 3週毎 最大3コース 副作用: 脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹 食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー 間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎 |
| 肺癌 (C34) 肺腺癌術前 Stage IIIA (Stage II でも症例によって考慮) | AADC-0335 | Nivolumab+CDDP+PEM(術前のみ) | Nivolumab 360mg/body day1 Pemetrexed 500mg/m ² day1 CDDP 75mg/m ² day1 3週毎 最大3コース 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎 |
| 肺癌 (C34) 切除可能非小細胞肺癌 | AADC-0338 | Nivolumab+GEM+CDDP(術前のみ) | Nivolumab 360mg/body day1 CDDP 75mg/m ² day1 GEM 1000mg/m ² day1,day8 3週毎 最大3コース 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎 |
| 肺癌 (C34) 切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における 根治的放射線療法後の維持療法 投与期間は12ヶ月まで | AADC-0345 | Durvalumab | Durvalumab 1500mg/body day1 体重30kg以下の場合は1回20mg/kg 4週毎 副作用: 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|--|-----------|------------------------|---|
| | | | 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー |
| 肺癌 (C34) METエクソン14スキッピング変異陽性 切除不能な進行・再発非小細胞性肺癌 | AADC-0350 | Capmatinib | カプマチニブ 1日2回 1回400mg を連日経口投与 副作用： 間質性肺疾患、体液貯留、肝機能障害、腎機能障害 悪心・嘔吐、下痢、リパーゼ増加、疲労 低リン酸血症、発疹、便秘、血中ビリルビン増加 |
| 肺癌 (C34) EGFR変異陽性肺癌 | AADC-0359 | Osimertinib+PEM+CDDP | Osimertinib 1日1回80mg を連日経口投与 CDDP 75mg/m ² day1 Pemetrexed 500mg/m ² day1 3週毎 CDDP併用は最大4コース 維持療法はPEM 500mg/m ² day1 3週毎 + Osimertinib 80mg 連日 副作用： 悪心・嘔吐、下痢、便秘、食欲不振、口内炎 皮疹、皮膚乾燥、浮腫 貧血、好中球減少、血小板減少 |
| 肺癌 (C34) 肺扁平上皮癌(周術期) | AADC-0361 | Pembrolizumab+GEM+CDDP | Pembrolizumab 200mg/body day1 CDDP 75mg/m ² day1 GEM 1000mg/m ² day1,day8 (術前) 3週毎 最大4コース Pembrolizumab 200 or 400mg/body day1 (術後) 200mg 3週毎 もしくは 400mg6週毎 副作用： 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎 |
| 肺癌 (C34) 非扁平上皮非小細胞肺癌(周術期) | AADC-0362 | Pembrolizumab+PEM+CDDP | Pembrolizumab 200mg/body day1 Pemetrexed 500mg/m ² day1 CDDP 75mg/m ² day1 (術前) 3週毎 最大4コース Pembrolizumab 200 or 400mg/body day1 (術後) 200mg 3週毎 もしくは 400mg6週毎 副作用： 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎 |
| 肺癌 (C34) 白金製剤を含む化学療法後に増悪した小細胞肺癌 | AADC-0366 | Tarlatamab | Tarlatamab 1mg day1 10mg day8 10mg day15 以降 2週毎 副作用： サイトカイン放出症候群 (CRS) 免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群 (ICANS) を含む神経学的事象 骨髄抑制、間質性肺疾患、食欲不振、味覚異常 |
| 肺癌 (C34) 限局型小細胞肺癌における 根治的放射線療法後の維持療法 投与期間は24ヶ月まで | AADC-0368 | Durvalumab | Durvalumab 1500mg/body day1 体重30kg以下の場合は1回20mg/kg 4週毎 副作用： 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 | |
|---|------------|---------------------------|--|---|
| 肺癌 (C34) EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | AADC-0369 | Amivantamab+CBDCA+PEM | Amivantamab | 80kg未満 80kg以上 |
| | | | | 350mg/body 350mg/body day1 |
| | | | | 1050mg/body 1400mg/body day2 |
| | | | | 1400mg/body 1750mg/body day8、day15 |
| | | | | 1400mg/body 1750mg/body day1 (2サイクル目) |
| | | | | 1750mg/body 2100mg/body day1 (3サイクル目以降) |
| | | | | CBDCA |
| | Pemetrexed | 500mg/m ² day1 | | |
| | | 3週毎 | CBDCAは4コースで終了 | |
| | | 副作用: | ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、低マグネシウム血症、体液貯留 掻痒感、インフュージョンリアクション、下痢、静脈血栓塞栓症 肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり | |
| 肺癌 (C34) 切除可能な非小細胞癌(扁平上皮癌) II A~III B(N2)期 | AADC-0379 | Durvalumab+PTX+CBDCA | Durvalumab | 1500mg/body day1 |
| | | | CBDCA | 目標AUC=6 day1 |
| | | | PTX | 200mg/m ² day1 |
| | | | | 術前 3週毎 4コース |
| | | | Durvalumab | 1500mg/body day1 |
| | | | | 術後 4週毎 12コース |
| | | | | 副作用: |
| 肺癌 (C34) 切除可能な非小細胞癌(扁平上皮癌) II A~III B(N2)期 | AADC-0380 | Durvalumab+CBDCA+GEM | Durvalumab | 1500mg/body day1 |
| | | | CBDCA | 目標AUC=5 day1 |
| | | | GEM | 1000mg/m ² day1,day8 |
| | | | | 術前 3週毎 4コース |
| | | | Durvalumab | 1500mg/body day1 |
| | | | | 術後 4週毎 12コース |
| | | | | 副作用: |
| 肺癌 (C34) 切除可能な非小細胞癌(扁平上皮癌) II A~III B(N2)期 | AADC-0381 | Durvalumab+CDDP+GEM | Durvalumab | 1500mg/body day1 |
| | | | CDDP | 75mg/m ² day1 |
| | | | GEM | 1000mg/m ² day1,day8 |
| | | | | 術前 3週毎 4コース |
| | | | Durvalumab | 1500mg/body day1 |
| | | | | 術後 4週毎 12コース |
| | | | | 副作用: |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|--|-----------|---------------------|--|
| 肺癌 (C34) 切除可能な非小細胞癌(非扁平上皮癌) II A~III B(N2)期 | AADC-0382 | Durvalumab+CBDC+PEM | Durvalumab 1500mg/body day1 |
| | | | Pemetrexed 500mg/m ² day1 |
| | | | CBDC 目標AUC=5 day1 |
| | | | 術前 3週毎 4コース |
| | | | Durvalumab 1500mg/body day1 |
| | | | 術後 4週毎 12コース |
| | | | 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 発疹、骨髄抑制、悪心、下痢、味覚異常、便秘、しゃっくり |
| 肺癌 (C34) 切除可能な非小細胞癌(非扁平上皮癌) II A~III B(N2)期 | AADC-0383 | Durvalumab+CDDP+PEM | Durvalumab 1500mg/body day1 |
| | | | Pemetrexed 500mg/m ² day1 |
| | | | CDDP 75mg/m ² day1 |
| | | | 術前 3週毎 4コース |
| | | | Durvalumab 1500mg/body day1 |
| | | | 術後 4週毎 12コース |
| | | | 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎 |
| 肺癌 (C34) PD-L1 50% 以上の非小細胞肺癌 | AADC-0390 | Cemiplimab | Cemiplimab 1回350mg 3週毎 |
| | | | 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 肺癌 (C34) 化学療法後に増悪したHER2 (ERBB2) 遺伝子変異陽性の 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | AADC-0391 | Zongertinib | Zongertinib 1日1回 1回120mg を連日経口投与 |
| | | | 副作用: 肝機能障害、間質性肺炎、心機能障害 重度の下痢、悪心、血球減少 口内炎、皮膚乾燥、そう痒症、爪の障害、発疹 |
| | | | |
| 胸腺腫 (C37) | AADC-0308 | ADOC | DXR 40mg/m ² day1 |
| | | | CDDP 50mg/m ² day1 |
| | | | VCR 0.6mg/m ² (最大2mg/body) day3 |
| | | | CPA 700mg/m ² day4 |
| | | | 3週毎 副作用: 骨髄抑制、心毒性、末梢神経障害、肝障害、悪心・嘔吐、脱毛 腎障害、出血性膀胱炎 |
| 胸腺癌 (C37) 進行胸腺癌2次治療以降 | AADC-0222 | Lenvatinib | 用法・用量 1回24mg 1日1回 |
| | | | 副作用: 高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労 口内炎、蛋白尿、手掌・足底発赤知覚不全症候群、出 動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔 可逆性後白質脳症症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延 低カルシウム血症 |
| | | | |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|----------------------------|-----------|--------------------------|---|
| 胸腺癌 (C37) | AADC-0137 | AMR | AMR 35~40mg/m ² |
| | | | 3週ごと 3~6コース 3日間連続投与 |
| | | | 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、脱毛、肝機能障害、発熱 |
| 悪性胸膜中皮腫 (C38) | AADC-0114 | Pemetrexed+ CDDP療法 | Pemetrexed 500mg/m ² day1 |
| | | | CDDP 75mg/m ² day1 |
| | | | 3週毎 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、倦怠感、口内炎、神経障害 |
| 悪性胸膜中皮腫 (C38) | AADC-0225 | Nivolumab | ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 |
| | | | 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション |
| | | | |
| 悪性胸膜中皮腫 (C38) | AADC-0274 | Ipilimumab+Nivolumab | Ipilimumab 1mg/kg 6週間隔 |
| | | | Nivolumab 360mg/body 3週間隔 |
| | | | 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 |
| 悪性胸膜中皮腫 (C38) | AADC-0349 | CBDCA+Pemetrexed | Pemetrexed 500mg/m ² day1 |
| | | | CBDCA 目標AUC=5 day1 |
| | | | 3週毎 4-6コース 副作用: 肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり |
| 骨髄腫 (C42) | AADC-0161 | Bortezomib | ボルテゾミブ 1.3mg/m ² 1日1回 day1.4.8.11 |
| | | | 3週毎 |
| | | | 副作用: 肺障害、心障害、末梢性ニューロパシー、イレウス 骨髄抑制、低血圧、腫瘍崩壊症候群、皮膚粘膜眼症候群 中毒性表皮壊死症、発熱、可逆性後白質脳症候群 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、肝機能障害 |
| 骨髄腫 (C42) | AADC-0165 | Bortezomib+Dexamethasone | ボルテゾミブ 1.3mg/m ² 1日1回 day1.4.8.11 |
| | | | デキサメタゾン 20mg 1日1回 day1.2.4.5.8.9.11.12 |
| | | | 3週毎 副作用: 肺障害、心障害、末梢性ニューロパシー、イレウス 骨髄抑制、低血圧、腫瘍崩壊症候群、皮膚粘膜眼症候群 中毒性表皮壊死症、発熱、可逆性後白質脳症候群 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、肝機能障害、血管浮腫 不眠症、無力症、疲労、錯覚症、筋痙攣、高血糖 誘発感染症、続発性副腎皮質機能不全、消化性潰瘍 骨粗鬆症、霧視、紅斑、味覚異常、血栓塞栓症、緑内障、 |
| 骨髄腫 (C42) 原発性マクログロブリン血症 | AADC-0218 | DRC療法 | デキサメタゾン 20mg 点滴 day1 |
| | | | リツキシマブ 375mg/m ² 点滴 day1 |
| | | | シクロホスファミド 200mg/m ² 経口 day1~5 |
| | | | 3週毎6ヶ月間 副作用: アナフィラキシー様症状、腫瘍崩壊症候群、肝機能障害、 皮膚粘膜症状、皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死融解症 骨髄抑制、間質性肺炎、心障害、消化管穿孔、イレウス、 SIADH |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|-----------------------|-----------|------------------------|--|
| | | | 横紋筋融解症、悪心・嘔吐、脱毛、色素沈着、食欲不振 口内炎、不眠、高血糖 |
| 悪性黒色腫 (C43) | AADC-0225 | Nivolumab | ニボルマブ 副作用： 240mg/body 2週間隔 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション |
| 悪性黒色腫 (C43) | AADC-0272 | 4週毎 Nivolumab | ニボルマブ 副作用： 480mg/body 4週間隔 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション |
| 悪性軟部腫瘍 (C49) | AADC-0199 | Pazopanib | パゾパニブ 副作用： 1日1回800mg 経口投与 下痢、疲労、悪心、高血圧、毛髪変色、食欲減退、体重減少、味覚異常 肝機能障害、心機能障害、動脈血栓性事象、静脈血栓性事象、出血 甲状腺機能障害、ネフローゼ症候群、蛋白尿、感染症、創傷治癒遅延 |
| 悪性軟部腫瘍 (C49) | AADC-0265 | doxorubicin | doxorubicin 75mg/m ² day1 3週毎 total 6回施行(心毒性に対する用量制限) 副作用： 悪心・嘔吐、白血球減少、食欲不振、脱毛、肝機能異常、下痢・軟便 全身倦怠感、口内炎 |
| 乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経前 | AADC-0027 | Tamoxifen | TAM 1日1回20mg 副作用： 無月経、月経異常、悪心・嘔吐、食欲不振 |
| 乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経前 | AADC-0069 | Zoladex | ゴセリン 副作用： 4週に1回3.6mgを皮下投与 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下 |
| 乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経前 | AADC-0070 | Zoladex LA | ゴセリン 副作用： 10.8mgを前腹部に12～13週毎に1回投与 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下 |
| 乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経前 | AADC-0094 | Leuprorelin | リュープロレリン 副作用： 4週に1回3.75mgを皮下投与 12週に1回11.25mgを皮下投与へ切り替え使用あり 間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、肝機能障害、黄疸、うつ状態 熱感、ほてり、のぼせ、頭痛・頭重、発汗、寝汗、注射部位障害 悪心・嘔吐、体重増加 |
| 乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経前 | AADC-0095 | Leuprorelin +TAM療法 | リュープロレリン 副作用： 4週に1回3.75mgを皮下投与 12週に1回11.25mgを皮下投与へ切り替え使用あり TAM 1日1回20mg 間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、肝機能障害、黄疸、うつ状態 熱感、ほてり、のぼせ、頭痛・頭重、発汗、寝汗、注射部位障害 悪心・嘔吐、体重増加、無月経、月経異常 |
| 乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経前 | AADC-0096 | Leuprorelin + Femara療法 | リュープロレリン 副作用： 4週に1回3.75mgを皮下投与 12週に1回11.25mgを皮下投与へ切り替え使用あり レトロゾール 1日1回2.5mg 間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、肝機能障害、黄疸、うつ状態 熱感、ほてり、のぼせ、頭痛・頭重、発汗、寝汗、注射部位障害 悪心・嘔吐、体重増加、関節痛、発疹、搔痒感、血栓症、塞栓症 |
| 乳癌 (C50) | AADC-0097 | Femara | 副作用： 悪心・嘔吐、体重増加、関節痛、発疹、搔痒感、血栓症、塞栓症 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|-----------------------|-----------|--------------------|--|
| 内分泌療法 閉経前 | | | レトロゾール 1日1回2.5mg 副作用: ほてり、頭痛、関節痛、悪心、発疹、掻痒感、肝機能障害 塞栓症、血栓症 |
| 乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経後 | AADC-0030 | Arimidex | アナストロゾール 1日1回 1mg 副作用: ほてり、嘔気、脱毛、性器出血 |
| 乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経後 | AADC-0031 | Aromasin | エキセメスタン 1日1回 25mg 副作用: ほてり、多汗、高血圧、めまい、悪心、疲労 |
| 乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経後 | AADC-0032 | Fareston | トレミフェン 1日1回40mg 副作用: 肝機能障害、白血球減少 |
| 乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経後 | AADC-0033 | high dose Fareston | トレミフェン 1日1回120mg 副作用: 肝機能障害、白血球減少 |
| 乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経後 | AADC-0034 | Hysron-H | MPA 1日600から1200mg 分3 副作用: 体重増加、満月様顔貌、子宮出血、浮腫、血栓症、月経異常 |
| 乳癌 (C50) 化学療法 | AADC-0001 | S-1(CG) | 用法 a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的) 用量 朝食後および夕食後の1日2回 体表面積 1.25㎡未満 40mg/回 1.25から1.5㎡未満 50 mg/回 1.5㎡以上 60mg/回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 |
| 乳癌 (C50) 化学療法 | AADC-0010 | UFT(UFTE) | 用法・用量 1日量としてテガフル300-600mgを1日2-3回に分割投与 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害 |
| 乳癌 (C50) 化学療法 | AADC-0035 | Xeloda | カペシタビン 1日2回 3週連続投与 1週休薬 体表面積 1.31㎡未満 900mg/回 1.31から1.64㎡未満 1200mg/回 1.64㎡以上 1500mg/回 副作用: 手足症候群、骨髄抑制 |
| 乳癌 (C50) 化学療法 | AADC-0036 | weekly PTX | PTX 100mg/㎡ 6週投与2週休薬 副作用: 脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛、関節痛 悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常 |
| 乳癌 (C50) 化学療法 | AADC-0038 | tri-weekly DTX | DTX 60~75mg/㎡ day1 3週毎 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害 |
| 乳癌 (C50) 化学療法 | AADC-0040 | FEC100療法 | 5-FU 500mg/㎡ day1 EPI 100mg/㎡ day1 CPA 500mg/㎡ day1 3週毎 副作用: 悪心・嘔吐、白血球減少、食欲不振、脱毛、肝機能異常、下痢・軟便 全身倦怠感、口内炎 |
| 乳癌 (C50) 化学療法 | AADC-0042 | weekly Trastuzumab | トラスツズマブ 初回 4mg/kg 2回目以降 2mg/kg 毎週投与 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|------------------|-----------|-------------------------------|--|
| 乳癌 (C50) 化学療法 | AADC-0043 | bi weekly Trastuzumab | 副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制 |
| | | | トラスツズマブ [*] 4mg/kg day1 2週毎 |
| 乳癌 (C50) 化学療法 | AADC-0044 | bi weekly PTX + Trastuzumab療法 | 副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制 |
| | | | PTX 80mg/m ² day1 トラスツズマブ [*] 4mg/kg day1 2週毎 |
| 乳癌 (C50) 化学療法 | AADC-0045 | VNR | 副作用: 脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛 関節痛、悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常、発熱、悪寒 アントラサイクリン系・タキサン系無効例 |
| | | | VNR 25mg/m ² 1週間間隔で2回投与 1週休薬 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、嘔気・嘔吐、静脈炎、発熱、口内炎 電解質異常 |
| 乳癌 (C50) 化学療法 | AADC-0046 | VNR + Trastuzumab療法 | VNR 25mg/m ² day1 2回投与1週休薬 トラスツズマブ [*] 2mg/kg day1 毎週投与 (初回は4mg/kg) 3週毎 |
| | | | 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、嘔気・嘔吐、静脈炎、発熱、口内炎 電解質異常、悪寒 |
| 乳癌 (C50) 化学療法 | AADC-0087 | tri-weekly Trastuzumab | トラスツズマブ [*] 初回8mg/kg day1 2回目以降 6mg/kg day1 3週毎 |
| | | | 副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制 |
| 乳癌 (C50) 化学療法 | AADC-0088 | weekly trastuzumab + PTX療法 | PTX 80mg/m ² day1 トラスツズマブ [*] 2mg/kg day1 毎週投与 |
| | | | 副作用: 脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛 関節痛、悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常、発熱、悪寒 |
| 乳癌 (C50) 化学療法 | AADC-0129 | Tykerb + Xeloda 療法 | タイケルブ [*] 1回1250mg 1日1回 連日投与 カペシタビン 1回1000mg/m ² 1日2回 2週連続投与 1週休薬 副作用: 手足症候群、骨髄抑制、下痢、口内炎、倦怠感、嘔気・嘔吐 |
| | | | DTX 60~75mg/m ² day1 CPA 500~600mg/m ² day1 3週毎 |
| 乳癌 (C50) 化学療法 | AADC-0130 | DTX+Cyclophosphamide療法 | 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害 |
| | | | DTX 60~75mg/m ² day1 3週毎 カペシタビン 1回1250mg/m ² 1日2回 2週連続投与 1週休薬 |
| 乳癌 (C50) 化学療法 | AADC-0131 | DTX +Xeloda療法 | 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害、手足症候群 |
| | | | DTX 60~75mg/m ² day1 3週毎 トラスツズマブ [*] 初回8mg/kg 2回目以降 6mg/kg day1 3週毎 |
| 乳癌 (C50) 化学療法 | AADC-0132 | DTX+tri-weekly Trastuzumab 療法 | 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害 |
| | | | DTX 60~75mg/m ² day1 3週毎 トラスツズマブ [*] 初回8mg/kg 2回目以降 6mg/kg day1 3週毎 |
| 乳癌 (C50) 化学療法 | AADC-0144 | XELODA + Trastuzumab療法 | カペシタビン 1回1250mg/m ² 1日2回 2週連続投与 1週休薬 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|--|-----------|---------------------------|---|
| | | | トラスツズマブ 6mg/kg day1 3週毎 副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制、手足症候群 |
| 乳癌 (C50) トリプルネガティブ | AADC-0149 | Bevacizumab based TC療法 | PTX 200mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 ベバシズマブ 15mg/kg day1 3週ごと CBDCA+PTX+ベバシズマブを3週間間隔で4~6サイクル実施後、アバスチン単独を3週間間隔で投与する 副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、喀血、肺出血、血栓塞栓症 |
| 乳癌 (C50) 進行・再発乳癌 化学療法 | AADC-0150 | tri-weekly Abraxane | アブラキサン 1回 260mg/m ² 3週毎 副作用: 脱毛、疲労、筋痛、末梢神経障害、骨髄抑制、下痢、悪心嘔吐 |
| 乳癌 (C50) アントラサイクリン及びタキサンを含む抗がん剤治療後 再発・転移乳癌 化学療法 | AADC-0166 | Eribulin | ハラヴェン 1.4mg/m ² day1, 8 3週ごと 副作用: 骨髄抑制、脱毛、疲労、食欲減退、発熱、便秘、下痢、嘔吐、口内炎、味覚異常、末梢神経障害、肝機能障害、間質性肺炎 |
| 乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経後 | AADC-0167 | Fulvestrant | フルベストラント 1回2筒(1筒250mg) 左右の臀部に1筒ずつ筋肉内投与 初回、2週後、4週後、その後4週ごとに1回 副作用: 注射部位疼痛、注射部位硬結、ほてり、注射部位掻痒感、肝機能障害、血栓塞栓症、悪心、便秘、卵巣腫大、頭痛、感覚異常、不眠症、背部痛、筋肉痛、高TG血症、高コレステロール血症 |
| 乳癌 (C50) | AADC-0172 | CMF(経口法) | MTX 40mg/m ² day1, 8 5-FU 600mg/m ² day1, 8 CPA 1回50mg 1日2回 day1~15 4週ごと 副作用: 嘔気・嘔吐、食欲不振、脱毛、肝機能障害、口内炎、骨髄抑制 |
| 乳癌 (C50) | AADC-0173 | CMF(静注法) | MTX 40mg/m ² day1 5-FU 600mg/m ² day1 CPA 600mg/m ² day1 3週ごと 副作用: 嘔気・嘔吐、食欲不振、脱毛、肝機能障害、口内炎、骨髄抑制 |
| 乳癌 (C50) | AADC-0174 | Bevacizumab + PTX療法 | PTX 90mg/m ² day1,8,15 ベバシズマブ 10mg/kg day1,15 4週ごと 副作用: 嘔気・嘔吐、食欲不振、脱毛、肝機能障害、口内炎、骨髄抑制、末梢神経障害、関節痛、筋肉痛、下痢、高血圧、蛋白尿、出血、消化管穿孔、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ、可逆性後白質脳症症候群、創傷治癒遅延、味覚異常、爪の障害 |
| 乳癌 (C50) | AADC-0190 | Gemcitabine 手術不能又は再発乳癌 | GEM 1250mg/m ² day1,8 3週ごと 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感、間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、心筋梗塞、うっ血性心不全、肺水腫、気管支痙攣、ARDS、腎不全、溶血性尿毒症症候群 |
| 乳癌 (C50) | AADC-0195 | THP療法 | 用法・用量 1クール目 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|-------------------|-----------|---------------------------|---|
| 進行・再発乳癌 補助化学療法 | | | Pertuzumab 840mg/body day1 Trastuzumab 8mg/kg day1 DTX 75mg/m ² day1 2クール目 Pertuzumab 420mg/body day1 Trastuzumab 6mg/kg day1 DTX 75mg/m ² day1 1クール=3週間 DTX を6サイクルまで投与し、7サイクル以降が主治医の判断で継続 副作用 下痢、脱毛、爪の異常、倦怠感、嘔気・嘔吐、しびれ、発疹、骨髄抑制 インフュージョンリアクション、うつ血性心不全 |
| 乳癌 (C50) | AADC-0203 | Everolimus | Everolimus 1日1回10mgを経口投与 (ホルモン療法併用) 副作用: 口内炎、発疹、疲労、食欲減退、下痢、味覚異常、悪心 感染症、体重減少、貧血、鼻出血、高血糖、血小板減少 掻痒症 |
| 乳癌 (C50) | AADC-0207 | P/T+Eribulin | Pertuzumab 初回840mg/body 2回目以降420mg/body day1 Trastuzumab 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg day1 Eribulin 1.4mg/m ² day1, day8 3週ごと 副作用: インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、脱毛、倦怠感 骨髄抑制、悪心、爪の異常、ニューロパチー、発疹、間質性肺炎 流涙増加、肝機能障害、アナフィラキシー、浮腫、疼痛 |
| 乳癌 (C50) | AADC-0209 | T-DM1(手術不能または再発乳癌) | T-DM1 3.6mg/kg day1 3週ごと 副作用: 倦怠感、鼻出血、悪心、発熱、食欲減退、骨髄抑制、肝機能障害 間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション 末梢神経障害 |
| 乳癌 (C50) | AADC-0217 | EC療法 | EPI 100mg/m ² day1 CPA 600mg/m ² day1 3週毎 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎 出血性膀胱炎、下痢、口内炎、アナフィラキシー、排尿障害 イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、 |
| 乳癌 (C50) | AADC-0221 | AC療法 | ADM 60mg/m ² day1 CPA 600mg/m ² day1 3週毎 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎 口内炎、心電図異常、出血性膀胱炎、下痢、肝機能障害 イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、急性腎不全 アナフィラキシー、排尿障害 |
| 乳癌 (C50) | AADC-0226 | Leuproterin Pro | Leuproterin Pro22.5mg 24週毎皮下注射 副作用: 注射部位硬結、注射部位紅斑、注射部位疼痛、糖尿病、ほてり 間質性肺炎、アナフィラキシー、肝機能障害、血栓塞栓症 |
| 乳癌 (C50) 化学療法 | AADC-0234 | TC+tri weekly Trastuzumab | DTX 75mg/m ² day1 CPA 600mg/m ² day1 トラスツズマブ 初回8mg/kg 2回目以降 6mg/kg day1 3週毎 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|---|-----------|---------------------------|--|
| | | | 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害 |
| 乳癌 (C50) | AADC-0238 | Palbociclib + Letrozole | パルボシクリブ 1日1回125mg 3週連続投与1週休薬 レトロゾール 1日1回2.5mg 連続投与 4週毎 副作用: ほてり、頭痛、関節痛、悪心、発疹、掻痒感、肝機能障害 塞栓症、血栓症 骨髄抑制、脱毛、疲労、感染症、口内炎、下痢、間質性肺炎 |
| 乳癌 (C50) | AADC-0239 | Palbociclib + fulvestrant | パルボシクリブ 1日1回125mg 3週連続投与1週休薬 フルベストラント 1回2筒(1筒250mg) 左右の臀部に1筒ずつ筋肉内投与 day1, day15 その後はサイクル1の1日目から換算して18日(±7日)毎 副作用: 注射部位疼痛、注射部位硬結、ほてり、注射部位掻痒感 肝機能障害、血栓塞栓症、悪心、便秘、卵巣腫大、頭痛 感覚異常、不眠症、背部痛、筋肉痛、高TG血症、高コレステロール血症 骨髄抑制、脱毛、疲労、感染症、口内炎、下痢、間質性肺炎 |
| 乳癌 (C50) | AADC-0244 | Abemaciclib | アベマシクリブ 1回150mgを1日2回経口投与(フルベストラントorレトロゾールorアナストゾールと併用) 副作用: 肝機能障害、骨髄抑制、下痢、間質性肺炎 静脈血栓塞栓症、感染症、悪心、嘔吐 疲労、脱毛症 血清クレアチニン上昇 |
| 乳癌 (C50) | AADC-0248 | Olaparib | オラパリブ 1回300mgを1日2回経口投与 副作用: 悪心、嘔吐、味覚異常 貧血、好中球減少、血小板減少、リンパ球減少 疲労、無力症、間質性肺炎 下痢、頭痛 |
| 乳癌 (C50) | AADC-0249 | nab-PTX+trasutuzumab | nab-PTX 1回 260mg/m ² 3週毎 トラスツズマブ 初回8mg/kg day1 2回目以降 6mg/kg day1 3週毎 副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制 脱毛、筋痛、末梢神経障害、下痢 |
| 乳癌 (C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行 | AADC-0255 | nab-PTX+Atezolizumab | Atezolizumab 840mg/回 点滴静注 day1, day15 nab-PTX 100mg/m ² 点滴静注 day1, day8, day15 その後13日間休薬 28日で1コース 副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制 脱毛、筋痛、末梢神経障害、下痢 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害 |
| 乳癌 (C50) | AADC-0258 | DD-EC | EPI 90mg/m ² day1 CPA 600mg/m ² day1 ヘクフィルグラスチム 3.6mg day2 2週毎 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎 出血性膀胱炎、下痢、口内炎、アナフィラキシー、排尿障害 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|---|-----------|-------------------------|--|
| | | | イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、 |
| 乳癌 (C50) | AADC-0263 | DD-PTX | PTX 175mg/m ² day1 ペグフィルグラスチム 3.6mg day2 2週毎 副作用: 脱毛、疲労、筋痛、末梢神経障害、骨髄抑制、下痢、悪心嘔吐 |
| 乳癌 (C50) 進行再発乳癌 | AADC-0264 | Trastuzumab Deruxtec | Trastuzumab Deruxtec 5.4mg/kg day1 3週ごと 副作用: 間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション 骨髄抑制、脱毛、疲労、悪心・嘔吐、下痢、便秘、口内炎 |
| 乳癌 (C50) | AADC-0269 | T-DM1(術後) | T-DM1 3.6mg/kg day1 3週ごと (投与回数は14回まで) 副作用: 倦怠感、鼻出血、悪心、発熱、食欲減退、骨髄抑制、肝機能障害 間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション 末梢神経障害 |
| 乳癌 (C50) | AADC-0286 | CBDCA+GEM | GEM 1000mg/m ² day1.8 CBDCA AUC2 day1.8 3週毎 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、発熱、皮疹 |
| 乳癌 (C50) | AADC-0287 | Pembrolizumab+CBDCA+GEM | Pembrolizumab 200mg/body day1 GEM 1000mg/m ² day1.8 CBDCA AUC2 day1.8 3週毎 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、発熱、皮疹 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害 |
| 乳癌 (C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行 | AADC-0288 | Pembrolizumab+CBDCA+GEM | Pembrolizumab 200mg/body day1 GEM 1000mg/m ² day1.8 day22.29 CBDCA AUC2 day1.8 day22.29 6週毎 副作用: AADC-0287と同様 |
| 乳癌 (C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行 | AADC-0289 | Pembrolizumab+nab-PTX | Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎 nab-PTX 100mg/m ² 点滴静注 day1,8,15 4週毎 副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制 脱毛、筋痛、末梢神経障害、下痢 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害 |
| 乳癌 (C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行 | AADC-0290 | Pembrolizumab+nab-PTX | Pembrolizumab 200mg/body day1 6週毎 nab-PTX 100mg/m ² 点滴静注 day1,8,15 4週毎 副作用: AADC-0289と同様 |
| 乳癌 (C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行 | AADC-0291 | Pembrolizumab+PTX 3週 | Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎 PTX 90mg/m ² 点滴静注 day1,8,15 4週毎 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|--|-----------|-------------------------|--|
| | | | 副作用: 脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛、関節痛 悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害 |
| 乳癌 (C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行 | AADC-0292 | Pembrolizumab+PTX 6週 | Pembrolizumab 200mg/body day1 6週毎 PTX 90mg/m ² 点滴静注 day1,8,15 4週毎 副作用: AADC-0291と同様 |
| 乳癌 (C50) トリプルネガティブ進行乳癌 術前 | AADC-0311 | Pembrolizumab+CBDCA+PTX | Pembrolizumab 200mg/body day1 CBDCA 目標AUC=5/1 day1 PTX 80mg/m ² day1,8,15 3週毎 術前4コース 副作用: 脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹 食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー 間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎 |
| 乳癌 (C50) トリプルネガティブ進行乳癌 術前 | AADC-0312 | Pembrolizumab+EC | Pembrolizumab 200mg/body day1 EPI 90mg/m ² day1 CPA 600mg/m ² day1 3週毎 術前4コース 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎 出血性膀胱炎、下痢、口内炎、アナフィラキシー、排尿障害 イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎 |
| 乳癌 (C50) トリプルネガティブ進行乳癌 術後 9回まで | AADC-0313 | Pembrolizumab 200mg 3週毎 | ペムブロリズマブ 1回200mg day1 3週毎 術後9コースまで 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎 |
| 乳癌 (C50) トリプルネガティブ進行乳癌 術後 5回まで | AADC-0314 | Pembrolizumab 400mg 6週毎 | ペムブロリズマブ 1回400mg day1 6週毎 術後5コースまで 副作用: AADC-0313と同様 |
| 乳癌 (C50) HER2陽性乳癌 | AADC-0326 | PT+PTX | 用法・用量 1クール目 Pertuzumab 840mg/body day1 Trastuzumab 8mg/kg day1 PTX 80mg/m ² day1, 8, 15 2クール目以降 Pertuzumab 420mg/body day1 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|-----------------------------|------------------|------------------------|---|
| | | | Trastuzumab 6mg/kg day1 PTX 80mg/m ² day1、8、15 1クール=3週間 |
| | | | 副作用 下痢、脱毛、倦怠感、しびれ、骨髄抑制 インフュージョンリアクション、うつ血性心不全 |
| 乳癌 (C50) HER2陽性乳癌 | AADC-0339 | P/T+nab-PTX | 用法・用量 1クール目 Pertuzumab 840mg/body day1 Trastuzumab 8mg/kg day1 nab-PTX 260mg/m ² day1 2クール目以降 Pertuzumab 420mg/body day1 Trastuzumab 6mg/kg day1 nab-PTX 260mg/m ² day1 1クール=3週間 |
| | | | 副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制 脱毛、筋痛、末梢神経障害、下痢 インフュージョンリアクション、うつ血性心不全 |
| 乳癌 (C50) HER2陽性乳癌 | AADC-0340 | PHESGO+DTX | ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として 初回 (IN) それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1 2回目以降 (MA) それぞれ 600mg、600mg、20000U day1 初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与 DTX 75mg/m ² day1 3週ごと |
| | | | 副作用: インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感 間質性肺炎、悪心、口内炎 脱毛、筋痛、末梢神経障害、爪の異常 |
| 乳癌 (C50) HER2陽性乳癌 | AADC-0341 | PHESGO+Eribulin | ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として 初回 (IN) それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1 2回目以降 (MA) それぞれ 600mg、600mg、20000U day1 初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与 Eribulin 1.4mg/m ² day1、8 3週ごと |
| | | | 副作用: インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感 間質性肺炎、悪心、口内炎、末梢神経障害 |
| 乳癌 (C50) HER2陽性乳癌 | AADC-0342 | PHESGO+PTX | ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として 初回 (IN) それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1 2回目以降 (MA) それぞれ 600mg、600mg、20000U day1 初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与 PTX 80mg/m ² day1、8、15 3週ごと |
| | | | 副作用: インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感 間質性肺炎、悪心、口内炎 脱毛、筋痛、末梢神経障害 |
| 乳癌 (C50) HER2陽性乳癌 | AADC-0343 | PHESGO+nab-PTX | ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として 初回 (IN) それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1 2回目以降 (MA) それぞれ 600mg、600mg、20000U day1 初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与 nab-PTX 260mg/m ² day1 3週ごと |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|---|-----------|-----------------------|---|
| | | | 副作用: インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感 間質性肺炎、悪心、口内炎 脱毛、筋痛、末梢神経障害 |
| 乳癌 (C50) HER2陽性乳癌 術前・術後の場合は投与期間は12ヶ月まで | AADC-0344 | PHESGO | ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として 初回 (IN) それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1 2回目以降 (MA) それぞれ 600mg、600mg、20000U day1 初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与 3週ごと 副作用: インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感 間質性肺炎、悪心、口内炎 |
| 乳癌 (C50) | AADC-0351 | Capivasertib | カピバセルチブ 副作用: 1回400mgを1日2回 経口投与 4日間服用3日間休薬 高血糖、下痢、皮膚障害 悪心・嘔吐、口内炎、発疹、疲労 味覚不全、腎機能障害 |
| 乳癌 (C50) BRCA遺伝子変異陽性かつHER2陰性乳癌 | AADC-0358 | Talazoparib | タラゾパリブ 副作用: 1回1mgを1日1回 経口投与 骨髄抑制、間質性肺疾患、血栓塞栓症、二次性悪性腫瘍 口内炎、倦怠感、悪心、脱毛 下痢、頭痛 |
| 乳癌 (C50) 化学療法歴のあるホルモン受容体陰性かつHER2陰性乳癌 化学療法歴のあるホルモン受容体陽性かつHER3陰性乳癌 | AADC-0363 | Sacituzumab Govitecan | サシツズマブ ゴビテカ 10mg/kg day1、8 3週ごと 副作用: 骨髄抑制、下痢・腸炎、悪心・嘔吐、インフュージョンリアクション 間質性肺疾患、肝機能障害、脱毛、倦怠感 |
| 乳癌 (C50) 化学療法歴のあるホルモン受容体陽性かつHER2陰性乳癌 | AADC-0365 | Datopotamab Deruxtec | Datopotamab Deruxtec 6mg/kg day1 3週ごと 副作用: 間質性肺疾患、角膜障害、口内炎、過敏症、インフュージョンリアクション 骨髄抑制、脱毛、疲労、悪心・嘔吐、下痢、便秘 |
| 子宮頸癌 (C53) | AADC-0082 | NDP+CPT-11療法 | CPT-11 60mg/m ² day1、8 ネタプラチン 100mg/m ² day1 3週毎 副作用: 下痢、悪心・嘔吐、骨髄抑制、腎機能障害、肝機能障害 |
| 子宮体癌 (C54) | AADC-0019 | PTX + CBDCA療法(TC) | PTX 180mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=5 day1 3~4週ごと 副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振 悪心・嘔吐、肝機能障害 |
| 子宮体癌 (C54) | AADC-0080 | DTX+CBDCA療法(DC) | DTX 60~75mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=5 day1 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害 |
| 子宮体癌 (C54) | AADC-0081 | CPA+ADM+CDDP療法(CAP) | CPA 500mg/m ² day1 DXR 50mg/m ² day1 CDDP 50mg/m ² day1 4週ごと 副作用: 脱毛、骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、口内炎、全身倦怠感 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|------------------|-----------|---------------------|---|
| 卵巣癌 (C56) | AADC-0019 | PTX + CBDCA療法(TC) | PTX 180mg/m ² day1 |
| | | | CBDCA 目標AUC=5 day1 |
| | | | 3~4週ごと |
| | | | 副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害 |
| 卵巣癌 (C56) | AADC-0080 | DTX+CBDCA療法(DC) | DTX 60~75mg/m ² day1 |
| | | | CBDCA 目標AUC=5 day1 |
| | | | 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制、肝機能障害 |
| | | | |
| 卵巣癌 (C56) | AADC-0081 | CPA+ADM+CDDP療法(CAP) | CPA 500mg/m ² day1 |
| | | | DXR 50mg/m ² day1 |
| | | | CDDP 50mg/m ² day1 |
| | | | 4週ごと |
| | | | 副作用: 脱毛、骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、口内炎、全身倦怠感 |
| 卵巣癌 (C56) | AADC-0133 | DOXIL | DXR 50mg/m ² を1mg/分で静注 day1 |
| | | | 4週ごと |
| | | | 副作用: 骨髄抑制、アナフィラキシー用症状、手足症候群、口内炎、肝機能障害、悪心、食欲不振、発疹、疲労、体重減少、心筋障害 |
| | | | |
| 卵巣癌 (C56) | AADC-0375 | TC(術後補助化学療法) | PTX 175mg/m ² day1 |
| | | | CBDCA 目標AUC=6 day1 (MAX 800mg/body) |
| | | | 3週毎 最大6コース |
| | | | 副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害 |
| 卵巣杯細胞性悪性腫瘍 (C56) | AADC-0075 | EP療法 | VP-16 100mg/m ² day1~5 |
| | | | CDDP 20mg/m ² day1~5 |
| | | | 1クール:3週 |
| | | | 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、 |
| 卵巣杯細胞性悪性腫瘍 (C56) | AADC-0083 | BEP療法 | BLM 30mg/body day2,9,16 |
| | | | VP-16 100mg/m ² day1~5 |
| | | | CDDP 20mg/m ² day1~5 |
| | | | 1クール:3週 |
| | | | 副作用: 間質性肺炎、肺繊維症、皮膚の硬化、色素沈着、発熱・悪寒、脱毛、食欲不振、体重減少、全身倦怠感、悪心・嘔吐、骨髄抑制、 |
| 前立腺癌 (C61) | AADC-0038 | tri-weekly DTX | DTX 60~75mg/m ² day1 3週毎 |
| | | | 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害 |
| 前立腺癌 (C61) | AADC-0064 | Prostal | クロルマジノン 1回50mg1日2回 副作用: インポテンツ、浮腫、体重増加、女性化乳房 |
| 前立腺癌 (C61) | AADC-0065 | Casodex | ピカルタミド 1回80mg1日1回 副作用: 乳房腫脹、乳房圧痛、肝機能障害、勃起力低下 |
| 前立腺癌 (C61) | AADC-0066 | Odyne | フルタミド 1回125mg 1日3回 副作用: 肝機能障害、女性型乳房、悪心・嘔吐 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|-------------------------|-----------|-------------------------|--|
| 前立腺癌 (C61) | AADC-0067 | Estracyt | エストラムスチン 1回280mg 1日2回 副作用: 女性化乳房、食欲不振、浮腫、貧血、肝機能異常 |
| 前立腺癌 (C61) | AADC-0068 | Leuplin | リュープロレリン 4週に1回3.75mgを皮下投与 副作用: 肝機能障害、ほてり、熱感 |
| 前立腺癌 (C61) | AADC-0070 | Zoladex LA | ゴセレリン 10.8mgを前腹部に12~13週毎に1回投与 副作用: 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下 |
| 前立腺癌 (C61) | AADC-0103 | 多剤ホルモン療法無効前立腺癌 Prosexol | エチニルエストラジオール 1回0.5~1.0mg 1日3回 副作用: 血栓症、心不全、狭心症、発疹、肝機能障害、血圧上昇、電解質異常 |
| 前立腺癌 (C61) | AADC-0124 | Casodex + ZoladexLA 療法 | ビカルタミド 1回80mg1日1回 ゴセレリン 10.8mgを前腹部に12~13週毎に1回投与 副作用: 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下 乳房腫脹、乳房圧痛、肝機能障害 |
| 前立腺癌 (C61) | AADC-0125 | Casodex + Leuplin 療法 | ビカルタミド 1回80mg1日1回 リュープロレリン 4週ごとに3.75mgまたは12週ごとに11.25mgを皮下投与 副作用: 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下 ほてり、熱感 |
| 前立腺癌 (C61) | AADC-0127 | Odyne + ZoladexLA 療法 | フルタミド 1回125mg 1日3回 ゴセレリン 10.8mgを前腹部に12~13週毎に1回投与 副作用: 肝機能障害、女性型乳房、悪心・嘔吐 代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下 |
| 前立腺癌 (C61) | AADC-0187 | Degarelix | デガレリクス 初回240mgを1箇所あたり120mgずつ腹部2箇所に皮下投与 2回目以降80mgを腹部1箇所に皮下投与 4週毎 副作用: 注射部位疼痛、注射部位硬結、注射部位紅斑、ほてり、体重増加 発熱、高血圧、注射部位熱感、間質性肺炎、肝機能障害、糖尿病憎悪 心不全、血栓塞栓症、アナフィラキシー |
| 前立腺癌 (C61) | AADC-0128 | Odyne + Leuplin 療法 | フルタミド 1回125mg 1日3回 リュープロレリン 4週ごとに3.75mgまたは12週ごとに11.25mgを皮下投与 副作用: 肝機能障害、女性型乳房、悪心・嘔吐、ほてり、熱感 |
| 前立腺癌 (C61) 去勢抵抗性前立腺癌 | AADC-0205 | Enzalutamide | エンザルタミド 1回160mg 1日1回 経口投与 連日 副作用: 疲労、悪心、食欲減退、無力症、痙攣発作、下痢、 |
| 前立腺癌 (C61) 去勢抵抗性前立腺癌 | AADC-0208 | Abiraterone | Abiraterone 1回1000mg 1日1回 経口投与 連日 プレドニン 1回5mg 1日2回 経口投与 連日 副作用: 肝機能障害、心障害、疲労、ほてり、悪心・嘔吐、低カリウム血症 高血圧、消化器症状、高脂血症 |
| 前立腺癌 (C61) 去勢抵抗性前立腺癌 | AADC-0224 | Cabazitaxel | Cabazitaxel 20~25mg/m ² day1 Pegfilgrastin 3.6mg day2 3週毎 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|---|-----------|---------------------|---|
| | | | 副作用: 好中球減少症、骨髄抑制、疲労、悪心、下痢、食欲減退 貧血、腎不全、消化管出血、アナフィラキシーショック 心不全、末梢神経障害、DIC、皮膚粘膜眼症候群、心タンポナーデ 心筋梗塞、静脈血栓塞栓症、間質性肺炎、口内炎、SIADH |
| 前立腺癌 (C61) | AADC-0226 | Leuproterin Pro | Leuproterin Pro22.5mg 24週毎皮下注射 副作用: 注射部位硬結、注射部位紅斑、注射部位疼痛、糖尿病、ほてり 間質性肺炎、アナフィラキシー、肝機能障害、血栓塞栓症 |
| 前立腺癌 (C61) | AADC-0250 | Degarelix(12週毎) | デガレリクス 初回240mgを1箇所あたり120mgずつ腹部2箇所に皮下投与 2回目以降は初回投与4週間後より480mgを維持用量として 腹部2箇所に皮下投与し、12週間間隔で投与を繰り返す。 副作用: 注射部位疼痛、注射部位硬結、注射部位紅斑、ほてり、体重増加 発熱、高血圧、注射部位熱感、間質性肺炎、肝機能障害、糖尿病憎悪 心不全、血栓塞栓症、アナフィラキシー |
| 前立腺癌 (C61) | AADC-0251 | Apalutamide | アパルタミド 1回240mg 1日1回 経口投与 連日 副作用: 疲労、皮疹、甲状腺機能低下症、掻痒症、体重減少 痙攣発作、心房細動、心筋梗塞、悪心、下痢 |
| 前立腺癌 (C61) 遠隔転移を有しない去勢抵抗性前立腺癌 | AADC-0266 | Darolutamide | ダロルタミド 1回600mg(300mgを2錠) 1日2回 食後経口投与 連日 副作用: 心臓障害、間質性肺炎患、疲労、皮疹、頭痛、めまい 悪心、下痢、ほてり、高血圧、女性化乳房 |
| 前立腺癌 (C61) BRCA遺伝子変異陽性の遠隔転移を有する去勢抵抗性前立腺癌 | AADC-0248 | Olaparib | オラパリブ 1回300mgを1日2回経口投与 副作用: 悪心、嘔吐、味覚異常 貧血、好中球減少、血小板減少、リンパ球減少 疲労、無力症、間質性肺炎 下痢、頭痛 |
| 前立腺癌 (C61) CDK12陽性の前立腺癌 | AADC-0367 | Cisplatin (CDK12陽性) | CDDP 75mg/m ² day2 3週毎 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、腎機能障害 |
| 精巣腫瘍 (C63) | AADC-0074 | BEP療法 | BLM 30mg/body day1.8.15 VP-16 100mg/m ² day1~5 CDDP 20mg/m ² day1~5 1クール:3週 副作用: 間質性肺炎、肺繊維症、皮膚の硬化、色素沈着、発熱・悪寒、脱毛、食欲不振 体重減少、全身倦怠感、悪心・嘔吐、骨髄抑制、 |
| 精巣腫瘍 (C63) | AADC-0075 | EP療法 | VP-16 100mg/m ² day1~5 CDDP 20mg/m ² day1~5 1クール:3週 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、 |
| 精巣腫瘍 (C63) セミノーム | AADC-0171 | CBDCA | CBDCA AUC=7 単回投与 副作用: 嘔気・嘔吐、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、発熱、骨髄抑制、肝機能障害 |
| 腎癌 (C64) | AADC-0076 | Sumiferon | IFN-α 1日1回300万~600万IU 連日または週1~3回 副作用: 発熱、全身倦怠感、食欲不振、骨髄抑制、肝機能障害 |
| 腎癌 (C64) | AADC-0077 | Imunace | テセロイキン 1日1回70万単位 連日 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|-------------------------------|-----------|----------------------|--|
| 腎癌 (C64) | AADC-0112 | Sutent | 副作用: 発熱、悪寒、倦怠感、食欲不振、悪心・嘔吐、好酸球増多、肝機能障害、浮腫 |
| | | | スニチニブ 1日1回50mg 4週間連続投与2週間休薬 |
| 腎癌 (C64) 根治切除不能または転移性の腎細胞癌 | AADC-0160 | Sorafenib | 副作用: 骨髄抑制、皮膚変色、手足症候群、食欲不振、肝機能異常、疲労感 味覚異常、口内炎、下痢、悪心、歯肉炎、代謝異常、浮腫、発熱、高血圧 |
| | | | 用法・用量 1回400mg 1日2回 経口投与 適宜増減 副作用: 手足症候群、剥脱性皮膚炎、発疹、脱毛、下痢、高血圧、疲労 食欲不振、そう痒感、体重減少、肝機能障害、出血 間質性肺炎、急性肺障害、高血圧クリーゼ、可逆性後白室脳症 皮膚粘膜眼症候群、消化管穿孔、心筋虚血・心筋梗塞 |
| 腎癌 (C64) 根治切除不能または転移性の腎細胞癌 | AADC-0169 | Everolimus | Everolimus 10mg/day 連日経口投与 副作用: 口内炎、発疹、貧血、疲労、下痢、無力症、食欲減退、高コレステロール血症 悪心、粘膜の炎症、嘔吐、末梢性浮腫、高トリグリセリド血症、咳嗽、搔痒症 感染症、皮膚乾燥、鼻出血、呼吸困難、味覚異常、間質性肺炎、腎不全 高血糖、アナフィラキシー様症状、急性呼吸窮迫症候群、肺塞栓症、心嚢液貯留 進行性多巣性白質脳症、BKウイルス腎症、血栓性微小血管障害、肺胞蛋白質 |
| | | | テムシロリムス 25mgを1週間に1回点滴 副作用: 発疹、口内炎、食欲不振、肝機能障害、高血糖、間質性肺疾患 infusion reaction、脂質代謝異常、創傷治癒遅延、腎不全 消化管穿孔、心嚢液貯留、胸水、痙攣、脳出血、感染症 皮膚粘膜眼症候群、横紋筋融解症、骨髄抑制 |
| 腎癌 (C64) 進行再発腎癌 | AADC-0183 | Axitinib | アキシチニブ 1回5mg1日2回経口投与 患者の状態により増減可、増量は1回10mgまで 副作用: 高血圧、甲状腺機能障害、創傷治癒遅延、蛋白尿、手足症候群 肝機能障害、下痢、疲労、悪心嘔吐、発声障害、無力症、体重減少 粘膜炎症、口内炎、味覚異常、鼻出血、 |
| | | | パゾパニブ 1日1回800mg 経口投与 副作用: 下痢、疲労、悪心、高血圧、毛髪変色、食欲減退、体重減少、味覚異常 肝機能障害、心機能障害、動脈血栓性事象、静脈血栓性事象、出血 甲状腺機能障害、ネフローゼ症候群、蛋白尿、感染症、創傷治癒遅延 |
| 腎癌 (C64) | AADC-0225 | Nivolumab | ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション |
| 腎癌 (C64) | AADC-0252 | Nivolumab+Ipilimumab | Nivolumab 240mg/body Ipilimumab 1mg/kg 3週毎4コースまで 5コースから |
| | | | Nivolumab 240mg/body 2週毎継続 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|---------------------------|-----------|----------------------------|--|
| 腎癌 (C64) | AADC-0272 | 4週毎 Nivolumab | ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション |
| 腎癌 (C64) | AADC-0268 | Pembrolizumab(6週間) | ペムブロリズマブ 1回400mg 6週間隔 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎 |
| 腎癌 (C64) | AADC-0278 | Cabozantinib | カボザンチニブ 1回60mg 1日1回空腹時 副作用: 高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労 口内炎、蛋白尿、手足症候群、横紋筋融解症 動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔 可逆性後白質脳症症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延 低カルシウム血症 |
| 腎癌 (C64) | AADC-0392 | Nivolumab+Cabozantinib 2週間 | Nivolumab 240mg/body カボザンチニブ 1回40mg 1日1回空腹時 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 高血圧、下痢、悪心、疲労 口内炎、蛋白尿、手足症候群、横紋筋融解症 動脈血栓症、静脈血栓症、消化管穿孔、低カルシウム血症 可逆性後白質脳症症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延 |
| 腎癌 (C64) | AADC-0393 | Nivolumab+Cabozantinib 4週間 | Nivolumab 480mg/body カボザンチニブ 1回40mg 1日1回空腹時 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 高血圧、下痢、悪心、疲労 口内炎、蛋白尿、手足症候群、横紋筋融解症 動脈血栓症、静脈血栓症、消化管穿孔、低カルシウム血症 可逆性後白質脳症症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延 |
| 腎う癌 (C65) | AADC-0121 | GC療法 | GEM 1000mg/m ² day1.8.15 CDDP 70mg/m ² day2 1クール:4週 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 |
| 腎う癌 (C65) | AADC-0268 | Pembrolizumab(6週間) | ペムブロリズマブ 1回400mg 6週間隔 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎 |
| 腎う癌 (C65) | AADC-0283 | Avelumab | Avelumab 10mg/kg day1 2週毎 |
| 根治切除不能尿路上皮癌における化学療法後の維持療法 | | | |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|--|-----------|----------------------------------|--|
| | | | 副作用: 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー |
| 腎う癌 (C65) がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌 | AADC-0294 | Enfortumab Vedotin | Enfortumab Vedotin 1.25mg/kg day1.8.15 4週毎 |
| | | | 副作用: 皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患 肝機能障害、Infusion reaction |
| 腎う癌 (C65) 筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで | AADC-0225 | Nivolumab | ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション |
| 腎う癌 (C65) 筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで | AADC-0272 | 4週毎 Nivolumab | ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション |
| 腎う癌 (C65) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌 | AADC-0336 | GEM+PTX | GEM 1000mg/m ² day1.8.15 PTX 200mg/m ² day1 4週毎 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 関節痛、筋肉痛、末梢神経障害 |
| 腎う癌 (C65) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌 | AADC-0337 | GEM+CBDCA | GEM 1000mg/m ² day1.8 CBDCA 目標AUC=5 day1 3週毎 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、発熱 |
| 腎う癌 (C65) 根治切除不能な尿路上皮癌の一次治療 | AADC-0360 | Pembrolizumab+Enfortumab Vedotin | Pembrolizumab 200mg/body day1 Enfortumab Vedotin 1.25mg/kg day1.8 3週毎 副作用: 皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患 肝機能障害、Infusion reaction 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、静脈血栓塞栓症 |
| 腎う癌 (C65) 根治切除不能な尿路上皮癌 | AADC-0377 | Nivolumab+GC | Nivolumab 360mg/body day1 CDDP 70mg/m ² day1 GEM 1000mg/m ² day1,day8 3週毎 最大6コース Nivolumab 480mg/body day1 4週毎 最長2年間 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎 |
| 尿管癌 (C66) | AADC-0121 | GC療法 | GEM 1000mg/m ² day1.8.15 CDDP 70mg/m ² day2 1クール:4週 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|--|-----------|----------------------------------|---|
| | | | 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 |
| 尿管癌 (C66) | AADC-0268 | Pembrolizumab(6週間) | ペムブロリズマブ 1回400mg 6週間隔 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎 |
| 尿管癌 (C66) 根治切除不能尿路上皮癌における化学療法後の維持療法 | AADC-0283 | Avelumab | Avelumab 10mg/kg day1 2週毎 副作用: 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー |
| 尿管癌 (C66) がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌 | AADC-0294 | Enfortumab Vedotin | Enfortumab Vedotin 1.25mg/kg day1.8.15 4週毎 副作用: 皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患 肝機能障害、Infusion reaction |
| 尿管癌 (C66) 筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで | AADC-0225 | Nivolumab | ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション |
| 尿管癌 (C66) 筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで | AADC-0272 | 4週毎 Nivolumab | ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション |
| 尿管癌 (C66) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌 | AADC-0336 | GEM+PTX | GEM 1000mg/m ² day1.8.15 PTX 200mg/m ² day1 4週毎 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 関節痛、筋肉痛、末梢神経障害 |
| 尿管癌 (C66) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌 | AADC-0337 | GEM+CBDCA | GEM 1000mg/m ² day1.8 CBDCA 目標AUC=5 day1 3週毎 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、発熱 |
| 尿管癌 (C66) 根治切除不能な尿路上皮癌の一次治療 | AADC-0360 | Pembrolizumab+Enfortumab Vedotin | Pembrolizumab 200mg/body day1 Enfortumab Vedotin 1.25mg/kg day1.8 3週毎 副作用: 皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患 肝機能障害、Infusion reaction 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、静脈血栓塞栓症 |
| 尿管癌 (C66) 根治切除不能な尿路上皮癌 | AADC-0377 | Nivolumab+GC | Nivolumab 360mg/body day1 CDDP 70mg/m ² day1 GEM 1000mg/m ² day1,day8 3週毎 最大6コース |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|--|-----------|---------------------|--|
| | | | Nivolumab 480mg/body day1 4週毎 最長2年間 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎 |
| 膀胱癌 (C67) | AADC-0012 | Furtulon | 5'-DFUR 800-1200mgを3-4回に分けて服用 副作用: 食欲不振、下痢、白血球減少 |
| 膀胱癌 (C67) | AADC-0071 | Epirubicin 膀胱内注入 | EPI 40mgを週1回膀胱内へ注入 10回 副作用: 悪心・嘔吐、白血球減少、食欲不振、脱毛 |
| 膀胱癌 (C67) | AADC-0072 | Immunobladder 膀胱内注入 | BCG 40mgまたは80mgを週1回膀胱内へ注入 10回 副作用: BCG感染、排尿痛、頻尿、肉眼的血尿、肝機能障害、発熱、 |
| 膀胱癌 (C67) | AADC-0121 | GC療法 | GEM 1000mg/m ² day1.8.15 CDDP 70mg/m ² day2 1クール: 4週 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 |
| 膀胱癌 (C67) | AADC-0268 | Pembrolizumab(6週間) | ペムプロリズマブ 1回400mg 6週間隔 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎 |
| 膀胱癌 (C67) 根治切除不能尿路上皮癌における化学療法後の維持療法 | AADC-0283 | Avelumab | Avelumab 10mg/kg day1 2週毎 副作用: 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー |
| 膀胱癌 (C67) がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌 | AADC-0294 | Enfortumab Vedotin | Enfortumab Vedotin 1.25mg/kg day1.8.15 4週毎 副作用: 皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患 肝機能障害、Infusion reaction |
| 膀胱癌 (C67) 筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで | AADC-0225 | Nivolumab | ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション |
| 膀胱癌 (C67) 筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで | AADC-0272 | 4週毎 Nivolumab | ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション |
| 膀胱癌 (C67) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌 | AADC-0336 | GEM+PTX | GEM 1000mg/m ² day1.8.15 PTX 200mg/m ² day1 4週毎 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|--|-----------|---------------------------------------|--|
| | | | 関節痛、筋肉痛、末梢神経障害 |
| 膀胱癌 (C67) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌 | AADC-0337 | GEM+CBDCA | GEM 1000mg/m ² day1.8 CBDCA 目標AUC=5 day1 3週毎 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、発熱 |
| 膀胱癌 (C67) 根治切除不能な尿路上皮癌の一次治療 | AADC-0360 | Pembrolizumab+Enfortumab Vedotin | Pembrolizumab 200mg/body day1 Enfortumab Vedotin 1.25mg/kg day1.8 3週毎 副作用: 皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患 肝機能障害、Infusion reaction 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、静脈血栓塞栓症 |
| 膀胱癌 (C67) 根治切除不能な尿路上皮癌 | AADC-0377 | Nivolumab+GC | Nivolumab 360mg/body day1 CDDP 70mg/m ² day1 GEM 1000mg/m ² day1,day8 3週毎 最大6コース Nivolumab 480mg/body day1 4週毎 最長2年間 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎 |
| 膀胱癌 (C67) 術前・術後補助療法 | AADC-0385 | Durvalumab+GEM+CDDP (CCr>60ml/min) | Durvalumab 1500mg/body day1 BW≤30kgは20mg/kg CDDP 70mg/m ² day1 GEM 1000mg/m ² day1,day8 術前 3週毎 最大4コース Durvalumab 1500mg/body day1 BW≤30kgは20mg/kg 術後 4週毎 最大8コース 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎 |
| 膀胱癌 (C67) 術前・術後補助療法 | AADC-0386 | Durvalumab+GEM+CDDP (CCr=40-60ml/min) | Durvalumab 1500mg/body day1 BW≤30kgは20mg/kg CDDP 35mg/m ² day1,day8 GEM 1000mg/m ² day1,day8 術前 3週毎 最大4コース Durvalumab 1500mg/body day1 BW≤30kgは20mg/kg 術後 4週毎 最大8コース 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|--|-----------|-----------------------|---|
| 悪性膠芽腫、乏突起神経膠腫 (C71) | AADC-0078 | IFNβ+MCNU+IMRT(IMR療法) | IFNβまたはフェロン 300万単位 5投2休(5週間)、1回/週(6週目以降) |
| | | | サイメリン 1mg/kg 2ヶ月に1回 |
| | | | 放射線照射 |
| | | | 副作用: 発熱、骨髄抑制、蛋白尿、食欲不振、悪心嘔吐 |
| 悪性神経膠腫 (C71) | AADC-0104 | Temodal | テモダール 経口又は点滴静注 |
| | | | 初発)放射線照射との併用 |
| | | | テモゾロミドとして1回75mg/m ² 1日1回連日42日間投与し4週間休薬 |
| | | | その後本剤単独にて、テモゾロミドとして1回150mg/m ² を1日1回連日5日間投与し、23日間休薬。28日間1クール |
| | | | 再発) |
| | | | テモゾロミドとして1回150mg/m ² 1日1回連日5日間投与し23日間休薬 28日間1クール |
| 副作用: 放射線照射との併用 脱毛、悪心・嘔吐、疲労 併用後の単独投与時 疲労、脱毛、悪心・嘔吐、食欲不振、頭痛、便秘 | | | |
| 悪性神経膠腫 (C71) | AADC-0197 | BV+RT/TMZ 療法 | ベバシズマブ 1回10mg/kgを2週間間隔で計4回点滴静注 |
| | | | テモダール 1回75mg/m ² 1日1回連日経口投与 |
| | | | 放射線照射 2Gy/日 週5日 総線量60Gy |
| | | | その後 |
| | | | ベバシズマブ 1回10mg/kgを2週間間隔点滴静注 |
| | | | テモダール 1回150mg~200mg/m ² 1日1回連日5日間経口投与し23日間休薬 28日間1クール |
| | | | その後 |
| 副作用: 脳出血、粘膜皮膚出血、動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、創傷治癒遅延 骨髄抑制、感染症、高血圧、蛋白尿、可逆性後白質脳症症候群、消化管穿孔 うつ血性心不全、疲労、脱毛、悪心・嘔吐、食欲不振、頭痛、便秘 | | | |
| 悪性神経膠腫 (C71) | AADC-0198 | Gliadel | ギリアデル 腫瘍切除腔の大きさや形状に応じて、8枚または適宜減じた枚数を 脳腫瘍切除術時の切除面を被覆するように留置 |
| | | | 副作用: 脳浮腫、発熱、リンパ球数減少、片麻痺、悪心、嘔吐、食欲減退 頭痛、肝機能異常、痙攣、創傷治癒不良、血栓塞栓症 |
| | | | |
| 悪性リンパ腫 (G72) | AADC-0116 | 髄注MTX+PSL療法 | MTX 15mg |
| | | | PSL 20mg |
| | | | 髄液中悪性リンパ腫細胞が陰性化するまで2回/週 繰り返し施行 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、口内炎、下痢、腎機能障害、 |
| 悪性リンパ腫 (G72) | AADC-0118 | high dose MTX | MTX 3.5g/m ² 24時間点滴 |
| | | | LV 15mg/body 静注 |
| | | | LVはMTX終了12時間後から6時間毎に投与 |
| | | | 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、口内炎、下痢、腎機能障害、 肝機能障害、食欲不振 |
| 悪性リンパ腫 (G72) | AADC-0267 | Tirabrutinib | チラブルチニブ 1回480mg(80mgを6錠)1日1回 空腹時経口投与 連日 |
| | | | 副作用: 感染症、皮膚障害、骨髄抑制、過敏症、間質性肺疾患 肝機能障害、出血、下痢、悪心嘔吐 高カリウム血症、高トリグリセリド血症 |
| | | | |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|---------------------------|-----------|---------------------------------|---|
| 甲状腺癌 (C73) | AADC-0160 | Sorafenib | 用法・用量 1回400mg 1日2回 経口投与 適宜増減 副作用: 手足症候群、剥脱性皮膚炎、発疹、脱毛、下痢、高血圧、疲労 食欲不振、そう痒感、体重減少、肝機能障害、出血 間質性肺炎、急性肺障害、高血圧クリーゼ、可逆性後白室脳症 皮膚粘膜眼症候群、消化管穿孔、心筋虚血・心筋梗塞 |
| 甲状腺癌 (C73) | AADC-0222 | Lenvatinib | 用法・用量 1回24mg 1日1回 副作用: 高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労 口内炎、蛋白尿、手掌・足底発赤知覚不全症候群、出 動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔 可逆性後白質脳症症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延 低カルシウム血症 |
| 甲状腺癌 (C73) BRAF遺伝子変異陽性 | AADC-0357 | Encorafenib+Binimetinib | Encorafenib 1回450mg 1日1回経口投与 Binimetinib 1回45mg 1日2回経口投与 副作用: 手足症候群、眼障害、心機能障害、肝障害、横紋筋融解症 高血圧、出血、腫瘍崩壊症候群 |
| 甲状腺癌 (C73) RET遺伝子変異陽性 | AADC-0384 | Selpercatinib | Selpercatinib 1回160mg 1日2回経口投与 副作用: 肝機能障害、QT間隔延長、過敏症、高血圧 間質性肺疾患、骨端離開および骨成長の異常、出血 口内乾燥、下痢、疲労、便秘、悪心、口内炎、腹痛 浮腫、発熱、食欲減退、頭痛、発疹 骨髄抑制、血中クレアチニン増加 |
| 悪性リンパ腫 (G77) 非ホジキンリンパ腫 | AADC-0048 | CHOP療法 | CPA 750mg/m ² day1 DXR 50mg/m ² day1 VCR 1.4mg/m ² day1 PSL 100mg/body day1~5 1クール:3週 副作用: 骨髄抑制、心毒性、末梢神経障害、肝障害、悪心・嘔吐、脱毛、出血性膀胱炎 |
| 悪性リンパ腫 (G77) 非ホジキンリンパ腫 | AADC-0049 | R-CHOP療法 | リツキシマブ [®] 375mg/m ² (CHOP療法の前日) CPA 750mg/m ² day1 DXR 50mg/m ² day1 VCR 1.4mg/m ² day1 PSL 100mg/body day1~5 1クール:3週 副作用: 全身浮腫、呼吸障害、発熱、悪寒、頭痛、血圧上昇、発疹、骨髄抑制、悪心・嘔吐 出血性膀胱炎、心毒性、末梢神経障害、肝障害、脱毛、下肢深部反射減弱・消失、 |
| 悪性リンパ腫 (G77) 非ホジキンリンパ腫 | AADC-0236 | High dose MTX + High dose Ara-C | MTX 200mg/m ² day1 MTX 800mg/m ² 持続 day1 ソル・メルコート 50mg/body day1~3 キロサイト 6000mg/m ² /日 day2~3 1クール:3週 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、口内炎、下痢、腎機能障害、 肝機能障害、食欲不振、間質性肺炎、急性呼吸促迫症候群 中枢神経障害、代謝異常 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|---|
| 原発不明癌 (C80) | AADC-0015 | GEM | GEM 1000 mg/m ² を週1回 3回投与 1週休薬 1000 mg/m ² を2週間に1回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感 |
| 原発不明癌 (C80) | AADC-0225 | Nivolumab | ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション |
| 原発不明癌 (C80) | AADC-0272 | 4週毎 Nivolumab | ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション |
| リンパ性白血病(C91) 再発又は難治性の慢性リンパ性白血病 | AADC-0319 | Acalabrutinib | 用法・用量 1回100mg 1日2回 経口投与 副作用: 下痢、悪心・嘔吐、頭痛 骨髄抑制、感染症、出血 不整脈、虚血性心疾患、間質性肺疾患 腫瘍崩壊症候群、二次性悪性腫瘍 |
| 骨髄異形成症候群 (D46) | AADC-0301 | Azacitidine 皮下注 | アザシチジン 75mg/m ² day1-7 皮下注 21日間休薬 副作用: 骨髄抑制、感染症、出血、腎尿細管アシドーシス、低血圧 食欲不振、便秘、悪心、口内炎、下痢 発疹、掻痒、倦怠感、発熱、注射部位反応、注射部位紅斑 |
| 骨髄異形成症候群 (D46) | AADC-0302 | Azacitidine 点滴静注 | アザシチジン 75mg/m ² day1-7 10分かけて点滴静注 21日間休薬 副作用: 骨髄抑制、感染症、出血、腎尿細管アシドーシス、低血圧 食欲不振、便秘、悪心、口内炎、下痢 発疹、掻痒、倦怠感、発熱 |
| 固形癌 (MSI-High) | AADC-0235 | Pembrolizumab | ペムブロリズマブ 1回200mg 3週間隔 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎 |
| 固形癌 (MSI-High) | AADC-0268 | Pembrolizumab(6週間) | ペムブロリズマブ 1回400mg 6週間隔 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎 |
| 固形癌 (NTRK融合遺伝子陽性) | AADC-0346 | Larotrectinib | ラロレクチニブ 1回 100mg、1日2回、連日経口投与 副作用: 浮動性めまい、頭痛、末梢性感覚ニューロパチー 肝機能障害、骨髄抑制 疲労、筋肉痛、関節痛 |
| 固形癌 (RET融合遺伝子陽性) | AADC-0384 | Selpercatinib | Selpercatinib 1回160mg 1日2回経口投与 副作用: 肝機能障害、QT間隔延長、過敏症、高血圧 |

| がんの部位 (ICD-Oコード) | 承認番号 | レジメン名称 | 用法等 |
|--------------------|-----------|------------------------|--|
| | | | 間質性肺疾患、骨端離開および骨成長の異常、出血 口内乾燥、下痢、疲労、便秘、悪心、口内炎、腹痛 浮腫、発熱、食欲減退、頭痛、発疹 骨髄抑制、血中クレアチニン増加 |
| 固形癌(標準治療終了) | AADC-0264 | Trastuzumab Deruxtecan | Trastuzumab Deruxtec 5.4mg/kg day1 3週ごと 副作用: 間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション 骨髄抑制、脱毛、疲労、悪心・嘔吐、下痢、便秘、口内炎 |
| 小細胞癌 (臓器横断的) | AADC-0023 | CBDCA+ETP療法(CE) | VP-16 80mg/m ² day1~3 CBDCA 目標AUC=5/body day1 3~4週ごと 副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振 |
| フォン・ヒッペル・リンドウ病関連腫瘍 | AADC-0376 | Belzutifan | ベルズチファン 1回 120mg、1日1回、連日経口投与 副作用: 貧血、低酸素症 出血、骨折 |
| | | | |