

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
頭頸部癌 (C00)	AADC-0001	S-1(CG)	用法 a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法 (副作用の軽減を目的) 用量 朝食後および夕食後の1日2回 体表面積 1.25㎡未満 40mg/回 1.25から1.5㎡未満 50mg/回 1.5㎡以上 60mg/回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹、流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、
頭頸部癌 (C00)	AADC-0091	tri-weekly DTX	DTX 60mg/㎡ day1 3週ごと 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害
頭頸部癌 (C00)	AADC-0008	DCF 療法	CDDP 80 mg/㎡ day1 TXT 70mg/㎡ day1 5Fu 800 mg/㎡ day1からday5 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛、食欲不振、全身倦怠感、発熱、
頭頸部癌 (C00)	AADC-0182	Cetuximab + FP	セツキシマブ 初回400 mg/㎡、2回目以降250 mg/㎡ 毎週点滴静注 CDDP 100 mg/㎡ day1 3週に1回 5Fu 1000 mg/㎡/day day1～day4 3週に1回 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、低マグネシウム血症、間質性肺炎、搔痒感、infusion reaction、食欲不振、疲労感、心不全、血栓塞栓症
頭頸部癌 (C00)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症、大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害、腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
頭頸部癌 (C00)	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症、大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害、腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
頭頸部癌 (C00)	AADC-0235	Pembrolizumab	ペムブロリズマブ 1回200mg 3週間隔 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐、口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害、肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害、膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
頭頸部癌 (C00)	AADC-0268	Pembrolizumab(6週間)	ペムブロリズマブ 1回400mg 6週間隔 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐、口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害、肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害、膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
食道癌 (G15)	AADC-0007	CDDP+5-FU 療法(FP)	CDDP 10 mg/body day1からday5 5Fu 500 mg/㎡ day1からday5

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメ名称	用法等
食道癌 (C15)	AADC-0008	DCF 療法	副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛
			CDDP 80 mg/㎡ day1
			TXT 70mg/㎡ day1
			5Fu 800 mg/㎡ day1からday5
食道癌 (C15)	AADC-0105	FP+IMRT療法	副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛、食欲不振、全身倦怠感、発熱、
			5-FU 500 mg/body day1からday5
			CDDP 5 mg/body day1からday5
			トモセラピー 2Gy/body day1からday5 day6,7は休薬 6週連続 (到達目標60Gy)
食道癌 (C15)	AADC-0164	DTX	副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛
			DTX 70mg/㎡ day1
			3週ごと
			副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害
食道癌 (C15)	AADC-0184	IMRT+FP	CDDP 70 mg/㎡ day1
			5Fu 700 mg/㎡ day1からday5
			IMRT 50Gy 25分割
			副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛 食道炎、心嚢水貯留、胸水貯留、肺臓炎
食道癌 (C15)	AADC-0185	FP	化学療法は4週毎に繰り返す
			CDDP 80 mg/㎡ day1
			5Fu 800 mg/㎡ day1からday5
			4週毎
食道癌 (C15)	AADC-0227	PTX(6投2休)	副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛
			PTX 100 mg/㎡ day1,8,15,22,29,36 少なくとも2週休薬
			副作用: 脱毛、発疹、爪の障害、感覚減退、味覚異常、浮動性めまい、疲労
			浮腫、発熱、悪心、嘔吐、下痢、便秘、食欲不振、口内炎、筋痛、関節痛 骨髄抑制、末梢神経障害、間質性肺炎
食道癌 (C15)	AADC-0233	Nedaplatin + 5-FU	Nedaplatin 90 mg/㎡ day1
			5Fu 800 mg/㎡ /day day1からday5
			4週毎
			副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、腎機能障害、口内炎、脱毛、肝機能異常 色素沈着、ショック、アナフィラキシー、電解質異常、間質性肺炎
食道癌 (C15)	AADC-0014	mFOLFOX6療法	L-OHP 85mg/㎡ day1
			5-FU (bolus) 400mg/㎡ day1
			5-FU (infusion) 2400mg/㎡ 46～48hr
			I-LV 200mg/㎡ day1
食道癌 (C15)	AADC-0225	Nivolumab	副作用: 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢 発熱
			ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 (術後補助の場合投与は1年間)
			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
食道癌 (C15) がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発 術前治療でpCRでなかったStage II / IIIの術後補助	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 (術後補助の場合投与は1年間)
			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
術前治療でpCRでなかったStage II/IIIの術後補助			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
食道癌 (C15)	AADC-0298	Pembrolizumab+5-FU+CDDP	ペムブロリズマブ 1回200mg day1 CDDP 80 mg/m ² day1 5FU 800 mg/m ² day1からday5 3週毎 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎 インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感 肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 下垂体機能障害、1型糖尿病 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
食道癌 (C15) 切除可能、局所進行食道扁平上皮癌(cT1N1-3M0,cT2-3N0-3M0) 年齢20歳以上75歳以下mECOG PS 0-1	AADC-0300	DCF療法(術前)	CDDP 70 mg/m ² day1 DTX 70mg/m ² day1 5Fu 750 mg/m ² day1からday5 3週毎に3回施行 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、発熱、
食道癌 (C15)	AADC-0309	Nivolumab+ipilimumab	Nivolumab 240mg/body 2週間隔 Ipilimumab 1mg/kg 6週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球食食症候群、結核
食道癌 (C15)	AADC-0310	Nivolumab+FP	ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 CDDP 80 mg/m ² day1 5Fu 800 mg/m ² day1からday5 4週毎 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎 インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感 肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 下垂体機能障害、1型糖尿病 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
食道癌 (C15) 根治切除不能な進行・再発	AADC-0373	Tislelizumab+FP	Tislelizumab 200mg/body day1 CDDP 80 mg/m ² day1 5FU 800 mg/m ² day1からday5 3週毎 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎 インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感 肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 下垂体機能障害、1型糖尿病 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
食道癌 (C15) がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発	AADC-0374	Tislelizumab	Tislelizumab 200mg/body 3週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
胃癌 (C16)	AADC-0001	S-1(CG)	

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			用法 a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法 (副作用の軽減を目的)
			用量 朝食後および夕食後の1日2回
			体表面積 1.25㎡未満 40mg/回
			1.25から1.5㎡未満 50mg/回
			1.5㎡以上 60mg/回
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、
胃癌 (C16)	AADC-0002	S-1+CDDP 療法	TS-1 3週投与2週休薬 TS-1開始8日目にCDDP60 mg/㎡ 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、
胃癌 (C16)	AADC-0003	PTX	a. 70 mg/㎡を1週に1回 3回投与 1週休薬 b. 80 mg/㎡を2週に1回 もしくは 3週に1回 副作用: 脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害 筋肉痛、関節痛、悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常
胃癌 (C16)	AADC-0006	CPT-11+ CDDP療法 (IP)	CDDP 80 mg/㎡ day1 CPT-11 70 mg/㎡ day1,15 4週毎 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、全身倦怠感 末梢神経障害、脱毛
胃癌 (C16)	AADC-0014	mFOLFOX6療法	L-OHP 85mg/㎡ day1 5-FU (bolus) 400mg/㎡ day1 5-FU (infusion) 2400mg/㎡ 46～48hr l-LV 200mg/㎡ day1 2週ごと 副作用: 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢 発熱
胃癌 (C16)	AADC-0085	CPT-11	CPT-11 150 mg/㎡ 2週に1回 副作用: 下痢、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、骨髄抑制、肝機能障害
胃癌 (C16)	AADC-0101	外来 CPT-11+CDDP療法 (IP)	CDDP 30 mg/㎡ day1,15 CPT-11 60 mg/㎡ day1,15 4週毎 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、全身倦怠感 末梢神経障害、脱毛
胃癌 (C16)	AADC-0122	S-1+DTX 療法	TS-1 2週投与1週休薬 朝食後および夕食後の1日2回 80 mg/㎡/day DTX 40 mg/㎡ day1 3週毎 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、色素沈着、神経障害、脱毛 浮腫、悪心・嘔吐、流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、
胃癌 (C16)	AADC-0134	XELOX 療法	カベシタビン 1日2回 14日間内服7日間休薬 体表面積 1.36㎡未満 1200mg/回 1.36以上1.66㎡未満 1500mg/回 1.66以上1.96㎡未満 1800mg/回 1.96㎡以上 2100mg/回

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			L-OHP 130mg/m ² day1 3週ごと 副作用: 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加 口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着
胃癌(C16)	AADC-0150	tri-weekly Abraxane	アブラキサン 1回 260mg/m ² 3週毎 副作用: 脱毛、疲労、筋痛、末梢神経障害、骨髄抑制、下痢、悪心嘔吐
胃癌(C16)	AADC-0153	tri weekly Trastuzumab + XP療法	トラスツズマブ 8mg/kg day1 (2回目からは6mg/kg) CDDP 80 mg/m ² day1 カペシタビン 1日2回1回1000mg/m ² day1夕からday15朝まで内服その後7日間休薬 3週毎 副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制、下痢、口内炎、色素沈着 手足症候群、血中ビリルビン増加、腎機能障害、脱毛、末梢神経障害
胃癌(C16)	AADC-0154	DCS療法	TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 80 mg/m ² /day day1夕からday15朝まで内服その後14日間休薬 DTX 35 mg/m ² day1, day15 CDDP 35 mg/m ² day1, day15 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、色素沈着、神経障害、脱毛 浮腫、悪心・嘔吐、腎機能障害、下痢
胃癌(C16)	AADC-0179	DTX	DTX 75mg/m ² day1 3週ごと 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害、間質性肺炎
胃癌(C16)	AADC-0213	SOX	L-OHP 130mg/m ² day1 3週ごと TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14 3週ごと 体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回 1.25から1.5m ² 未満 50mg/回 1.5m ² 以上 60mg/回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック
胃癌(C16) 一次治療が無効の治療切除不能胃癌	AADC-0219	RAM療法	RAM 8mg/kg day1 2週ごと 副作用: 腹痛、高血圧、下痢、 動脈血拴塞栓症、静脈血拴塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害 インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血 骨髄抑制、低カリウム血症、低ナトリウム血症
胃癌(C16) 一次治療が無効の治療切除不能胃癌	AADC-0220	PTX+RAM療法	RAM 8mg/kg day1 2週ごと PTX 70mg/m ² day1, 8 2週ごと 副作用: 腹痛、高血圧、下痢、疲労、無力症、末梢性浮腫 口内炎、肝機能障害、呼吸困難、蛋白尿、発疹、皮膚乾燥 動脈血拴塞栓症、静脈血拴塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害 インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血 骨髄抑制、低アルブミン血症、低ナトリウム血症、ざ瘡様皮膚炎 眼瞼浮腫、顔面浮腫、鼻出血
胃癌(C16)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血拴塞栓症、インフュージョンリアクション
胃癌(C16)	AADC-0253	Weekly nab-PTX	nab-PTX 100mg/m ² 週1回投与 3週連続投与1週休薬 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感 脱毛、末梢神経障害、発疹、下痢

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
胃癌 (C16)	AADC-0206	Trifluridine	トリフルリジン
			1回35mg/m ² を1日2回
			5日間連続経口投与した後2日間休薬し、これを2回繰り返した後
			14日間休む
			1コース28日間
			副作用: 骨髄抑制、悪心、食欲減退、疲労、下痢、嘔吐、口内炎、感染症、間質性肺炎
胃癌 (C16)	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ
			480mg/body 4週間隔
			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
胃癌 (C16) HER2陽性切除不能進行再発	AADC-0273	Trastuzumab Deruxtec	Trastuzumab Deruxtec
			6.4mg/kg day1
			3週ごと
			副作用: 間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション
			骨髄抑制、脱毛、疲労、悪心・嘔吐、下痢、便秘、口内炎
胃癌 (C16)	AADC-0295	Nivolumab+CAPOX	ニボルマブ
			360mg/body day1 3週ごと
			カペシタビン
			1日2回 14日間内服7日間休薬
			体表面積 1.36m ² 未満 1200mg/回
			1.36以上1.66m ² 未満 1500mg/回
			1.66以上1.96m ² 未満 1800mg/回
			1.96m ² 以上 2100mg/回
			L-OHP
			130mg/m ² day1 3週ごと
			副作用: 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加
			口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着
			発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
胃癌 (C16)	AADC-0296	Nivolumab+SOX	ニボルマブ
			360mg/body day1 3週ごと
			L-OHP
			130mg/m ² day1 3週ごと
			TS-1
			朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14 3週ごと
			体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回
			1.25から1.5m ² 未満 50mg/回
			1.5m ² 以上 60mg/回
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
			末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック
			発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
胃癌 (C16)	AADC-0297	Nivolumab+mFOLFOX6	ニボルマブ
			240mg/body day1
			L-OHP
			85mg/m ² day1
			5-FU (bolus)
			400mg/m ² day1
			5-FU (infusion)
			2400mg/m ² 46～48hr
			l-LV
			200mg/m ² day1
			2週ごと
			副作用: 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢
			発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
胃癌 (C16)	AADC-0353	Pembrolizumab+CAPOX	ペムブロリズマブ
			200mg/body day1 3週ごと
			カペシタビン
			1日2回 14日間内服7日間休薬
			体表面積 1.36m ² 未満 1200mg/回
			1.36以上1.66m ² 未満 1500mg/回

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			1.66以上1.96㎡未満 1800mg/回
			1.96㎡以上 2100mg/回
		L-OHP	130mg/㎡ day1 3週ごと
		副作用:	手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加
			口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着
			発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
胃癌(C16)	AADC-0354	Zolbetuximab+CAPOX	ゾルベツキシマブ 初回 800mg/㎡ (2回目以降は600mg/㎡) 3週ごと
		カベシタビン	1日2回 14日間内服7日間休薬
		体表面積	1.36㎡未満 1200mg/回
			1.36以上1.66㎡未満 1500mg/回
			1.66以上1.96㎡未満 1800mg/回
			1.96㎡以上 2100mg/回
		L-OHP	130mg/㎡ day1 3週ごと
		副作用:	重度の悪心・嘔吐、過敏症、インフュージョンリアクション
			手足症候群、骨髄抑制、下痢、血中ビリルビン増加
			口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着
胃癌(C16)	AADC-0355	Zolbetuximab+mFOLFOX6	ゾルベツキシマブ 初回 800mg/㎡ (2回目以降は600mg/㎡) 3週ごと
		L-OHP	85mg/㎡ day1
		5-FU (bolus)	400mg/㎡ day1
		5-FU (infusion)	2400mg/㎡ 46~48hr
		I-LV	200mg/㎡ day1
			2週ごと
		副作用:	重度の悪心・嘔吐、過敏症、インフュージョンリアクション
			末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、倦怠感、下痢
			発熱、高血圧
胃癌(C16)	AADC-0370	Pembrolizumab+Trastuzumab+CAPOX	ペムブロリズマブ 200mg/body day1
HER2陽性かつCPS≥1の進行再発胃癌		トラスツマブ	8mg/kg day1 (2回目からは6mg/kg)
		カベシタビン	1日2回 14日間内服7日間休薬
		体表面積	1.36㎡未満 1200mg/回
			1.36以上1.66㎡未満 1500mg/回
			1.66以上1.96㎡未満 1800mg/回
			1.96㎡以上 2100mg/回
		L-OHP	130mg/㎡ day1
		3週ごと	
		副作用:	手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加
			口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着
			発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
胃癌(C16)	AADC-0371	Pembrolizumab+Trastuzumab+FP	ペムブロリズマブ 1回200mg day1
HER2陽性かつCPS≥1の進行再発胃癌		トラスツマブ	8mg/kg (2回目からは6mg/kg) day1
		CDDP	80 mg/㎡ day1
		5FU	800 mg/㎡ day1からday5
		3週毎	
		副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎
			インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症
			甲状腺機能亢進症、全身倦怠感
			肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害
			下垂体機能障害、1型糖尿病
			膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
胃癌 (C16) 根治切除可能臨床病期Ⅱ～ⅣAの胃癌・胃食道接合部癌	AADC-0398	D-FLOT	Durvalumab 1500mg/body 点滴 day1
			L-OHP 85mg/m ² 点滴 day1、15
			DTX 50mg/m ² 点滴 day1、15
			5-FU 2600mg/m ² 24時間持続点滴 day1、15
			l-LV 200mg/m ² 点滴 day1、15
			4週毎 術前1-2サイクル
			術後1-2サイクル
			Durvalumab 1500mg/body 点滴 day1
			4週毎 術後3-12サイクル
			副作用: 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢、脱毛 発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
GIST(C16～C17)	AADC-0009	Glivec	イマチニブ1日1回400mgを食後に投与
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、浮腫、発疹、倦怠感、電解質異常 肝機能障害、血中アルブミン減少
GIST(C16～C17)	AADC-0112	Sutent	スニチニブ1日1回50mg 4週間連続投与2週間休薬
			副作用: 骨髄抑制、皮膚変色、手足症候群、食欲不振、肝機能異常、疲労感 味覚異常、口内炎、下痢、悪心、歯肉炎、代謝異常、浮腫、発熱、高血圧
GIST(C16～C17)	AADC-0316	Pimipib	ピミテスピブ 1日1回 160mg 空腹時 5日間連続経口投与後2日間休薬
			副作用: 下痢、食欲不振、倦怠感、悪心、血清クレアチニン上昇 腎機能低下、夜盲症、貧血
大腸癌 (C18)	AADC-0001	S-1(CG)	用法 a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的)
			用量 朝食後および夕食後の1日2回
			体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回
			1.25から1.5m ² 未満 50mg/回
			1.5m ² 以上 60mg/回
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
大腸癌 (C18)	AADC-0010	UFT(UFTE)	用法・用量 1日量としてテガフル300-600mgを1日2-3回に分割投与
			副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
大腸癌 (C18)	AADC-0011	UFT(UFT-E)/LV療法	UFT-E 300mg/m ² /日 1日3回に分けて
			LV 75mg/日 1日3回に分けて 食間に服用
			4週投与 1週休薬
			副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
大腸癌 (C18)	AADC-0014	mFOLFOX6療法	L-OHP 85mg/m ² day1
			5-FU (bolus) 400mg/m ² day1
			5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46～48hr
			l-LV 200mg/m ² day1
			2週ごと
			副作用: 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢 発熱
大腸癌 (C18)	AADC-0084	FOLFIRI療法	5-FU (bolus) 400mg/m ² day1

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			5-FU (infusion) 2400mg/㎡ 46～48hr
			l-LV 200mg/㎡ day1
			CPT-11 150mg/㎡ day1
			2週ごと
			副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛
大腸癌 (C18)	AADC-0092	Bevacizumab based mFOLFOX6療法	
			ベバシズマブ 1回5mg/kgまたは10mg/kg day1
			L-OHP 85mg/㎡ day1
			5-FU (bolus) 400mg/㎡ day1
			5-FU (infusion) 2400mg/㎡ 46～48hr
			l-LV 200mg/㎡ day1
			2週ごと
			副作用: 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢
			発熱、消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症
			高血圧性クレーゼ
大腸癌 (C18)	AADC-0093	Bevacizumab based FOLFIRI療法	
			ベバシズマブ 1回5mg/kgまたは10mg/kg day1
			5-FU (bolus) 400mg/㎡ day1
			5-FU (infusion) 2400mg/㎡ 46～48hr
			l-LV 200mg/㎡ day1
			CPT-11 150mg/㎡ day1
			2週ごと
			副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛、発熱
			消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症
			高血圧性クレーゼ
大腸癌 (C18)	AADC-0099	5-FU/LV療法	
			5-FU (bolus) 400mg/㎡ day1
			5-FU (infusion) 2400mg/㎡ 46～48hr
			l-LV 200mg/㎡ day1
			2週ごと
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、口内炎、手足症候群、脱毛
			全身倦怠感、肝機能障害、下痢
大腸癌 (C18)	AADC-0102	Xeloda	
			カベシタピン 1日2回 2週連続投与 1週休薬
			体表面積 1.33㎡未満 1500mg/回
			1.33から1.57㎡未満 1800mg/回
			1.57から1.81㎡未満 2100mg/回
			1.81㎡以上 2400mg/回
			副作用: 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加
			口内炎
大腸癌 (C18)	AADC-0107	Bevacizumab based 5-FU/LV療法	
			ベバシズマブ 1回5mg/kgまたは10mg/kg day1
			5-FU (bolus) 400mg/㎡ day1
			5-FU (infusion) 2400mg/㎡ 46～48hr
			l-LV 200mg/㎡ day1
			2週ごと
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、口内炎、手足症候群、脱毛
			全身倦怠感、肝機能障害、下痢、高血圧性クレーゼ
			消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症
大腸癌 (C18)	AADC-0108	UFT/LV+IMRT療法	
			UFT 300mg/㎡/日 1日3回に分けて
			LV 75mg/日 1日3回に分けて 食間に服用
			トモセラピー実施日 day1～5
			トモセラピー 2Gy/day (day1～5まで行い、day6,7は中止)
			4週連続投与 (到達目標40Gy)
			副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
大腸癌 (C18)	AADC-0109	Cetuximab + FOLFIRI 療法	セツキシマブ 初回 400mg/m ² (2回目以降は250mg/m ²) day1 週1回
			CPT-11 150mg/m ² (75歳以上は120mg/m ²) day1 2週ごと
			I-LV 200mg/m ² day1 2週ごと
			5-FU (bolus) 400mg/m ² day1 2週ごと
			5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46~48hr 2週ごと
			副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛、発熱
			さ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、掻痒感、infusion reaction
大腸癌 (C18)	AADC-0110	Cetuximab + CPT-11 療法	セツキシマブ 初回 400mg/m ² (2回目以降は250mg/m ²) day1 週1回
			CPT-11 150mg/m ² (75歳以上は120mg/m ²) day1 2週ごと
			副作用: さ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、掻痒感、infusion reaction、食欲不振、下痢、悪心・嘔吐
			脱毛、疲労感、骨髄抑制
大腸癌 (C18)	AADC-0115	Cetuximab	セツキシマブ 初回 400mg/m ² (2回目以降は250mg/m ²) day1 週1回
			副作用: さ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、掻痒感、infusion reaction、下痢
大腸癌 (C18)	AADC-0134	XELOX 療法	カペシタビン 1日2回 14日間内服7日間休薬
			体表面積 1.36m ² 未満 1200mg/回
			1.36以上1.66m ² 未満 1500mg/回
			1.66以上1.96m ² 未満 1800mg/回
			1.96m ² 以上 2100mg/回
			L-OHP 130mg/m ² day1 3週ごと
			副作用: 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加、口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着
大腸癌 (C18)	AADC-0135	Bevacizumab based XELOX 療法	ベバシズマブ 7.5mg/kg day1 3週ごと
			カペシタビン 1日2回 14日間内服7日間休薬
			体表面積 1.36m ² 未満 1200mg/回
			1.36以上1.66m ² 未満 1500mg/回
			1.66以上1.96m ² 未満 1800mg/回
			1.96m ² 以上 2100mg/回
			L-OHP 130mg/m ² day1 3週ごと
大腸癌 (C18)	AADC-0136	IRIS(大腸)	副作用: 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加、口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着、消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ
			CPT-11 125 mg/m ² 2週ごと
			TS-1 80~120mg/body 2週投与2週休薬
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹、脱毛
			ベバシズマブ 7.5mg/kg day1 3週ごと
			カペシタビン 1日2回 14日間内服7日間休薬
			体表面積 1.36m ² 未満 1200mg/回
大腸癌 (C18)	AADC-0140	Bevacizumab based XELODA 療法	1.36以上1.66m ² 未満 1500mg/回
			1.66以上1.96m ² 未満 1800mg/回
			1.96m ² 以上 2100mg/回
			副作用: 手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加、口内炎、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着、消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ
大腸癌 (C18)	AADC-0146	Panitumumab	

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			パニツムマブ 6mg/kg 点滴静注 2週毎 副作用: infusion reaction、ざ瘡、皮膚乾燥、発疹、掻痒、爪周炎、低マグネシウム血症 疲労、口内炎、食欲不振、下痢、間質性肺疾患
大腸癌 (C18)	AADC-0147	Panitumumab based FORFIRI療法	パニツムマブ 6mg/kg 点滴静注 5-FU (bolus) 400mg/m ² day1 5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46～48hr I-LV 200mg/m ² day1 CPT-11 150mg/m ² (76才以上は120mg/m ²) day1 2週毎 副作用: infusion reaction、ざ瘡、皮膚乾燥、発疹、掻痒、爪周炎、低マグネシウム血症 疲労、口内炎、食欲不振、下痢、間質性肺疾患、悪心・嘔吐、骨髄抑制 肝機能障害、脱毛
大腸癌 (C18)	AADC-0148	Panitumumab based FOLFOX療法	パニツムマブ 6mg/kg 点滴静注 L-OHP 85mg/m ² day1 5-FU (bolus) 400mg/m ² day1 5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46～48hr I-LV 200mg/m ² day1 2週毎 副作用: infusion reaction、ざ瘡、皮膚乾燥、発疹、掻痒、爪周炎、低マグネシウム血症 疲労、口内炎、食欲不振、下痢、間質性肺疾患、発熱 末梢神経障害、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐、倦怠感、
大腸癌 (C18)	AADC-0168	Cetuximab based mFOLFOX6 療法	セツキシマブ 初回 400mg/m ² (2回目以降は250mg/m ²) day1 週1回 L-OHP 85mg/m ² day1 2週ごと 5-FU (bolus) 400mg/m ² day1 2週ごと 5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46～48hr 2週ごと I-LV 200mg/m ² day1 2週ごと 副作用: ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪周炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、食欲不振、下痢、悪心・嘔吐、発熱 脱毛、疲労感、骨髄抑制、末梢神経障害、注射部位反応、
大腸癌 (C18) 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	AADC-0191	Regorafenib	レゴラフェニブ 1日1回160mgを3週間連日経口投与、その後1週間休薬 これを繰り返す 副作用: 手足症候群、TEN、Stevens-Johnson症候群、多形紅斑 肝機能障害、出血、血栓塞栓症、高血圧、高血圧クリーゼ、可逆性後白質脳症 消化管穿孔、下痢、食欲不振、口内炎、悪心・嘔吐、頻脈、発声障害、骨髄抑制 脱毛、掻痒、多汗症
大腸癌 (C18) 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	AADC-0192	BV/SOX	ベバシズマブ 5mg/kg day1 3週ごと L-OHP 130mg/m ² day1 3週ごと TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14 3週ごと 体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回 1.25から1.5m ² 未満 50mg/回 1.5m ² 以上 60mg/回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック、消化管穿孔 創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クリーゼ 可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、間質性肺炎 肝機能障害、脱毛、
大腸癌 (C18)	AADC-0206	Trifluridine	トリフルリジン 1回35mg/m ² を1日2回 5日間連続経口投与した後2日間休薬し、これを2回繰り返した後 14日間休む 1コース28日間 副作用: 骨髄抑制、悪心、食欲減退、疲労、下痢、嘔吐、口内炎、感染症、間質性肺炎

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
大腸癌 (C18)	AADC-0213	SOX	L-OHP 130mg/m ² day1 3週ごと
			TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14 3週ごと
			体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回
			1.25から1.5m ² 未満 50mg/回
			1.5m ² 以上 60mg/回
		副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック
大腸癌 (C18)	AADC-0214	Panitumumab+5-FU/LV	パニツムマブ 6mg/kg day1
			5-FU (bolus) 400mg/m ² day1
			5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46～48hr
			l-LV 200mg/m ² day1
			2週毎
		副作用:	Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、低マグネシウム血症、口内炎 ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎 骨髄抑制、感染症、肝機能障害、手足症候群
大腸癌 (C18)	AADC-0215	Cetuximab+5-FU/LV	セツキシマブ 初回 400mg/m ² (2回目以降は250mg/m ²) day1 週1回
			5-FU (bolus) 400mg/m ² day1 2週ごと
			5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46～48hr 2週ごと
			l-LV 200mg/m ² day1 2週ごと
			2週毎
		副作用:	Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、心不全、血栓塞栓症、口内炎 ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎 骨髄抑制、感染症、肝機能障害、手足症候群、低マグネシウム血症 末梢神経障害
大腸癌 (C18)	AADC-0216	Panitumumab+CPT-11	パニツムマブ 6mg/kg 点滴静注
			CPT-11 150mg/m ² (76才以上は120mg/m ²) day1
			2週毎
			副作用:
			Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、低マグネシウム血症、口内炎 ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎 骨髄抑制、腸管穿孔、消化管出血、腸閉塞、末梢神経障害、脱毛 腎機能障害、血栓塞栓症
大腸癌 (C18)	AADC-0223	bevacizumab+XELOX	ベバシズマブ 7.5mg/kg day1
			CPT-11 200mg/m ² day1
			XELOX 1600mg/m ² /日 day1～14
			3週毎
			副作用:
			infusion reaction、消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、高血圧性脳症 可逆性後白質脳症候群、ネフローゼ症候群、骨髄抑制、感染症 うっ血性心不全、間質性肺炎、神経障害、食欲減退、悪心、口内炎 脱毛、下痢、手足症候群、腎障害、色素沈着
大腸癌 (C18)	AADC-0228	Bevacizumab + FOLFOXIRI	ベバシズマブ 5mg/kg day1
			5-FU (infusion) 3200mg/m ² 46hr
			l-LV 200mg/m ² day1
			L-OHP 85mg/m ² day1
			CPT-11 165mg/m ² day1
		2週毎	
		副作用:	骨髄抑制、下痢、悪心、嘔吐、口内炎、無力症、末梢神経障害 高血圧、静脈血栓塞栓症、アナフィラキシー反応、間質性肺炎 腸管穿孔、創傷治癒遅延、白質脳症
大腸癌 (C18)	AADC-0229	Capecitabine + IMRT	カベシタビン 1日2回 週5日
			体表面積 1.31m ² 未満 900mg/回
			1.31以上1.64m ² 未満 1200mg/回

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			1.64以上 1500mg/回
			トモセラピー 2Gy/day day1-5実施、day6-7中止
			最大50Gy (2Gy×25回 5週間)
			副作用: 骨髄抑制、手足症候群、下痢、悪心・嘔吐、口内炎、腹痛
			疲労、無力症、脱毛、皮膚の発赤、掻痒感
大腸癌 (C18)	AADC-0230	RAM + FOLFIRI	ラムシルマブ 8mg/kg day1
			5-FU (bolus) 400mg/m ² day1
			5-FU (infusion) 2400mg/m ² day1～3
			l-LV 200mg/m ² day1
			CPT-11 150mg/m ² day1
			2週毎
			副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛
			口内炎、鼻出血、高血圧、動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症
			消化管穿孔
大腸癌 (C18)	AADC-0259	bevacizumab+S-1(3週毎)	ベバシズマブ 7.5mg/kg day1 3週ごと
治癒切除不能な進行・再発大腸癌			TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14 3週ごと
			体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回
			1.25から1.5m ² 未満 50mg/回
			1.5m ² 以上 60mg/回
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
			消化管穿孔、肝機能障害
			創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ
			可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、間質性肺炎
大腸癌 (C18)	AADC-0260	bevacizumab+S-1(4週毎)	ベバシズマブ 5mg/kg day1、15
治癒切除不能な進行・再発大腸癌			TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14
			体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回
			1.25から1.5m ² 未満 50mg/回
			1.5m ² 以上 60mg/回
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
			消化管穿孔、肝機能障害
			創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ
			可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、間質性肺炎
大腸癌 (C18)	AADC-0261	bevacizumab+IRIS	ベバシズマブ 5mg/kg day1、15
治癒切除不能な進行・再発大腸癌			CPT-11 150mg/m ² day1、15
			TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14
			体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回
			1.25から1.5m ² 未満 50mg/回
			1.5m ² 以上 60mg/回
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
			末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック、消化管穿孔
			創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ
			可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、間質性肺炎
			肝機能障害、脱毛
大腸癌 (C18)	AADC-0252	Nivolumab+Ipilimumab	Nivolumab 240mg/body
MSI-high			Ipilimumab 1mg/kg
			3週毎4コースまで
			5コースから
			Nivolumab 240mg/body 2週毎 又は 480mg/body 4週毎
			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
			血球貪食症候群、結核

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
大腸癌 (C18) BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	AADC-0284	Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab	Cetuximab	初回 400mg/㎡ (2回目以降は250mg/㎡) を週1回
			Encorafenib	1回300mg 1日1回経口投与
			Binimetinib	1回45mg 1日2回経口投与
			副作用:	さ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、下痢、悪心嘔吐、疲労
				手足症候群、眼障害、心機能障害、肝障害、横紋筋融解症
大腸癌 (C18) BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	AADC-0285	Encorafenib+Cetuximab	Cetuximab	初回 400mg/㎡ (2回目以降は250mg/㎡) を週1回
			Encorafenib	1回300mg 1日1回経口投与
			副作用:	さ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、下痢、悪心嘔吐、疲労
				皮膚悪性腫瘍、手足症候群、眼障害、横紋筋融解症
大腸癌 (C18) Her2陽性大腸癌 RAS野生型	AADC-0303	Pertuzumab+Trastuzumab(Her2陽性大腸癌)	Pertuzumab	初回840mg/body 2回目以降420mg/body day1
			Trastuzumab	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg day1
			3週ごと	
			副作用:	インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感 間質性肺炎、悪心、口内炎
大腸癌 (C18)	AADC-0317	Bevacizumab+Trifluridine	ベバシズマブ	5mg/kg day1, 15
			トリフルリジン	1回35mg/㎡を1日2回
				5日間連続経口投与した後2日間休薬し、これを2回繰り返した後 14日間休む
				1コース28日間
			副作用:	骨髄抑制、悪心、食欲減退、疲労、下痢、嘔吐、口内炎、感染症、間質性肺炎 創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ
大腸癌 (C18)	AADC-0321	bi weekly cetuximab	セツキシマブ	500mg/㎡ day1
			2週毎	
			副作用:	さ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、下痢
大腸癌 (C18)	AADC-0322	bi weekly cetuximab+mFOLFOX6	セツキシマブ	500mg/㎡ day1
			L-OHP	85mg/㎡ day1
			5-FU (bolus)	400mg/㎡ day1
			5-FU (infusion)	2400mg/㎡ 46~48hr
			I-LV	200mg/㎡ day1
			2週毎	
			副作用:	さ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction、食欲不振、下痢、悪心・嘔吐、発熱
				脱毛、疲労感、骨髄抑制、末梢神経障害、注射部位反応、
大腸癌 (C18)	AADC-0323	bi weekly cetuximab+FOLFIRI	セツキシマブ	500mg/㎡ day1
			CPT-11	150mg/㎡ (75歳以上は120mg/㎡) day1
			I-LV	200mg/㎡ day1
			5-FU (bolus)	400mg/㎡ day1
			5-FU (infusion)	2400mg/㎡ 46~48hr
			2週毎	
			副作用:	食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛、発熱
				さ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、infusion reaction
大腸癌 (C18)	AADC-0324	bi weekly cetuximab+5FU+I-LV	セツキシマブ	500mg/㎡ day1
			5-FU (bolus)	400mg/㎡ day1
			5-FU (infusion)	2400mg/㎡ 46~48hr
			I-LV	200mg/㎡ day1

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			2週毎 副作用: Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、心不全、血栓塞栓症、口内炎 ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎 骨髄抑制、感染症、肝機能障害、手足症候群、低マグネシウム血症
大腸癌 (C18)	AADC-0329	Cetuximab+CPT-11 (bi-weekly)	セツキシマブ 500mg/m ² day1 CPT-11 150mg/m ² (76才以上は120mg/m ²) day1
			2週毎 副作用: Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、低マグネシウム血症、口内炎 ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎 骨髄抑制、腸管穿孔、消化管出血、腸閉塞、末梢神経障害、脱毛 腎機能障害、血栓塞栓症
大腸癌 (C18)	AADC-0330	IRIS+bev (TRICOLORE)	ベバシズマブ 7.5mg/kg day1 CPT-11 150mg/m ² day1 TS-1 朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14 体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回 1.25から1.5m ² 未満 50mg/回 1.5m ² 以上 60mg/回
			3週毎 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹 末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック、消化管穿孔 創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ 可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、間質性肺炎 肝機能障害、脱毛
大腸癌 (C18) Her2陽性大腸癌 RAS野生型	AADC-0344	PHESGO	ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として 初回 (IN) それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1 2回目以降 (MA) それぞれ 600mg、600mg、20000U day1 初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与
			3週ごと 副作用: インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感 間質性肺炎、悪心、口内炎
大腸癌 (C18)	AADC-0356	Bevacizumab+mFOLFOXIRI	ベバシズマブ 5mg/kg day1 5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46hr I-LV 200mg/m ² day1 L-OHP 85mg/m ² day1 CPT-11 150mg/m ² day1
			2週毎 副作用: 骨髄抑制、下痢、悪心、嘔吐、口内炎、無力症、末梢神経障害 高血圧、静脈血栓塞栓症、アナフィラキシー反応、間質性肺炎 腸管穿孔、創傷治癒遅延、白質脳症
大腸癌 (C18) がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発大腸癌	AADC-0364	Fruquintinib	フルキンチニブ 1日1回 5mgを3週間連日経口投与、その後1週間休薬 これを繰り返す 副作用: 手足症候群、蛋白尿、創傷治癒遅延、甲状腺機能低下症、動脈解離 肝機能障害、出血、血栓塞栓症、高血圧、高血圧クレーゼ、可逆性後白質脳症 消化管穿孔、下痢、食欲不振、口内炎、悪心・嘔吐、頻脈、発声障害、骨髄抑制
大腸癌 (C18) がん化学療法後に増悪したKRAS G12C変異陽性の 治癒切除不能な進行・再発大腸癌	AADC-0378	Sotorasib+Panitumumab	ソトラシブ 1日1回 960mg (8錠)を連日経口投与 パニツムマブ 6mg/kg 点滴静注 2週毎 副作用: 食欲不振、悪心、嘔吐、下痢 肝機能障害、間質性肺炎 infusion reaction、ざ瘡、皮膚乾燥、発疹、掻痒、爪周炎 疲労、口内炎、低マグネシウム血症
大腸癌 (C18)	AADC-0387	ENCO+Cmab+mFOLFOX6	セツキシマブ 500mg/m ² day1

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌			Encorafenib 1回300mg 1日1回経口投与
			L-OHP 85mg/m ² day1
			5-FU (bolus) 400mg/m ² day1
			5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46～48hr
			l-LV 200mg/m ² day1
			2週毎
			副作用: ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、掻痒感、infusion reaction、食欲不振、下痢、悪心・嘔吐、発熱、脱毛、疲労感、骨髄抑制、末梢神経障害、注射部位反応、皮膚悪性腫瘍、手足症候群、眼障害、横紋筋融解症
大腸癌 (C18) BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	AADC-0388	Bi weekly Encorafenib+Cetuximab	Cetuximab 500mg/m ² 2週毎
			Encorafenib 1回300mg 1日1回経口投与
			副作用: ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、掻痒感、infusion reaction、下痢、悪心嘔吐、疲労、皮膚悪性腫瘍、手足症候群、眼障害、横紋筋融解症
大腸癌 (C18) BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	AADC-0389	Bi weekly Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab	Cetuximab 500mg/m ² 2週毎
			Encorafenib 1回300mg 1日1回経口投与
			Binimetinib 1回45mg 1日2回経口投与
			副作用: ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、掻痒感、infusion reaction、下痢、悪心嘔吐、疲労、手足症候群、眼障害、心機能障害、肝障害、横紋筋融解症
肛門管癌 (C21.1)	AADC-0196	5-FU+MMC+RT	5-FU (infusion) 1000mg/m ² /day day1～4 29～32
			MMC(bolus) 10mg/m ² /day day1,29
			RT 1.8Gy/day 週5回 計33回 総線量 59.4Gy
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、全身倦怠感、体重減少、脱毛、口内炎、出血傾向、溶血性尿毒症症候群、腎障害、間質性肺炎、下痢、色素沈着、肝機能障害、アナフィラキシーショック、白質脳症、うつ血性心不全、手足症候群、食道炎、
肝癌 (C22)	AADC-0017	Epirubicin 肝動注	1日60mg/m ² を動脈内投与
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、脱毛、悪心・嘔吐
肝癌 (C22)	AADC-0141	Miriplitin肝動注	1日1回70mg を肝動脈内投与 (1回120mgを上限)
			繰り返し投与する場合は4週間以上の観察期間をおく
			副作用: 肝機能障害、骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、発熱、投与部位の疼痛、腎機能障害、全身倦怠感
肝癌 (C22)	AADC-0160	Sorafenib	用法・用量 1回400mg 1日2回 経口投与 適宜増減
			副作用: 手足症候群、剥脱性皮膚炎、発疹、脱毛、下痢、高血圧、疲労、食欲不振、そう痒感、体重減少、肝機能障害、出血、間質性肺炎、急性肺障害、高血圧クリーゼ、可逆性後白室脳症、皮膚粘膜眼症候群、消化管穿孔、心筋虚血・心筋梗塞
肝癌 (C22)	AADC-0240	Lenvatinib	用法・用量 体重60kg以上 1日1回12mg経口投与
			体重60kg未満 1日1回8mg経口投与
			副作用: 高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労、口内炎、蛋白尿、手掌・足底発赤知覚不全症候群、出血、動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔、可逆性後白質脳症症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延、低カルシウム血症

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
肝癌 (C22) 切除不能肝細胞癌	AADC-0293	Atezolizumab+Bevacizumab	アテゾリズマブ 1200mg day1
			ベバシズマブ 15mg/kg day1 3週ごと
			副作用: 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢
			間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、脾炎、1型糖尿病
			甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎
			髄膜炎、神経障害
肝癌 (C22) 進行再発肝細胞癌	AADC-0327	Durvalumab+Tremelimumab	消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧
			Durvalumab 1500mg (体重30kg以下の場合は20mg/kg) 4週間隔
			Tremelimumab 300mg (体重30kg以下の場合は4mg/kg) 初回単回のみ
			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
肝癌 (C22) 進行再発肝細胞癌	AADC-0348	Durvalumab	Durvalumab 1500mg/body day1
			体重30kg以下の場合は1回20mg/kg
			4週毎
			副作用: 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病
			肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー
肝癌 (C22) がん化学療法後に増悪した切除不能な肝細胞癌	AADC-0278	Cabozantinib	カボザンチニブ 1回60mg 1日1回空腹時
			副作用: 高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労
			口内炎、蛋白尿、手足症候群、横紋筋融解症
			動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔
			可逆性後白質脳症症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延
			低カルシウム血症
肝癌 (C22) 切除不能肝細胞癌	AADC-0309	Nivolumab+ipilimumab	Nivolumab 80mg/body
			Ipilimumab 3mg/kg
			3週毎 4回投与後、Nivolumab 240mg/bodyを2週毎、又は480mg/bodyを4週毎 で継続
			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
			大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、神経障害
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
胆道癌 (C22～24)	AADC-0001	S-1(CG)	肝機能障害、肝炎、血球食症候群、結核
			用法 a.4週投与 2週休薬法
			b.2週投与 1週休薬法 (副作用の軽減を目的)
			用量 朝食後および夕食後の1日2回
			体表面積 1.25㎡未満 40mg/回
			1.25から1.5㎡未満 50mg/回
胆道癌 (C22～24)	AADC-0015	GEM	1.5㎡以上 60mg/回
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
			GEM 1000 mg/㎡を週1回 3回投与 1週休薬
			1000 mg/㎡を2週間に1回
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感
胆道癌 (C22～24)	AADC-0163	GC療法	
			GEM 1000mg/㎡ day1.8
			CDDP 25mg/㎡ day1.8
			1クール:3週
			副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
胆道癌 (C22～24)	AADC-0320	Durvalumab+GEM+CDDP	Durvalumab	1500mg/body	day1
			GEM	1000mg/m ²	day1.8
			CDDP	25mg/m ²	day1.8
			1クール:3週		
			副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱		
			間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病		
胆道癌 (C22～24)	AADC-0347	GCS	肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー		
			GEM	1000mg/m ²	day1
			CDDP	25mg/m ²	day1
			S-1	80mg/m ²	day1-7
			1クール:2週		
			副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱		
胆道癌 (C22～24)	AADC-0352	Pembrolizumab+GEM+CDDP	下痢、色素沈着、発疹		
			Pembrolizumab	200mg/body	day1
			GEM	1000mg/m ²	day1.8
			CDDP	25mg/m ²	day1.8
			1クール:3週 CDDPは最大8クールまで、以降Pembrolizumab+GEM or Pembrolizumab単剤で継続		
			副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱		
膵癌 (C25)	AADC-0001	S-1(CG)	間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病		
			肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー		
			用法		
			a.4週投与 2週休薬法		
			b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的)		
			用量		
膵癌 (C25)	AADC-0015	GEM	朝食後および夕食後の1日2回		
			体表面積	1.25m ² 未満	40mg/回
				1.25から1.5m ² 未満	50mg/回
				1.5m ² 以上	60mg/回
			GEM		
			1000 mg/m ² を週1回 3回投与 1週休薬		
膵癌 (C25)	AADC-0143	GEM +IMRT療法	1000 mg/m ² を2週間に1回		
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感		
			GEM	1000 mg/m ² を週1回 3回投与 1週休薬	
			放射線照射	1.8Gy×28Fr total50.4Gy	
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感		
			Erlotinib		
膵癌 (C25)	AADC-0159	Erlotinib+GEM療法	100mg/day 連日経口投与		
			GEM	1000 mg/m ² を週1回 3回投与 1週休薬	
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、ざ瘡様皮疹等の発疹、悪心・嘔吐、下痢		
			間質性肺炎		
膵癌 (C25) 治癒切除不能膵癌	AADC-0200	FOLFIRINOX	L-OHP	85mg/m ²	day1
			5-FU (bolus)	400mg/m ²	day1
			5-FU (infusion)	2400mg/m ²	46hr

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			1-LV 200mg/m ² day1
			CPT-11 180mg/m ² day1
			2週ごと
			副作用: 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐、倦怠感、下痢
			発熱、脱毛、肝機能障害
肺癌 (C25)	AADC-0212	GEM+nab-PTX	GEM 1000mg/m ² day1
治癒切除不能肺癌			nab-PTX 125mg/m ² day1
			3週投与1週休薬
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感
			脱毛、末梢神経障害、発疹、下痢
肺癌 (C25)	AADC-0248	Olaparib	オラパリブ 1回300mgを1日2回経口投与
BRCA遺伝子変異陽性、プラチナ製剤を含む化学療法後に疾患進行が認められていない肺癌			副作用: 悪心、嘔吐、味覚異常
			貧血、好中球減少、血小板減少、リンパ球減少
			疲労、無力症、間質性肺炎
			下痢、頭痛
肺癌 (C25)	AADC-0256	GEM+S-1(肺癌NAC)	GEM 1000 mg/m ² day1.day8 30分かけて点滴静注
切除可能肺癌術前			S-1 体表面積毎(80mg～120mg) 14日間 分2で内服
			(day1の夕方からday15の朝まで)
			これを2コース繰り返す。
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感
			下痢、口内炎、色素沈着、発疹
肺癌 (C25)	AADC-0318	NaI-IRI+5FU/LV	Liposomal Irinotecan 70mg/m ² day1
治癒切除不能肺癌			5-FU (infusion) 2400mg/m ² day1～3
			1-LV 200mg/m ² day1
			2週毎
			副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、肝機能障害、脱毛
			倦怠感、好中球減少、貧血、低カリウム血症
肺癌 (C25)	AADC-0014	mFOLFOX6療法	L-OHP 85mg/m ² day1
治癒切除不能肺癌			5-FU (bolus) 400mg/m ² day1
			5-FU (infusion) 2400mg/m ² 46hr
			1-LV 200mg/m ² day1
			2週ごと
			副作用: 末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐、倦怠感、下痢
			発熱、肝機能障害
膵内分泌腫瘍 (C25.4)	AADC-0169	Everolimus	Everolimus 10mg/day 連日経口投与
			副作用: 口内炎、発疹、下痢、疲労、末梢性浮腫、悪心・嘔吐、食欲不振
			鼻出血、貧血、味覚障害、体重減少、頭痛、掻痒症、高血糖
			血小板減少、無力症、間質性肺炎、腎不全、アナフィラキシー様症状
			急性呼吸窮迫症候群、肺塞栓症、深部静脈血栓症、好中球減少
			悪性腫瘍(二次発癌)、皮膚乾燥、爪の障害、心嚢液貯留
			進行性多巣性白室脳症、BKウィルス腎症、細胞蛋白症
消化管神経内分泌腫瘍 (C26.9)	AADC-0188	サントスタチンLAR	サントスタチンLAR 1回30mgを4週毎に臀部筋肉内に注射
			副作用: 注射部位硬結、注射部位疼痛、胆石症、下痢
膵・消化管神経内分泌腫瘍 (C25.4、C26.9)	AADC-0257	Lanreotide	Lanreotide 1回120mgを4週毎に深部皮下内に注射
			副作用: 注射部位硬結、注射部位疼痛、徐脈

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			胆石症、下痢、白色便
膵・消化管神経内分泌腫瘍 (C25.4、C26.9)	AADC-0277	Streptozocin	Streptozocin 1000 mg/m ² 1週間毎 30分かけて点滴静注 副作用: 腎障害、骨髄抑制、耐糖能異常、肝障害 血管痛、悪心、便秘、味覚異常、倦怠感
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0001	S-1(CG)	用法 a.4週投与 2週休薬法 b.2週投与 1週休薬法 (副作用の軽減を目的) 用量 朝食後および夕食後の1日2回 体表面積 1.25m ² 未満 40mg/回 1.25から1.5m ² 未満 50 mg/回 1.5m ² 以上 60mg/回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0010	UFT(UFTE)	用法・用量 1日量としてテガフル300-600mgを1日2-3回に分割投与 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0015	GEM	GEM 1000 mg/m ² を週1回 3回投与 1週休薬 1000 mg/m ² を2週間に1回 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0019	PTX + CBDCA療法(TC)	PTX 200mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 3週ごと 副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0020	DTX + CDDP療法(DC)	DTX 60mg/m ² day1 CDDP 80mg/m ² day1 3~4週ごと 副作用: 悪心・嘔吐、腎機能障害、神経毒性、聴覚障害、電解質異常、浮腫、倦怠感、味覚異常、爪の変形、骨髄抑制、脱毛
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0022	Iressa	250mgを1日1回経口投与 副作用: 下痢、皮膚乾燥症、ニキビ様皮疹、肝機能障害、間質性肺炎
肺癌 (C34) 非細胞肺癌	AADC-0025	CPT-11	CPT-11 100mg/m ² day1.8.15 1週間隔で3回投与、1週休薬 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、間質性肺炎
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0091	tri-weekly DTX	DTX 60mg/m ² day1 3週ごと 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0098	CPT-11+CDDP療法(IP)	CDDP 80mg/m ² day1 CPT-11 60mg/m ² day1.8.15 4週ごと 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、倦怠感、腎機能障害、下痢、間質性肺炎、食欲不振

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	<i>AADC-0106</i>	<i>Tarceva</i>	末梢神経障害、脱毛、 エルロチニブ 150mg 1日1回経口投与 副作用: 発疹、下痢、皮膚乾燥、掻痒感、間質性肺疾患、肝機能障害
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	<i>AADC-0111</i>	<i>VNR</i>	ビノレルビン 25mg/m ² day1.8 3週ごと(4クール以上、最大6クール)
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	<i>AADC-0114</i>	<i>Pemetrexed+ CDDP療法</i>	Pemetrexed 500mg/m ² day1 CDDP 75mg/m ² day1 3週毎 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、倦怠感、口内炎、神経障害
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	<i>AADC-0119</i>	<i>CDDP+VNR+IMRT療法</i>	CDDP 80mg/m ² day1 VNR 20mg/m ² day1、8 3週ごと 4コース 放射線療法 2Gy/日 5回/週 計6週30回60Gy (化学療法1コース目のday3から開始 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、間質性肺炎、食欲不振、口内炎、倦怠感 腎機能障害
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	<i>AADC-0149</i>	<i>Bevacizumab based TC療法</i>	PTX 200mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 ベバシズマブ 15mg/kg day1 3週ごと CBDCA+PTX+ベバシズマブを3週間間隔で4〜6サイクル実施後、アバスチン単独を 3週間間隔で投与する 副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、 肝機能障害、高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、喀血、肺出血、血栓塞栓症
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	<i>AADC-0151</i>	<i>CDDP+VNR療法</i>	CDDP 80mg/m ² day1 VNR 25mg/m ² day1、8 3週ごと 4コース 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、間質性肺炎、食欲不振、口内炎、倦怠感 腎機能障害
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	<i>AADC-0170</i>	<i>Pemetrexed</i>	Pemetrexed 500mg/m ² day1 3週毎 4コース 副作用: 肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	<i>AADC-0180</i>	<i>CBDCA+Pemetrexed</i>	Pemetrexed 500mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 3週毎 4コース 副作用: 肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり
肺癌 (C34) ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行再発非小細胞肺癌 ROS1融合遺伝子陽性の切除不能な進行再発非小細胞肺癌	<i>AADC-0176</i>	<i>Crizotinib</i>	Crizotinib 1回250mg1日2回内服 副作用: 悪心・嘔吐、視力障害、下痢、便秘、末梢性浮腫、間質性肺炎 肝機能障害、QT間隔延長、骨髄抑制
肺癌 (C34) 進行性非扁平非小細胞肺癌	<i>AADC-0181</i>	<i>PEM+CBDCA+BV followed by PEM+BV</i>	Pemetrexed 500mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 ベバシズマブ 15mg/kg day1 3〜4週毎4コース後 CR、PR、SDなら維持療法へ

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			維持療法
			Pemetrexed 500mg/m ² day1
			ペバシズマブ 15mg/kg day1
			3週 毎PDになるまで継続
			副作用: 肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感
			下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり
			高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、喀血、肺出血、血栓塞栓症
肺癌 (C34)	AADC-0186	CBDCA+S-1療法	
非小細胞肺癌			CBDCA 目標AUC=5 day1
			TS-1 80～120mg/body day1～14
			3週 毎
			副作用 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
			神経障害、関節痛、脱毛
肺癌 (C34)	AADC-0189	IMRT+CBDCA	
非小細胞肺癌			CBDCA 30mg/m ² day1～day5
			IMRT 2Gy/日 day1～day5
			1週 毎
			CBDCAは4週間実施、IMRTは6週間実施
			副作用: 嘔気・嘔吐、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、発熱、骨髄抑制、肝機能障害
			アナフィラキシー様症状、間質性肺炎、急性腎不全、肝不全、
			消化管壊死、消化管出血、出血性腸炎、偽膜性大腸炎、麻痺性イレウス
			脳梗塞、肺梗塞、血栓・塞栓症、心筋梗塞、うっ血性心不全、溶血性尿毒症症候群
			急性呼吸窮迫症候群、DIC、急性膵炎、難聴、皮膚炎、放射線肺炎、放射線食道炎
			脊髄症
肺癌 (C34)	AADC-0194	nab-paclitaxel + Carboplatin	
非小細胞肺癌			アブラキサン 100mg/m ² day1, 8, 15
			CBDCA 目標AUC=6/body day1
			4週 毎
			副作用: 脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹
			食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、脳神経麻痺、アナフィラキシー
			間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全
			難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群
			急性腎不全、白質脳症、
肺癌 (C34)	AADC-0201	AVAPERL	
非小細胞肺癌			Pemetrexed 500mg/m ² day1
			CDDP 75mg/m ² day1
			ペバシズマブ 7.5mg/kg day1
			3週 毎4コース後 SDもしくはresponse(+)なら維持療法へ
			維持療法
			Pemetrexed 500mg/m ² day1
			ペバシズマブ 7.5mg/kg day1
			3週 毎PDになるまで継続
			副作用: 腎機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感
			下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり
			高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、喀血、肺出血、血栓塞栓症
肺癌 (C34)	AADC-0202	S-1+CDDP+RT	
局所進行非小細胞肺癌			CDDP 60mg/m ² day1
			TS-1 1回40mg/m ² 1日2回 day1～14
			4週 毎2コース施行中に放射線治療施行
			1回2Gy 週5日 30回照射 計60Gy(6週間)
			上記化学放射線療法終了後2週間後から
			CDDP 60mg/m ² day1
			TS-1 1回40mg/m ² 1日2回 day1～14
			4週 毎2コース施行

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
肺癌 (C34) EGFR遺伝子変異陽性の手術不能または再発 非小細胞肺癌	AADC-0204	Afatinib	Afatinib 1日1回40mg経口投与 患者の状態により適宜増減 1日50mgまで 副作用: 下痢、発疹、爪囲炎、口内炎、間質性肺炎、皮膚障害、肝機能障害 鼻出血、食欲減退、疲労、粘膜の炎症、体重減少、味覚異常 結膜炎、心障害
肺癌 (C34) 小細胞肺癌	AADC-0010	UFT(UFTE)	用法・用量 1日量としてテガフル300-600mgを1日2-3回に分割投与 副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
肺癌 (C34) 小細胞肺癌	AADC-0023	CBDCA+ETP療法(CE)	VP-16 80mg/m ² day1~3 CBDCA 目標AUC=5/body day1 3~4週ごと
			副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振
肺癌 (C34) 小細胞肺癌	AADC-0024	CPT-11+ CDDP療法(IP)	CDDP 60mg/m ² day1 CPT-11 60mg/m ² day1.8.15 4週ごと 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、倦怠感、腎機能障害、下痢、間質性肺炎、食欲不振 末梢神経障害、脱毛、
肺癌 (C34) 小細胞肺癌	AADC-0025	CPT-11	CPT-11 100mg/m ² day1.8.15 1週間隔で3回投与、2週休薬 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、間質性肺炎
肺癌 (C34) 小細胞肺癌	AADC-0100	PE(CDDP+ETP)+IMRT療法	CDDP 80mg/m ² day1 VP-16 100mg/m ² day1~3 3~4週ごと 4コース 副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振
肺癌 (C34)	AADC-0137	AMR	AMR 35~40mg/m ² 3日間連続投与 3週ごと 3~6コース 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、脱毛、肝機能障害、発熱
肺癌 (C34)	AADC-0145	GC療法	GEM 1000mg/m ² day1.8 CDDP 80mg/m ² day1 3週毎 4~6コース 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱
肺癌 (C34) ALK陽性・ROS1陽性肺癌	AADC-0176	Crizotinib	クリゾチニブ 1回250mgを1日2回経口投与 副作用: 間質性肺疾患、肝機能障害、QT間隔延長、徐脈 血液障害、心不全、発疹、便秘、口内炎、悪心 腎機能障害、倦怠感、筋肉痛、光線過敏性
肺癌 (C34) CPT-11が使用できない進展型小細胞肺癌	AADC-0177	CDDP+ VP-16	CDDP 80mg/m ² day1 VP-16 100mg/m ² day1~3 副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振
肺癌 (C34)	AADC-0210	Alectinib	アレクチニブ 1回300mg1日2回経口投与 副作用: 間質性肺疾患、肝機能障害、骨髄抑制、消化管穿孔 血栓塞栓症、味覚異常、発疹、便秘、口内炎、悪心 腎機能障害、倦怠感、筋肉痛、光線過敏性

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
肺癌 (C34) EGFR遺伝子変異陽性肺癌	AADC-0211	Erlotinib+Bevacizumab併用療法	ベバシズマブ 15mg/kg 3週間毎
			エルロチニブ 100～150mg 1日1回経口投与
			副作用: 発疹、下痢、皮膚乾燥、掻痒感、肝機能障害、神経毒性、食欲減退
			口内炎、嘔吐、高血圧、脱毛、関節痛、疲労、倦怠感、卵巣機能不全
			重大な副作用: ショック、アナフィラキシー、消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血
肺癌 (C34)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ 240mg/body 2週間隔
			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
肺癌 (C34)	AADC-0231	Osimertinib	タグリッソ 1日1回80mg
			副作用: 発疹、ざ瘡、下痢、皮膚乾燥、爪の障害、間質性肺炎、QT間隔延長
			骨髄抑制、肝機能障害
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0232	RAM+DTX	RAM 10mg/kg day1 3週ごと
			DTX 60mg/m ² day1 3週ごと
			副作用: 腹痛、高血圧、下痢、
			動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害
			インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血
肺癌 (C34) PD-L1陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	AADC-0235	Pembrolizumab	ペムブロリズマブ 1回200mg 3週間隔
			副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症
			甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐
			口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害
			肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害
肺癌 (C34)	AADC-0237	Ceritinib	セリチニブ 1日1回750mg空腹時に経口投与
			副作用: 間質性肺炎、肝機能障害、QT間隔延長、徐脈、下痢
			高血糖、眼障害、皮下組織障害、胃腸障害、疲労
			腎及び尿路障害
肺癌 (C34) 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	AADC-0241	Atezolizumab	アテゾリズマブ 1200mg day1 3週ごと
			副作用: 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢
			間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、肺炎、1型糖尿病
			甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎
			髄膜炎、神経障害
肺癌 (C34)	AADC-0243	Lorlatinib	ロルラチニブ 1日1回100mgを経口投与
			副作用: 間質性肺炎、肝機能障害、QT間隔延長、徐脈、下痢
			肺炎、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症
			末梢性ニューロパチー
肺癌 (C34) 進行性非扁平上皮非小細胞肺癌	AADC-0245	CBDCA+PEM+Pembrolizumab→PEM+Pembrolizumab	Pemetrexed 500mg/m ² day1
			CBDCA 目標AUC=5 day1

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎4コース後 維持療法へ 維持療法
			Pemetrexed 500mg/m ² day1 Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎 副作用: 肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
肺癌 (C34) 扁平上皮癌	AADC-0246	CBDCA+nab-PTX+Pembrolizumab→Pembrolizumab	アブラキサシ 100mg/m ² day1, 8, 15 CBDCA 目標AUC=6/body day1 Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎4コース後 維持療法へ 維持療法 Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎 副作用: 脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹 食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー 間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
肺癌 (C34) 非扁平上皮非小細胞肺癌	AADC-0247	CBDCA+PTX+Bevacizumab+Atezolizumab→Bevacizumab+Atezolizumab維持療法	PTX 200mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 ベバシズマブ 15mg/kg day1 アテゾリズマブ 1200mg/body day1 3週毎4-6コース後 維持療法へ 維持療法 ベバシズマブ 15mg/kg day1 アテゾリズマブ 1200mg/body day1 3週毎 副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、悪心・嘔吐 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害
肺癌 (C34) 小細胞肺癌	AADC-0254	CBDCA+VP-16+Atezolizumab t/b Atezolizumab	VP-16 100mg/m ² day1~3 CBDCA 目標AUC=5 day1 アテゾリズマブ 1200mg/body day1 3週毎4コース後 維持療法へ 維持療法 アテゾリズマブ 1200mg/body day1 3週毎 副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
肺癌 (C34) 進行性非扁平上皮非小細胞肺癌	AADC-0262	CBDCA+PEM+Atezolizumab→PEM+Atezolizumab	Pemetrexed 500mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 Atezolizumab 1200mg/body day1 3週毎4-6コース後 維持療法へ 維持療法 Pemetrexed 500mg/m ² day1 Atezolizumab 1200mg/body day1 3週毎 副作用: 肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
肺癌 (C34) HER2遺伝子変異陽性 非小細胞肺癌	AADC-0264	Trastuzumab Deruxtec	Trastuzumab Deruxtec: 5.4mg/kg day1 3週ごと 副作用: 間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション 骨髄抑制、脱毛、疲労、悪心・嘔吐、下痢、便秘、口内炎
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0268	Pembrolizumab(6週間)	ペムブロリズマブ 1回400mg 6週間隔 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
肺癌 (C34) 小細胞肺癌	AADC-0270	CDDP+VP-16+Durvalumab→維持療法Durvalumab	VP-16 80-100mg/m ² day1～3 CDDP 75-80mg/m ² day1 Durvalumab 1500mg/body day1 3週毎4コース後 維持療法へ 維持療法 Durvalumab 1500mg/body day1 4週毎 副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振 腎機能障害、疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害
肺癌 (C34) 小細胞肺癌	AADC-0271	CBDCA+VP-16+Durvalumab→維持療法Durvalumab	VP-16 80-100mg/m ² day1～3 CBDCA 目標AUC=5-6 day1 Durvalumab 1500mg/body day1 3週毎4コース後 維持療法へ 維持療法 Durvalumab 1500mg/body day1 4週毎 副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害
肺癌 (C34) 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0274	Ipilimumab+Nivolumab	Ipilimumab 1mg/kg 6週間隔 Nivolumab 360mg/body 3週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球食食症候群、結核
肺癌 (C34) 小細胞肺癌	AADC-0275	Nogitecan	Nogitecan 1mg/m ² 5日間連続投与 3週ごと 副作用: 骨髄抑制、消化管出血、間質性肺炎、血栓塞栓症 悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、発熱、易疲労感
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 (前治療2レジメン以内)	AADC-0276	nab-PTX単剤	nab-PTX 100mg/m ² day1,8,15 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感 脱毛、末梢神経障害、発疹、下痢
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0279	Ipilimumab+Nivolumab+PEM+CDDP	Ipilimumab 1mg/kg 6週間隔 Nivolumab 360mg/body 3週間隔 Pemetrexed 500mg/m ² 3週間隔 CDDP 75mg/m ² 3週間隔 ★CDDP+Pemetrexedは2コースで終了 ★維持療法はNivolumab (±Pemetrexed)を3週毎+Ipilimumab6週毎 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球食食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0280	Ipilimumab+Nivolumab+PEM+CBDCA	Ipilimumab 1mg/kg 6週間隔 Nivolumab 360mg/body 3週間隔 Pemetrexed 500mg/m ² 3週間隔 CBDCA 目標AUC=6 3週間隔 ★CBDCA+Pemetrexedは2コースで終了 ★維持療法はNivolumab (±Pemetrexed)を3週毎+Ipilimumab6週毎 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球食食症候群、結核 発疹、骨髄抑制、悪心、下痢、味覚異常、便秘、しゃっくり
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌	AADC-0281	Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX	Ipilimumab 1mg/kg 6週間隔 Nivolumab 360mg/body 3週間隔 PTX 200mg/m ² 3週間隔 CBDCA 目標AUC=6 3週間隔 ★CBDCA+PTXは2コースで終了 ★維持療法はNivolumabを3週毎+Ipilimumab6週毎 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球食食症候群、結核 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、悪心・嘔吐

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
肺癌 (C34) 扁平上皮癌	AADC-0282	Necttimumab+GEM+CDDP	Necitumumab 800mg day1.8
			GEM 1250mg/m ² day1.8
			CDDP 75mg/m ² day1
			3週毎
			★CDDP+GEMは最大6コース
			★維持療法はNecitumumab単剤でPDまで継続
			副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱、 ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、低マグネシウム血症、 掻痒感、インフュージョンリアクション、下痢
肺癌 (C34)	AADC-0299	CBDCA+PTX+Pembrolizumab	CBDCA 目標AUC=6/body day1
			PTX 200mg/m ² day1
			Pembrolizumab 200mg/body day1
			3週毎4コース後 維持療法へ
			維持療法
			Pembrolizumab 200mg/body day1
			3週毎
			副作用: 脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹、 食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー、 間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うつ血性心不全、 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群、 急性腎不全、白質脳症、 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病、 肺炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
肺癌 (C34) EGFR遺伝子変異陽性肺癌	AADC-0304	Erlotinib+Ramucirumab	ラムシルマブ 10mg/kg 2週間毎
			エルロチニブ 150mg 1日1回 空腹時 連日経口投与
			副作用: 高血圧、動脈血拴塞栓症、静脈血拴塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害、 インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血、 発疹、下痢、皮膚乾燥、掻痒感、間質性肺疾患、肝機能障害
肺癌 (C34) EGFR遺伝子変異陽性肺癌	AADC-0305	Gefitinib+Ramucirumab	ラムシルマブ 10mg/kg 2週間毎
			ゲフィチニブ 250mg 1日1回 連日経口投与
			副作用: 高血圧、動脈血拴塞栓症、静脈血拴塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害、 インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血、 発疹、下痢、皮膚乾燥、掻痒感、間質性肺疾患、肝機能障害
肺癌 (C34) BRAF遺伝子変異陽性肺癌	AADC-0306	Dabrafenib+Trametinib	ダブラフェニブ 1回150mg 1日2回 空腹時連日経口投与
			トラメチニブ 1回2mg 1日1回 空腹時連日経口投与
			副作用: 発熱、肝機能障害、眼障害、心障害、 静脈血拴塞栓症、脳血管障害、 有棘細胞癌、横紋筋融解症、間質性肺疾患
肺癌 (C34) 局所進行非小細胞肺癌	AADC-0307	CBDCA+PTX+RT	PTX 40mg/m ² day1
			CBDCA 目標AUC=2 day1
			毎週投与 計6回(放射線療法を行っている間)
			副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、 肝機能障害
肺癌 (C34) 非小細胞肺癌 非扁平上皮癌	AADC-0315	Atezolizumab+nab-PTX+CBDCA→Atezolizumab	アブレキササン 100mg/m ² day1, 8, 15
			CBDCA 目標AUC=6/body day1
			Atezolizumab 1200mg/body day1
			3週毎4コース後 維持療法へ
			維持療法 Atezolizumab 1200mg/body day1

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
			3週毎	
			副作用:	脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹
				食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー
				間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うつ血性心不全
				難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群
				急性腎不全、白質脳症、
				大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病
				肺炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
肺癌(C34) ALK陽性肺癌	AADC-0325	Brigatinib	ブリグチニブ	1日1回90mgを7日間経口投与後、1日1回180mgを経口投与 (14日以上休薬した場合は90mgにて再開)
			副作用:	間質性肺疾患、高血圧、徐脈、高血糖
				視覚障害、CK上昇、リパーゼorアミラーゼ上昇(膵炎)
				下痢、悪心、肝機能障害、口内炎、発疹
肺癌(C34) KRAS G12C変異陽性肺癌	AADC-0328	Sotorasib	ソトラニブ	1日1回 960mg(8錠)を連日経口投与
			副作用:	食欲不振、悪心、嘔吐、下痢
				肝機能障害、間質性肺疾患
肺癌(C34) ROS1融合遺伝子陽性肺癌	AADC-0331	Entrectinib	エヌトレクチニブ	1日1回 600mg(3Cap)を連日経口投与
			副作用:	心臓障害、QT延長、認知障害・運動失調
				間質性肺疾患、失神、成長発達遅延
				味覚異常、浮動性めまい、末梢感覚ニューロパシー
肺癌(C34) 非小細胞肺癌	AADC-0332	Tremelimumab+durvalumab+PEM+CBDCA	Tremelimumab	75mg/body day1
			Durvalumab	1500mg/body day1
			Pemetrexed	500mg/m ² day1
			CBDCA	目標AUC=6 day1
			3週毎	CBDCAは4コースで終了
				維持療法は4週毎にPemetrexed+Durvalumab
				★維持療法の2回目のみ Pemetrexed+Durvalumab+Tremelimumab
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
				血球貪食症候群、結核
				発疹、骨髄抑制、悪心、下痢、味覚異常、便秘、しゃっくり
肺癌(C34) 非小細胞肺癌	AADC-0333	Tremelimumab+durvalumab+nab-PTX+CBDCA	Tremelimumab	75mg/body day1
			Durvalumab	1500mg/body day1
			nab-PTX	100mg/m ² day1、8、15
			CBDCA	目標AUC=6 day1
			3週毎	CBDCA+nab-PTXは4コースで終了
				維持療法は4週毎にDurvalumab
				★維持療法の2回目のみ Durvalumab+Tremelimumab
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
				血球貪食症候群、結核
				脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、悪心・嘔吐
肺癌(C34) 術前 StageⅢA(StageⅡでも症例によって考慮)	AADC-0334	Nivolumab+PTX+CBDCA(術前のみ)	Nivolumab	360mg/body day1
			CBDCA	目標AUC=5 or 6 day1
			PTX	175mg/m ² day1
			3週毎 最大3コース	
			副作用:	脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹
				食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うつ血性心不全 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 肺炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
肺癌 (C34) 肺腺癌術前 Stage III A (Stage II でも症例によって考慮)	AADC-0335	Nivolumab+CDDP+PEM(術前のみ)	Nivolumab 360mg/body day1 Pemetrexed 500mg/m ² day1 CDDP 75mg/m ² day1 3週毎 最大3コース 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎
肺癌 (C34) 切除可能非小細胞肺癌	AADC-0338	Nivolumab+GEM+CDDP(術前のみ)	Nivolumab 360mg/body day1 CDDP 75mg/m ² day1 GEM 1000mg/m ² day1,day8 3週毎 最大3コース 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎
肺癌 (C34) 切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における 根治的化学放射線療法後の維持療法 投与期間は12ヶ月まで	AADC-0345	Durvalumab	Durvalumab 1500mg/body day1 体重30kg以下の場合は1回20mg/kg 4週毎 副作用: 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー
肺癌 (C34) METエクソン14スキッピング変異陽性 切除不能な進行・再発非小細胞性肺癌	AADC-0350	Capmatinib	カプマチニブ 1日2回 1回400mg を連日経口投与 副作用: 間質性肺疾患、体液貯留、肝機能障害、腎機能障害 悪心・嘔吐、下痢、リバーゼ増加、疲労 低リン酸血症、発疹、便秘、血中ビリルビン増加
肺癌 (C34) EGFR変異陽性肺癌	AADC-0359	Osimertinib+PEM+CDDP	Osimertinib 1日1回80mg を連日経口投与 CDDP 75mg/m ² day1 Pemetrexed 500mg/m ² day1 3週毎 CDDP併用は最大4コース 維持療法はPEM 500mg/m ² day1 3週毎 + Osimertinib 80mg 連日 副作用: 悪心・嘔吐、下痢、便秘、食欲不振、口内炎 皮疹、皮膚乾燥、浮腫 貧血、好中球減少、血小板減少
肺癌 (C34) 肺扁平上皮癌(周術期)	AADC-0361	Pembrolizumab+GEM+CDDP	Pembrolizumab 200mg/body day1 CDDP 75mg/m ² day1 GEM 1000mg/m ² day1,day8 (術前) 3週毎 最大4コース Pembrolizumab 200 or 400mg/body day1 (術後) 200mg 3週毎 もしくは 400mg6週毎 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			血球貪食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎
肺癌 (C34) 非扁平上皮非小細胞肺癌 (周術期)	AADC-0362	Pembrolizumab+PEM+CDDP	Pembrolizumab 200mg/body day1 Pemetrexed 500mg/m ² day1 CDDP 75mg/m ² day1 (術前) 3週毎 最大4コース Pembrolizumab 200 or 400mg/body day1 (術後) 200mg 3週毎 もしくは 400mg6週毎 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎
肺癌 (C34) 白金製剤を含む化学療法後に増悪した小細胞肺癌	AADC-0366	Tarlatamab	Tarlatamab 1mg day1 10mg day8 10mg day15 以降 2週毎 副作用: サイトカイン放出症候群 (CRS) 免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群 (ICANS) を含む神経学的事象 骨髄抑制、間質性肺疾患、食欲不振、味覚異常
肺癌 (C34) 限局型小細胞肺癌における 根治的化学放射線療法後の維持療法 投与期間は24ヶ月まで	AADC-0368	Durvalumab	Durvalumab 1500mg/body day1 体重30kg以下の場合は1回20mg/kg 4週毎 副作用: 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー
肺癌 (C34) EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 EGFR遺伝子変異陽性の 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	AADC-0369	Amivantamab+CBDCA+PEM	Amivantamab 80kg未満 80kg以上 350mg/body 350mg/body day1 1050mg/body 1400mg/body day2 1400mg/body 1750mg/body day8、day15 1400mg/body 1750mg/body day1 (2サイクル目) 1750mg/body 2100mg/body day1 (3サイクル目以降) CBDCA 目標AUC=5 day1 Pemetrexed 500mg/m ² day1 3週毎 CBDCAは4コースで終了 副作用: ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、低マグネシウム血症、体液貯留 搔痒感、インフュージョンリアクション、下痢、静脈血栓塞栓症 肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり
肺癌 (C34) 切除可能な非小細胞癌 (扁平上皮癌) II A～III B (N2) 期	AADC-0379	Durvalumab+PTX+CBDCA	Durvalumab 1500mg/body day1 CBDCA 目標AUC=6 day1 PTX 200mg/m ² day1 術前 3週毎 4コース Durvalumab 1500mg/body day1 術後 4週毎 12コース 副作用: 脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹 食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー 間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
肺癌 (C34) 切除可能な非小細胞癌(扁平上皮癌) II A～ⅢB(N2)期	AADC-0380	<i>Durvalumab+CBDCA+GEM</i>	Durvalumab	1500mg/body	day1
			CBDCA	目標AUC=5	day1
			GEM	1000mg/m ²	day1,day8
			術前 3週毎 4コース		
			Durvalumab	1500mg/body	day1
			術後 4週毎 12コース		
			副作用:		
			発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症		
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害		
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション		
肺癌 (C34) 切除可能な非小細胞癌(扁平上皮癌) II A～ⅢB(N2)期	AADC-0381	<i>Durvalumab+CDDP+GEM</i>	Durvalumab	1500mg/body	day1
			CDDP	75mg/m ²	day1
			GEM	1000mg/m ²	day1,day8
			術前 3週毎 4コース		
			Durvalumab	1500mg/body	day1
			術後 4週毎 12コース		
			副作用:		
			発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症		
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害		
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション		
肺癌 (C34) 切除可能な非小細胞癌(非扁平上皮癌) II A～ⅢB(N2)期	AADC-0382	<i>Durvalumab+CBDCA+PEM</i>	Durvalumab	1500mg/body	day1
			Pemetrexed	500mg/m ²	day1
			CBDCA	目標AUC=5	day1
			術前 3週毎 4コース		
			Durvalumab	1500mg/body	day1
			術後 4週毎 12コース		
			副作用:		
			発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症		
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害		
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション		
肺癌 (C34) 切除可能な非小細胞癌(非扁平上皮癌) II A～ⅢB(N2)期	AADC-0383	<i>Durvalumab+CDDP+PEM</i>	Durvalumab	1500mg/body	day1
			Pemetrexed	500mg/m ²	day1
			CDDP	75mg/m ²	day1
			術前 3週毎 4コース		
			Durvalumab	1500mg/body	day1
			術後 4週毎 12コース		
			副作用:		
			発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症		
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害		
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション		
肺癌 (C34) PD-L1 50% 以上の非小細胞肺癌	AADC-0390	<i>Cemiplimab</i>	Cemiplimab	1回350mg	3週毎
			副作用:		
			骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症		
			甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐		
			口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害		
			肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害		

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			肺炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
肺癌 (C34) 化学療法後に増悪したHER2 (ERBB2) 遺伝子変異陽性の 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	AADC-0391	Zongertinib	Zongertinib 副作用： 1日1回 1回120mg を連日経口投与 肝機能障害、間質性肺炎、心機能障害 重度の下痢、悪心、血球減少 口内炎、皮膚乾燥、そう痒症、爪の障害、発疹
肺癌 (C34) EGFR遺伝子変異陽性の 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	AADC-0395	Amivantamab(SC)+Lazertinib	Amivantamab 1600mg/body (80kg未満) 2240mg/body (80kg以上) 皮下投与 day1 day8 day15 day22 1サイクル目 day1 day15 2サイクル目以降 Lazertinib 1回240mg 1日1回 連日経口投与
			4週毎 副作用： インフュージョンリアクション、間質性肺炎、静脈血栓塞栓症、動脈血栓塞栓症 体液貯留、心不全、角膜炎 ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、掻痒感、爪囲炎 下痢、肝機能障害、低マグネシウム血症、
肺癌 (C34) ROS1融合遺伝子陽性肺癌	AADC-0396	Taletrectinib	Taletrectinib 副作用： 1日1回 600mg (3Cap) を空腹時に連日経口投与 肝機能障害、間質性肺炎、QT延長、中枢神経障害 皮膚粘膜眼症候群、光線過敏性 下痢、悪心・嘔吐、脂質異常症、貧血
胸腺腫 (C37)	AADC-0308	ADOC	DXR 40mg/m ² day1 CDDP 50mg/m ² day1 VCR 0.6mg/m ² (最大2mg/body) day3 CPA 700mg/m ² day4 3週毎 副作用： 骨髄抑制、心毒性、末梢神経障害、肝障害、悪心・嘔吐、脱毛 腎障害、出血性膀胱炎
胸腺癌 (C37) 進行胸腺癌2次治療以降	AADC-0222	Lenvatinib	用法・用量 副作用： 1回24mg 1日1回 高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労 口内炎、蛋白尿、手掌・足底発赤知覚不全症候群、出 動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔 可逆性後白質脳症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延 低カルシウム血症
胸腺癌 (C37)	AADC-0137	AMR	AMR 35～40mg/m ² 3週ごと 3～6コース 3日間連続投与 副作用： 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、脱毛、肝機能障害、発熱
悪性胸膜中皮腫 (C38)	AADC-0114	Pemetrexed+ CDDP療法	Pemetrexed 副作用： 500mg/m ² day1 CDDP 75mg/m ² day1 3週毎 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、倦怠感、口内炎、神経障害
悪性胸膜中皮腫 (C38)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ 副作用： 240mg/body 2週間隔 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
悪性胸膜中皮腫 (C38)	AADC-0274	Ipilimumab+Nivolumab	Ipilimumab 副作用： 1mg/kg 6週間隔 Nivolumab 360mg/body 3週間隔 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			血球貪食症候群、結核
悪性胸膜中皮腫 (C38)	AADC-0349	CBDCA+Pemetrexed	Pemetrexed 500mg/m ² day1 CBDCA 目標AUC=5 day1 3週毎 4-6コース 副作用: 肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感 下痢、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり
骨髄腫 (C42)	AADC-0161	Bortezomib	ボルテゾミブ 1.3mg/m ² 1日1回 day1.4.8.11 3週毎 副作用: 肺障害、心障害、末梢性ニューロパシー、イレウス 骨髄抑制、低血圧、腫瘍崩壊症候群、皮膚粘膜眼症候群 中毒性表皮壊死症、発熱、可逆性後白質脳症症候群 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、肝機能障害
骨髄腫 (C42)	AADC-0165	Bortezomib+Dexamethasone	ボルテゾミブ 1.3mg/m ² 1日1回 day1.4.8.11 デキサメタゾン 20mg 1日1回 day1.2.4.5.8.9.11.12 3週毎 副作用: 肺障害、心障害、末梢性ニューロパシー、イレウス 骨髄抑制、低血圧、腫瘍崩壊症候群、皮膚粘膜眼症候群 中毒性表皮壊死症、発熱、可逆性後白質脳症症候群 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、肝機能障害、血管浮腫 不眠症、無力症、疲労、錯覚症、筋痙攣、高血糖 誘発感染症、続発性副腎皮質機能不全、消化性潰瘍 骨粗鬆症、霧視、紅斑、味覚異常、血栓塞栓症、緑内障、
骨髄腫 (C42) 原発性マクログロブリン血症	AADC-0218	DRC療法	デキサメタゾン 20mg 点滴 day1 リツキシマブ 375mg/m ² 点滴 day1 シクロホスファミド 200mg/m ² 経口 day1~5 3週毎6ヶ月間 副作用: アナフィラキシー様症状、腫瘍崩壊症候群、肝機能障害、 皮膚粘膜症状、皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死融解症 骨髄抑制、間質性肺炎、心障害、消化管穿孔、イレウス、 SIADH 横紋筋融解症、悪心・嘔吐、脱毛、色素沈着、食欲不振 口内炎、不眠、高血糖
骨髄腫 (C42) 再発・難治性多発性骨髄腫	AADC-0397	DBd療法	ダラツムマブ 1800mg 皮下注 1~3サイクル day 1, 8, 15 4~8サイクル day 1 9サイクル以降 day 1 ボルテゾミブ 1.3mg/m ² 皮下注 1~8サイクル day 1, 4, 8, 11 デキサメタゾン 20mg/body 1日1回 経口投与 1~8サイクル day 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 3週毎 9サイクル以降 4週毎 副作用: アナフィラキシー様症状、腫瘍崩壊症候群、間接クームス試験への干渉 骨髄抑制、末梢性感覚ニューロパシー、呼吸困難、肺炎 筋痙攣、疲労、無力症、下痢、便秘、高血圧 不眠、末梢浮腫、発熱
悪性黒色腫 (C43)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
悪性黒色腫 (C43)	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
悪性軟部腫瘍 (C49)	AADC-0199	Pazopanib	パゾパニブ 1日1回800mg 経口投与 副作用: 下痢、疲労、悪心、高血圧、毛髪変色、食欲減退、体重減少、味覚異常 肝機能障害、心機能障害、動脈血栓性事象、静脈血栓性事象、出血 甲状腺機能障害、ネフローゼ症候群、蛋白尿、感染症、創傷治癒遅延
悪性軟部腫瘍 (C49)	AADC-0265	doxorubicin	doxorubicin 75mg/m ² day1 3週毎 total 6回施行 (心毒性に対する用量制限) 副作用: 悪心・嘔吐、白血球減少、食欲不振、脱毛、肝機能異常、下痢・軟便 全身倦怠感、口内炎
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経前	AADC-0027	Tamoxifen	TAM 1日1回20mg 副作用: 無月経、月経異常、悪心・嘔吐、食欲不振
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経前	AADC-0069	Zoladex	ゴセリン 4週に1回3.6mgを皮下投与 副作用: 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経前	AADC-0070	Zoladex LA	ゴセリン 10.8mgを前腹部に12～13週毎に1回投与 副作用: 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経前	AADC-0094	Leuporelin	リュープロレリン 4週に1回3.75mgを皮下投与 12週に1回11.25mgを皮下投与へ切り替え使用あり 副作用: 間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、肝機能障害、黄疸、うつ状態 熱感、ほてり、のぼせ、頭痛・頭重、発汗、寝汗、注射部位障害 悪心・嘔吐、体重増加
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経前	AADC-0095	Leuporelin + TAM療法	リュープロレリン 4週に1回3.75mgを皮下投与 12週に1回11.25mgを皮下投与へ切り替え使用あり TAM 1日1回20mg 副作用: 間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、肝機能障害、黄疸、うつ状態 熱感、ほてり、のぼせ、頭痛・頭重、発汗、寝汗、注射部位障害 悪心・嘔吐、体重増加、無月経、月経異常
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経前	AADC-0096	Leuporelin + Femara療法	リュープロレリン 4週に1回3.75mgを皮下投与 12週に1回11.25mgを皮下投与へ切り替え使用あり レトロゾール 1日1回2.5mg 副作用: 間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、肝機能障害、黄疸、うつ状態 熱感、ほてり、のぼせ、頭痛・頭重、発汗、寝汗、注射部位障害 悪心・嘔吐、体重増加、関節痛、発疹、掻痒感、血栓症、塞栓症
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経前	AADC-0097	Femara	レトロゾール 1日1回2.5mg 副作用: ほてり、頭痛、関節痛、悪心、発疹、掻痒感、肝機能障害 塞栓症、血栓症
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経後	AADC-0030	Arimidex	アナストロゾール 1日1回 1mg 副作用: ほてり、嘔気、脱毛、性器出血
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経後	AADC-0031	Aromasin	エキセメスタン 1日1回 25mg 副作用: ほてり、多汗、高血圧、めまい、悪心、疲労
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経後	AADC-0032	Fareston	トレミフェン 1日1回40mg 副作用: 肝機能障害、白血球減少
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経後	AADC-0033	high dose Fareston	トレミフェン 1日1回120mg

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
乳癌 (C50) 内分泌療法 閉経後	AADC-0034	Hysron-H	副作用: 肝機能障害、白血球減少
			MPA 1日600から1200mg 分3
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0001	S-1(CG)	副作用: 体重増加、満月様顔貌、子宮出血、浮腫、血栓症、月経異常
			用法 a.4週投与 2週休薬法
			b.2週投与 1週休薬法 (副作用の軽減を目的)
			用量 朝食後および夕食後の1日2回
			体表面積 1.25㎡未満 40mg/回
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0010	UFT(UFTE)	1.25から1.5㎡未満 50 mg/回
			1.5㎡以上 60mg/回
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
			用法・用量 1日量としてテガフル300-600mgを1日2-3回に分割投与
			副作用: 食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0035	Xeloda	カペシタビン 1日2回 3週連続投与 1週休薬
			体表面積 1.31㎡未満 900mg/回
			1.31から1.64㎡未満 1200mg/回
			1.64㎡以上 1500mg/回
			副作用: 手足症候群、骨髄抑制
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0036	weekly PTX	PTX 100mg/㎡ 6週投与2週休薬
			副作用: 脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛、関節痛 悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0038	tri-weekly DTX	DTX 60~75mg/㎡ day1 3週毎
			副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0040	FEC100療法	5-FU 500mg/㎡ day1
			EPI 100mg/㎡ day1
			CPA 500mg/㎡ day1
			3週毎
			副作用: 悪心・嘔吐、白血球減少、食欲不振、脱毛、肝機能異常、下痢・軟便 全身倦怠感、口内炎
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0042	weekly Trastuzumab	トラスツズマブ 初回 4mg/kg
			2回目以降 2mg/kg
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0043	bi weekly Trastuzumab	毎週投与
			副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0044	bi weekly PTX + Trastuzumab療法	トラスツズマブ 4mg/kg day1
			2週毎
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0045	VNR	副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制
			PTX 80mg/㎡ day1
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0046	VNR + Trastuzumab療法	トラスツズマブ 4mg/kg day1
			2週毎
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0047	VNR	副作用: 脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛 関節痛、悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常、発熱、悪寒 アントラサイクリン系・タキサン系無効例
			VNR 25mg/㎡ 1週間間隔で2回投与 1週休薬
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0048	VNR	副作用: 骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、嘔気・嘔吐、静脈炎、発熱、口内炎 電解質異常
			VNR 25mg/㎡ day1 2回投与1週休薬

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			トラスツズマブ 2mg/kg day1 毎週投与 (初回は4mg/kg)
			3週毎
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、嘔気・嘔吐、静脈炎、発熱、口内炎
			電解質異常、悪寒
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0087	tri-weekly Trastuzumab	トラスツズマブ 初回8mg/kg day1
			2回目以降 6mg/kg day1
			3週毎
			副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0088	weekly trastuzumab + PTX療法	PTX 80mg/m ² day1
			トラスツズマブ 2mg/kg day1
			毎週投与
			副作用: 脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛
			関節痛、悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常、発熱、悪寒
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0129	Tykerb + Xeloda 療法	タイケルブ 1回1250mg 1日1回 連日投与
			カベシタビン 1回1000mg/m ² 1日2回 2週連続投与 1週休薬
			副作用: 手足症候群、骨髄抑制、下痢、口内炎、倦怠感、嘔気・嘔吐
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0130	DTX+Cyclophosphamide療法	DTX 60～75mg/m ² day1
			CPA 500～600mg/m ² day1
			3週毎
			副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制
			肝機能障害、腎機能障害
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0131	DTX +Xeloda療法	DTX 60～75mg/m ² day1 3週毎
			カベシタビン 1回1250mg/m ² 1日2回 2週連続投与 1週休薬
			副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制
			肝機能障害、腎機能障害、手足症候群
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0132	DTX+tri-weekly Trastuzumab 療法	DTX 60～75mg/m ² day1 3週毎
			トラスツズマブ 初回8mg/kg 2回目以降 6mg/kg day1 3週毎
			副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制
			肝機能障害、腎機能障害
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0144	XELODA + Trastuzumab療法	カベシタビン 1回1250mg/m ² 1日2回 2週連続投与 1週休薬
			トラスツズマブ 6mg/kg day1 3週毎
			副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制、手足症候群
乳癌 (C50) トリプルネガティブ	AADC-0149	Bevacizumab based TC療法	PTX 200mg/m ² day1
			CBDCA 目標AUC=6 day1
			ベバシズマブ 15mg/kg day1 3週ごと
			CBDCA+PTX+ベバシズマブを3週間間隔で4～6サイクル実施後、アバスチン単独を
			3週間間隔で投与する
			副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、
			肝機能障害、高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、喀血、肺出血、血栓塞栓症
乳癌 (C50) 進行・再発乳癌 化学療法	AADC-0150	tri-weekly Abraxane	アブラキシサン 1回 260mg/m ² 3週毎
			副作用: 脱毛、疲労、筋肉痛、末梢神経障害、骨髄抑制、下痢、悪心嘔吐
乳癌 (C50) アントラサイクリン及びタキサンを含む抗がん剤治療後 再発・転移乳癌 化学療法	AADC-0166	Eribulin	ハラヴェン 1.4mg/m ² day1、8
			3週ごと
			副作用: 骨髄抑制、脱毛、疲労、食欲減退、発熱、便秘、下痢、嘔吐
			口内炎、味覚異常、末梢神経障害、肝機能障害、間質性肺炎
乳癌 (C50)	AADC-0167	Fulvestrant	

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
内分泌療法 閉経後			フルベストラント 1回2筒(1筒250mg) 左右の臀部に1筒ずつ筋肉内投与 初回、2週後、4週後、その後4週ごとに1回 副作用: 注射部位疼痛、注射部位硬結、ほてり、注射部位掻痒感 肝機能障害、血栓塞栓症、悪心、便秘、卵巣腫大、頭痛 感覚異常、不眠症、背部痛、筋肉痛、高TG血症、高コレステロール血症
乳癌 (C50)	AADC-0172	CMF(経口法)	MTX 40mg/m ² day1, 8 5-FU 600mg/m ² day1, 8 CPA 1回50mg 1日2回 day1～15 4週ごと 副作用: 嘔気・嘔吐、食欲不振、脱毛、肝機能障害、口内炎、骨髄抑制
乳癌 (C50)	AADC-0173	CMF(静注法)	MTX 40mg/m ² day1 5-FU 600mg/m ² day1 CPA 600mg/m ² day1 3週ごと 副作用: 嘔気・嘔吐、食欲不振、脱毛、肝機能障害、口内炎、骨髄抑制
乳癌 (C50)	AADC-0174	Bevacizumab + PTX療法	PTX 90mg/m ² day1,8,15 ベバシズマブ 10mg/kg day1,15 4週ごと 副作用: 嘔気・嘔吐、食欲不振、脱毛、肝機能障害、口内炎、骨髄抑制 末梢神経障害、関節痛、筋肉痛、下痢、高血圧、蛋白尿 出血、消化管穿孔、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クレーゼ 可逆性後白質脳症症候群、創傷治癒遅延、味覚異常、爪の障害
乳癌 (C50)	AADC-0190	Gemcitabine 手術不能又は再発乳癌	GEM 1250mg/m ² day1,8 3週ごと 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感 間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、心筋梗塞、うっ血性心不全 肺水腫、気管支痙攣、ARDS、腎不全、溶血性尿毒症症候群
乳癌 (C50) 進行・再発乳癌 補助化学療法	AADC-0195	THP療法	用法・用量 1クール目 Pertuzumab 840mg/body day1 Trastuzumab 8mg/kg day1 DTX 75mg/m ² day1 2クール目 Pertuzumab 420mg/body day1 Trastuzumab 6mg/kg day1 DTX 75mg/m ² day1 1クール＝3週間 DTX を6サイクルまで投与し、7サイクル以降が主治医の判断で継続 副作用 下痢、脱毛、爪の異常、倦怠感、嘔気・嘔吐、しびれ、発疹、骨髄抑制 インフュージョンリアクション、うっ血性心不全
乳癌 (C50)	AADC-0203	Everolimus	Everolimus 1日1回10mgを経口投与 (ホルモン療法併用) 副作用: 口内炎、発疹、疲労、食欲減退、下痢、味覚異常、悪心 感染症、体重減少、貧血、鼻出血、高血糖、血小板減少 掻痒症
乳癌 (C50)	AADC-0207	P/T+Eribulin	Pertuzumab 初回840mg/body 2回目以降420mg/body day1 Trastuzumab 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg day1 Eribulin 1.4mg/m ² day1, day8 3週ごと 副作用: インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、脱毛、倦怠感 骨髄抑制、悪心、爪の異常、ニューロパシー、発疹、間質性肺炎 流涙増加、肝機能障害、アナフィラキシー、浮腫、疼痛

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
乳癌 (C50)	AADC-0209	T-DM1(手術不能または再発乳癌)	T-DM1 3.6mg/kg day1
			3週ごと
			副作用: 倦怠感、鼻出血、悪心、発熱、食欲減退、骨髄抑制、肝機能障害
			間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション 末梢神経障害
乳癌 (C50)	AADC-0217	EC療法	EPI 100mg/m ² day1
			CPA 600mg/m ² day1
			3週毎
			副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎 出血性膀胱炎、下痢、口内炎、アナフィラキシー、排尿障害 イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、
乳癌 (C50)	AADC-0221	AC療法	ADM 60mg/m ² day1
			CPA 600mg/m ² day1
			3週毎
			副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎 口内炎、心電図異常、出血性膀胱炎、下痢、肝機能障害 イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、急性腎不全 アナフィラキシー、排尿障害
乳癌 (C50)	AADC-0226	Leuprorerin Pro	Leuprorerin Pro22.5mg 24週毎皮下注射
			副作用: 注射部位硬結、注射部位紅斑、注射部位疼痛、糖尿病、ほてり 間質性肺炎、アナフィラキシー、肝機能障害、血栓塞栓症
乳癌 (C50) 化学療法	AADC-0234	TC+tri weekly Trastuzumab	DTX 75mg/m ² day1
			CPA 600mg/m ² day1
			トラスツズマブ [※] 初回8mg/kg 2回目以降 6mg/kg day1
			3週毎 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害
乳癌 (C50)	AADC-0238	Palbociclib + Letrozole	バルボシクリブ 1日1回125mg 3週連続投与1週休薬
			レトロゾール 1日1回2.5mg 連続投与
			4週毎
			副作用: ほてり、頭痛、関節痛、悪心、発疹、掻痒感、肝機能障害 塞栓症、血栓症 骨髄抑制、脱毛、疲労、感染症、口内炎、下痢、間質性肺炎
乳癌 (C50)	AADC-0239	Palbociclib + fulvestrant	バルボシクリブ 1日1回125mg 3週連続投与1週休薬
			フルベストラント 1回2筒(1筒250mg) 左右の臀部に1筒ずつ筋肉内投与 day1,day15 その後はサイクル1の1日目から換算して18日(±7日) 毎
			副作用: 注射部位疼痛、注射部位硬結、ほてり、注射部位掻痒感 肝機能障害、血栓塞栓症、悪心、便秘、卵巣腫大、頭痛 感覚異常、不眠症、背部痛、筋肉痛、高TG血症、高コレステロール血症 骨髄抑制、脱毛、疲労、感染症、口内炎、下痢、間質性肺炎
乳癌 (C50)	AADC-0244	Abemaciclib	アベマシクリブ 1回150mgを1日2回経口投与 (フルベストラントorレトロゾールorアナストロゾールと併用)
			副作用: 肝機能障害、骨髄抑制、下痢、間質性肺炎 静脈血栓塞栓症、感染症、悪心、嘔吐 疲労、脱毛症 血清クレアチニン上昇
乳癌 (C50)	AADC-0248	Olaparib	オラパリブ 1回300mgを1日2回経口投与
			副作用: 悪心、嘔吐、味覚異常 貧血、好中球減少、血小板減少、リンパ球減少

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			疲労、無力症、間質性肺炎 下痢、頭痛
乳癌 (C50)	AADC-0249	nab-PTX+trastuzumab	nab-PTX 1回 260mg/m ² 3週毎 トラスツ'マブ' 初回8mg/kg day1 2回目以降 6mg/kg day1
			3週毎 副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制 脱毛、筋痛、末梢神経障害、下痢
乳癌 (C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行	AADC-0255	nab-PTX+Atezolizumab	Atezolizumab 840mg/回 点滴静注 day1、day15 nab-PTX 100mg/m ² 点滴静注 day1、day8、day15 その後13日間休薬 28日で1コース
			副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制 脱毛、筋痛、末梢神経障害、下痢 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害
乳癌 (C50)	AADC-0258	DD-EC	EPI 90mg/m ² day1 CPA 600mg/m ² day1 ベ'グ'フィルグラスチム 3.6mg day2 2週毎 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎 出血性膀胱炎、下痢、口内炎、アナフィラキシー、排尿障害 イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、
乳癌 (C50)	AADC-0263	DD-PTX	PTX 175mg/m ² day1 ベ'グ'フィルグラスチム 3.6mg day2 2週毎 副作用: 脱毛、疲労、筋痛、末梢神経障害、骨髄抑制、下痢、悪心嘔吐
乳癌 (C50) 進行再発乳癌	AADC-0264	Trastuzumab Deruxtec	Trastuzumab Deruxtec 5.4mg/kg day1 3週ごと 副作用: 間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション 骨髄抑制、脱毛、疲労、悪心・嘔吐、下痢、便秘、口内炎
乳癌 (C50)	AADC-0269	T-DM1(術後)	T-DM1 3.6mg/kg day1 3週ごと (投与回数は14回まで) 副作用: 倦怠感、鼻出血、悪心、発熱、食欲減退、骨髄抑制、肝機能障害 間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション 末梢神経障害
乳癌 (C50)	AADC-0286	CBDCA+GEM	GEM 1000mg/m ² day1.8 CBDCA AUC2 day1.8 3週毎 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、発熱、皮疹
乳癌 (C50)	AADC-0287	Pembrolizumab+CBDCA+GEM	Pembrolizumab 200mg/body day1 GEM 1000mg/m ² day1.8 CBDCA AUC2 day1.8 3週毎 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、発熱、皮疹 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害
乳癌 (C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行	AADC-0288	Pembrolizumab+CBDCA+GEM	Pembrolizumab 200mg/body day1 GEM 1000mg/ m ² day1,8 day22,29 CBDCA AUC2 day1,8 day22,29 6週毎 副作用: AADC-0287と同様
乳癌 (C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行	AADC-0289	Pembrolizumab+nab-PTX	Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎 nab-PTX 100mg/ m ² 点滴静注 day1,8,15 4週毎 副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制 脱毛、筋痛、末梢神経障害、下痢 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害
乳癌 (C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行	AADC-0290	Pembrolizumab+nab-PTX	Pembrolizumab 200mg/body day1 6週毎 nab-PTX 100mg/ m ² 点滴静注 day1,8,15 4週毎 副作用: AADC-0289と同様
乳癌 (C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行	AADC-0291	Pembrolizumab+PTX 3週	Pembrolizumab 200mg/body day1 3週毎 PTX 90mg/ m ² 点滴静注 day1,8,15 4週毎 副作用: 脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛、関節痛 悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常 疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症 間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病 甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎 髄膜炎、神経障害
乳癌 (C50) ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行	AADC-0292	Pembrolizumab+PTX 6週	Pembrolizumab 200mg/body day1 6週毎 PTX 90mg/ m ² 点滴静注 day1,8,15 4週毎 副作用: AADC-0291と同様
乳癌 (C50) トリプルネガティブ進行乳癌 術前	AADC-0311	Pembrolizumab+CBDCA+PTX	Pembrolizumab 200mg/body day1 CBDCA 目標AUC=5/1 day1 PTX 80mg/ m ² day1,8,15 3週毎 術前4コース 副作用: 脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、発疹 食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー 間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うつ血性心不全 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病 膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
乳癌 (C50) トリプルネガティブ進行乳癌 術前	AADC-0312	Pembrolizumab+EC	Pembrolizumab 200mg/body day1 EPI 90mg/ m ² day1 CPA 600mg/ m ² day1 3週毎 術前4コース 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎 出血性膀胱炎、下痢、口内炎、アナフィラキシー、排尿障害 イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、 難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群 急性腎不全、白質脳症、 大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			肺炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
乳癌 (C50) トリプルネガティブ進行乳癌 術後 9回まで	AADC-0313	Pembrolizumab 200mg 3週毎	ペムブロリズマブ 1回200mg day1 3週毎 術後9コースまで 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 肺炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
乳癌 (C50) トリプルネガティブ進行乳癌 術後 5回まで	AADC-0314	Pembrolizumab 400mg 6週毎	ペムブロリズマブ 1回400mg day1 6週毎 術後5コースまで 副作用: AADC-0313と同様
乳癌 (C50) HER2陽性乳癌	AADC-0326	PT+PTX	用法・用量 1クール目 Pertuzumab 840mg/body day1 Trastuzumab 8mg/kg day1 PTX 80mg/m ² day1、8、15 2クール目以降 Pertuzumab 420mg/body day1 Trastuzumab 6mg/kg day1 PTX 80mg/m ² day1、8、15 1クール＝3週間 副作用 下痢、脱毛、倦怠感、しびれ、骨髄抑制 インフュージョンリアクション、うつ血性心不全
乳癌 (C50) HER2陽性乳癌	AADC-0339	P/T+nab-PTX	用法・用量 1クール目 Pertuzumab 840mg/body day1 Trastuzumab 8mg/kg day1 nab-PTX 260mg/m ² day1 2クール目以降 Pertuzumab 420mg/body day1 Trastuzumab 6mg/kg day1 nab-PTX 260mg/m ² day1 1クール＝3週間 副作用: 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制 脱毛、筋痛、末梢神経障害、下痢 インフュージョンリアクション、うつ血性心不全
乳癌 (C50) HER2陽性乳癌	AADC-0340	PHESGO+DTX	ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として 初回 (IN) それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1 2回目以降 (MA) それぞれ 600mg、600mg、20000U day1 初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与 DTX 75mg/m ² day1 3週ごと 副作用: インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感 間質性肺炎、悪心、口内炎 脱毛、筋痛、末梢神経障害、爪の異常
乳癌 (C50) HER2陽性乳癌	AADC-0341	PHESGO+Eribulin	ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として 初回 (IN) それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1 2回目以降 (MA) それぞれ 600mg、600mg、20000U day1 初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与 Eribulin 1.4mg/m ² day1、8 3週ごと 副作用: インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			間質性肺炎、悪心、口内炎、末梢神経障害
乳癌 (C50) HER2陽性乳癌	AADC-0342	PHESGO+PTX	ベルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として 初回 (IN) それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1 2回目以降 (MA) それぞれ 600mg、600mg、20000U day1 初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与 PTX 80mg/m ² day1、8、15 3週ごと 副作用： インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感 間質性肺炎、悪心、口内炎 脱毛、筋痛、末梢神経障害
乳癌 (C50) HER2陽性乳癌	AADC-0343	PHESGO+nab-PTX	ベルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として 初回 (IN) それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1 2回目以降 (MA) それぞれ 600mg、600mg、20000U day1 初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与 nab-PTX 260mg/m ² day1 3週ごと 副作用： インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感 間質性肺炎、悪心、口内炎 脱毛、筋痛、末梢神経障害
乳癌 (C50) HER2陽性乳癌 術前・術後の場合は投与期間は12ヶ月まで	AADC-0344	PHESGO	ベルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として 初回 (IN) それぞれ 1200mg、600mg、30000U day1 2回目以降 (MA) それぞれ 600mg、600mg、20000U day1 初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与 3週ごと 副作用： インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感 間質性肺炎、悪心、口内炎
乳癌 (C50)	AADC-0351	Capivasertib	カピバセルチブ 1回400mgを1日2回 経口投与 4日間服用3日間休薬 副作用： 高血糖、下痢、皮膚障害 悪心・嘔吐、口内炎、発疹、疲労 味覚不全、腎機能障害
乳癌 (C50) BRCA遺伝子変異陽性かつHER2陰性乳癌	AADC-0358	Talazoparib	タラゾパリブ 1回1mgを1日1回 経口投与 副作用： 骨髄抑制、間質性肺疾患、血栓塞栓症、二次性悪性腫瘍 口内炎、倦怠感、悪心、脱毛 下痢、頭痛
乳癌 (C50) 化学療法歴のあるホルモン受容体陰性かつHER2陰性乳癌 化学療法歴のあるホルモン受容体陽性かつHER3陰性乳癌	AADC-0363	Sacituzumab Govitecan	サシツズマブ ゴビテカ 10mg/kg day1、8 3週ごと 副作用： 骨髄抑制、下痢・腸炎、悪心・嘔吐、インフュージョンリアクション 間質性肺疾患、肝機能障害、脱毛、倦怠感
乳癌 (C50) 化学療法歴のあるホルモン受容体陽性かつHER2陰性乳癌	AADC-0365	Datopotamab Deruxtec	Datopotamab Deruxtec 6mg/kg day1 3週ごと 副作用： 間質性肺疾患、角膜障害、口内炎、過敏症、インフュージョンリアクション 骨髄抑制、脱毛、疲労、悪心・嘔吐、下痢、便秘
乳癌 (C50) 化学療法歴のあるHER2陽性乳癌	AADC-0394	Tucatinib+Trastuzumab+Capecitabine	ツカチニブ 1回300mg 1日2回 連日経口投与 カペシタビン 1回1000mg/m ² (C法) 1日2回 2週投与 1週休薬 トラスツズマブ 初回 8mg/kg、2回目以降 6mg/kg day1 3週毎 副作用： 発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制、手足症候群 下痢、肝機能障害、心機能障害、間質性肺疾患

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
子宮頸癌 (C53)	AADC-0082	NDP+CPT-11療法	CPT-11 60mg/m ² day1, 8
			ネダプラチン 100mg/m ² day1
			3週毎
			副作用: 下痢、悪心・嘔吐、骨髄抑制、腎機能障害、肝機能障害
子宮体癌 (C54)	AADC-0019	PTX + CBDCA療法(TC)	PTX 180mg/m ² day1
			CBDCA 目標AUC=5 day1
			3～4週ごと
			副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害
子宮体癌 (C54)	AADC-0080	DTX+CBDCA療法(DC)	DTX 60～75mg/m ² day1
			CBDCA 目標AUC=5 day1
			副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
子宮体癌 (C54)	AADC-0081	CPA+ADM+CDDP療法(CAP)	CPA 500mg/m ² day1
			DXR 50mg/m ² day1
			CDDP 50mg/m ² day1
			4週ごと 副作用: 脱毛、骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、口内炎、全身倦怠感
卵巣癌 (C56)	AADC-0019	PTX + CBDCA療法(TC)	PTX 180mg/m ² day1
			CBDCA 目標AUC=5 day1
			3～4週ごと
			副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害
卵巣癌 (C56)	AADC-0080	DTX+CBDCA療法(DC)	DTX 60～75mg/m ² day1
			CBDCA 目標AUC=5 day1
			副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
卵巣癌 (C56)	AADC-0081	CPA+ADM+CDDP療法(CAP)	CPA 500mg/m ² day1
			DXR 50mg/m ² day1
			CDDP 50mg/m ² day1
			4週ごと 副作用: 脱毛、骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、口内炎、全身倦怠感
卵巣癌 (C56)	AADC-0133	DOXIL	DXR 50mg/m ² を1mg/分で静注 day1
			4週ごと
			副作用: 骨髄抑制、アナフィラキシー用症状、手足症候群、口内炎、肝機能障害、悪心、食欲不振、発疹、疲労、体重減少、心筋障害
卵巣癌 (C56)	AADC-0375	TC(術後補助化学療法)	PTX 175mg/m ² day1
			CBDCA 目標AUC=6 day1 (MAX 800mg/body)
			3週毎 最大6コース
			副作用: 脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害
卵巣杯細胞性悪性腫瘍 (C56)	AADC-0075	EP療法	VP-16 100mg/m ² day1～5
			CDDP 20mg/m ² day1～5
			1クール:3週
			副作用: 骨髄抑制、食欲不振、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、
卵巣杯細胞性悪性腫瘍 (C56)	AADC-0083	BEP療法	BLM 30mg/body day2, 9, 16

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			VP-16 100mg/㎡ day1～5 CDDP 20mg/㎡ day1～5 1クール:3週 副作用: 間質性肺炎、肺繊維症、皮膚の硬化、色素沈着、発熱・悪寒、脱毛、食欲不振 体重減少、全身倦怠感、悪心・嘔吐、骨髄抑制、
前立腺癌 (C61)	AADC-0038	tri-weekly DTX	DTX 60～75mg/㎡ day1 3週毎 副作用: 脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制 肝機能障害、腎機能障害
前立腺癌 (C61)	AADC-0064	Prosta ^l	クロルマジン ^l 1回50mg1日2回 副作用: インポテンツ、浮腫、体重増加、女性化乳房
前立腺癌 (C61)	AADC-0065	Casodex	ビカルタミド ^l 1回80mg1日1回 副作用: 乳房腫脹、乳房圧痛、肝機能障害、勃起力低下
前立腺癌 (C61)	AADC-0066	Odyne	フルタミド ^l 1回125mg 1日3回 副作用: 肝機能障害、女性型乳房、悪心・嘔吐
前立腺癌 (C61)	AADC-0067	Estracyt	エストラムスチン 1回280mg 1日2回 副作用: 女性化乳房、食欲不振、浮腫、貧血、肝機能異常
前立腺癌 (C61)	AADC-0068	Leuplin	リュープロレリン 4週に1回3.75mgを皮下投与 副作用: 肝機能障害、ほてり、熱感
前立腺癌 (C61)	AADC-0070	Zoladex LA	ゴセレリン 10.8mgを前腹部に12～13週毎に1回投与 副作用: 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下
前立腺癌 (C61)	AADC-0103	多剤ホルモン療法無効前立腺癌 Prosexol	エチニルエストラジオール 1回0.5～1.0mg 1日3回 副作用: 血栓症、心不全、狭心症、発疹、肝機能障害、血圧上昇、電解質異常
前立腺癌 (C61)	AADC-0124	Casodex + ZoladexLA 療法	ビカルタミド ^l 1回80mg1日1回 ゴセレリン 10.8mgを前腹部に12～13週毎に1回投与 副作用: 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下 乳房腫脹、乳房圧痛、肝機能障害
前立腺癌 (C61)	AADC-0125	Casodex + Leuplin 療法	ビカルタミド ^l 1回80mg1日1回 リュープロレリン 4週ごとに3.75mgまたは12週ごとに11.25mgを皮下投与 副作用: 肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下 ほてり、熱感
前立腺癌 (C61)	AADC-0127	Odyne + ZoladexLA 療法	フルタミド ^l 1回125mg 1日3回 ゴセレリン 10.8mgを前腹部に12～13週毎に1回投与 副作用: 肝機能障害、女性型乳房、悪心・嘔吐 代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下
前立腺癌 (C61)	AADC-0187	Degarelix	デガレリクス 初回240mgを1箇所あたり120mgずつ腹部2箇所に皮下投与 2回目以降80mgを腹部1箇所に皮下投与 4週毎 副作用: 注射部位疼痛、注射部位硬結、注射部位紅斑、ほてり、体重増加 発熱、高血圧、注射部位熱感、間質性肺炎、肝機能障害、糖尿病憎悪 心不全、血栓塞栓症、アナフィラキシー

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメ名称	用法等
前立腺癌 (C61)	AADC-0128	Odyne + Leuplin 療法	フルタミド [*] 1回125mg 1日3回 リュープ [®] ロレリン 4週ごとに3.75mgまたは12週ごとに11.25mgを皮下投与 副作用: 肝機能障害、女性型乳房、悪心・嘔吐、ほてり、熱感
前立腺癌 (C61)	AADC-0205	Enzalutamide	エンザルタミド 1回160mg 1日1回 経口投与 連日 副作用: 疲労、悪心、食欲減退、無力症、痙攣発作、下痢、
前立腺癌 (C61)	AADC-0208	Abiraterone	Abiraterone 1回1000mg 1日1回 経口投与 連日 プレドニ [®] 1回5mg 1日2回 経口投与 連日 副作用: 肝機能障害、心障害、疲労、ほてり、悪心・嘔吐、低カリウム血症 高血圧、消化器症状、高脂血症
前立腺癌 (C61)	AADC-0224	Cabazitaxel	Cabazitaxel 20～25mg/㎡ day1 Pegfilgrastin 3.6mg day2 3週毎 副作用: 好中球減少症、骨髄抑制、疲労、悪心、下痢、食欲減退 貧血、腎不全、消化管出血、アナフィラキシーショック 心不全、末梢神経障害、DIC、皮膚粘膜眼症候群、心タンポナーデ 心筋梗塞、静脈血栓塞栓症、間質性肺炎、口内炎、SIADH
前立腺癌 (C61)	AADC-0226	Leuproterin Pro	Leuproterin Pro22.5mg 24週毎皮下注射 副作用: 注射部位硬結、注射部位紅斑、注射部位疼痛、糖尿病、ほてり 間質性肺炎、アナフィラキシー、肝機能障害、血栓塞栓症
前立腺癌 (C61)	AADC-0250	Degarelix(12週毎)	デガレリクス 初回240mgを1箇所あたり120mgずつ腹部2箇所に皮下投与 2回目以降は初回投与4週間後より480mgを維持用量として 腹部2箇所に皮下投与し、12週間間隔で投与を繰り返す。 副作用: 注射部位疼痛、注射部位硬結、注射部位紅斑、ほてり、体重増加 発熱、高血圧、注射部位熱感、間質性肺炎、肝機能障害、糖尿病憎悪 心不全、血栓塞栓症、アナフィラキシー
前立腺癌 (C61)	AADC-0251	Apalutamide	アパルタミド [*] 1回240mg 1日1回 経口投与 連日 副作用: 疲労、皮疹、甲状腺機能低下症、搔痒症、体重減少 痙攣発作、心房細動、心筋梗塞、悪心、下痢
前立腺癌 (C61)	AADC-0266	Darolutamide	ダロルタミド [*] 1回600mg(300mgを2錠) 1日2回 食後経口投与 連日 副作用: 心臓障害、間質性肺疾患、疲労、皮疹、頭痛、めまい 悪心、下痢、ほてり、高血圧、女性化乳房
前立腺癌 (C61)	AADC-0248	Olaparib	オラパリブ 1回300mgを1日2回経口投与 副作用: 悪心、嘔吐、味覚異常 貧血、好中球減少、血小板減少、リンパ球減少 疲労、無力症、間質性肺炎 下痢、頭痛
前立腺癌 (C61)	AADC-0367	Cisplatin (CDK12陽性)	CDDP 75mg/㎡ day2 3週毎 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、腎機能障害
精巣腫瘍 (C63)	AADC-0074	BEP療法	BLM 30mg/body day1.8.15 VP-16 100mg/㎡ day1～5 CDDP 20mg/㎡ day1～5 1クール:3週 副作用: 間質性肺炎、肺繊維症、皮膚の硬化、色素沈着、発熱・悪寒、脱毛、食欲不振 体重減少、全身倦怠感、悪心・嘔吐、骨髄抑制、

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
精巣腫瘍 (C63)	AADC-0075	EP療法	VP-16 100mg/m ² day1～5 CDDP 20mg/m ² day1～5 1クール:3週 副作用: 骨髄抑制、食欲不振、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、
精巣腫瘍 (C63) セミノーマ	AADC-0171	CBDCA	CBDCA AUC=7 単回投与 副作用: 嘔気・嘔吐、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、発熱、骨髄抑制、肝機能障害
腎癌 (C64)	AADC-0076	Sumiferon	IFN-α 1日1回300万～600万IU 連日または週1～3回 副作用: 発熱、全身倦怠感、食欲不振、骨髄抑制、肝機能障害
腎癌 (C64)	AADC-0077	Imunace	テセロイキン 1日1回70万単位 連日 副作用: 発熱、悪寒、倦怠感、食欲不振、悪心・嘔吐、好酸球増多、肝機能障害、浮腫
腎癌 (C64)	AADC-0112	Sutent	スニチニブ 1日1回50mg 4週間連続投与2週間休薬 副作用: 骨髄抑制、皮膚変色、手足症候群、食欲不振、肝機能異常、疲労感 味覚異常、口内炎、下痢、悪心、歯肉炎、代謝異常、浮腫、発熱、高血圧
腎癌 (C64) 根治切除不能または転移性の腎細胞癌	AADC-0160	Sorafenib	用法・用量 1回400mg 1日2回 経口投与 適宜増減 副作用: 手足症候群、剥脱性皮膚炎、発疹、脱毛、下痢、高血圧、疲労 食欲不振、そう痒感、体重減少、肝機能障害、出血 間質性肺炎、急性肺障害、高血圧クリーゼ、可逆性後白室脳症 皮膚粘膜眼症候群、消化管穿孔、心筋虚血・心筋梗塞
腎癌 (C64) 根治切除不能または転移性の腎細胞癌	AADC-0169	Everolimus	Everolimus 10mg/day 連日経口投与 副作用: 口内炎、発疹、貧血、疲労、下痢、無力症、食欲減退、高コレステロール血症 悪心、粘膜の炎症、嘔吐、末梢性浮腫、高トリグリセリド血症、咳嗽、掻痒症 感染症、皮膚乾燥、鼻出血、呼吸困難、味覚異常、間質性肺炎、腎不全 高血糖、アナフィラキシー様症状、急性呼吸窮迫症候群、肺塞栓症、心嚢液貯留 進行性多巣性白質脳症、BKウイルス腎症、血栓性微小血管障害、肺胞蛋白症
腎癌 (C64)	AADC-0178	Temsirolimus	テムシロリムス 25mgを1週間に1回点滴 副作用: 発疹、口内炎、食欲不振、肝機能障害、高血糖、間質性肺疾患 infusion reaction、脂質代謝異常、創傷治癒遅延、腎不全 消化管穿孔、心嚢液貯留、胸水、痙攣、脳出血、感染症 皮膚粘膜眼症候群、横紋筋融解症、骨髄抑制
腎癌 (C64) 進行再発腎癌	AADC-0183	Axitinib	アキシチニブ 1回5mg1日2回経口投与 患者の状態により増減可、増量は1回10mgまで 副作用: 高血圧、甲状腺機能障害、創傷治癒遅延、蛋白尿、手足症候群 肝機能障害、下痢、疲労、悪心嘔吐、発声障害、無力症、体重減少 粘膜炎症、口内炎、味覚異常、鼻出血、
腎癌 (C64)	AADC-0199	Pazopanib	パゾパニブ 1日1回800mg 経口投与 副作用: 下痢、疲労、悪心、高血圧、毛髪変色、食欲減退、体重減少、味覚異常 肝機能障害、心機能障害、動脈血栓性事象、静脈血栓性事象、出血 甲状腺機能障害、ネフローゼ症候群、蛋白尿、感染症、創傷治癒遅延
腎癌 (C64)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
腎癌 (C64)	AADC-0252	Nivolumab+Ipilimumab	Nivolumab 240mg/body

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			Ipilimumab 1mg/kg 3週毎4コースまで 5コースから
			Nivolumab 240mg/body 2週毎継続 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球貪食症候群、結核
腎癌 (C64)	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
腎癌 (C64)	AADC-0268	Pembrolizumab(6週間)	ペムブロリズマブ 1回400mg 6週間隔 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症 甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐 口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害 肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害 膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
腎癌 (C64)	AADC-0278	Cabozantinib	カボザンチニブ 1回60mg 1日1回空腹時 副作用: 高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労 口内炎、蛋白尿、手足症候群、横紋筋融解症 動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔 可逆性後白質脳症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延 低カルシウム血症
腎癌 (C64)	AADC-0392	Nivolumab+Cabozantinib 2週間	Nivolumab 240mg/body カボザンチニブ 1回40mg 1日1回空腹時 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 高血圧、下痢、悪心、疲労 口内炎、蛋白尿、手足症候群、横紋筋融解症 動脈血栓症、静脈血栓症、消化管穿孔、低カルシウム血症 可逆性後白質脳症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延
腎癌 (C64)	AADC-0393	Nivolumab+Cabozantinib 4週間	Nivolumab 480mg/body カボザンチニブ 1回40mg 1日1回空腹時 副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 高血圧、下痢、悪心、疲労 口内炎、蛋白尿、手足症候群、横紋筋融解症 動脈血栓症、静脈血栓症、消化管穿孔、低カルシウム血症 可逆性後白質脳症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延
腎う癌 (C65)	AADC-0121	GC療法	GEM 1000mg/m ² day1.8.15 CDDP 70mg/m ² day2 1クール:4週 副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱
腎う癌 (C65)	AADC-0268	Pembrolizumab(6週間)	ペムブロリズマブ 1回400mg 6週間隔 副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐
			口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害
			肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害
			肺炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
腎う癌(C65) 根治切除不能尿路上皮癌における化学療法後の維持療法	AADC-0283	Avelumab	Avelumab 10mg/kg day1 2週毎
			副作用： 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病 肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー
腎う癌(C65) がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌	AADC-0294	Enfortumab Vedotin	Enfortumab Vedotin 1.25mg/kg day1.8.15 4週毎
			副作用： 皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患 肝機能障害、Infusion reaction
腎う癌(C65) 筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ 240mg/body 2週間隔 副作用： 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
腎う癌(C65) 筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ 480mg/body 4週間隔 副作用： 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
腎う癌(C65) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌	AADC-0336	GEM+PTX	GEM 1000mg/m ² day1.8.15 PTX 200mg/m ² day1 4週毎 副作用： 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱 関節痛、筋肉痛、末梢神経障害
腎う癌(C65) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌	AADC-0337	GEM+CBDCA	GEM 1000mg/m ² day1.8 CBDCA 目標AUC＝5 day1 3週毎 副作用： 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、発熱
腎う癌(C65) 根治切除不能な尿路上皮癌の一次治療	AADC-0360	Pembrolizumab+Enfortumab Vedotin	Pembrolizumab 200mg/body day1 Enfortumab Vedotin 1.25mg/kg day1.8 3週毎 副作用： 皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患 肝機能障害、Infusion reaction 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、静脈血栓塞栓症
腎う癌(C65) 根治切除不能な尿路上皮癌	AADC-0377	Nivolumab+GC	Nivolumab 360mg/body day1 CDDP 70mg/m ² day1 GEM 1000mg/m ² day1,day8 3週毎 最大6コース Nivolumab 480mg/body day1 4週毎 最長2年間 副作用： 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球食食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
尿管癌 (C66)	AADC-0121	GC療法	GEM 1000mg/m ² day1,8,15
			CDDP 70mg/m ² day2
			1クール: 4週
			副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱
尿管癌 (C66)	AADC-0268	Pembrolizumab (6週間)	ペムブロリズマブ 1回400mg 6週間隔
			副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症
			甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐
			口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害
尿管癌 (C66)	AADC-0283	Avelumab	Avelumab 10mg/kg day1
			2週毎
			副作用: 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病
			肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー
尿管癌 (C66) がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌	AADC-0294	Enfortumab Vedotin	Enfortumab Vedotin 1.25mg/kg day1,8,15
			4週毎
			副作用: 皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患
			肝機能障害、Infusion reaction
尿管癌 (C66) 筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ 240mg/body 2週間隔
			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
尿管癌 (C66) 筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ 480mg/body 4週間隔
			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
尿管癌 (C66) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌	AADC-0336	GEM+PTX	GEM 1000mg/m ² day1,8,15
			PTX 200mg/m ² day1
			4週毎
			副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱
尿管癌 (C66) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌	AADC-0337	GEM+CBDCA	GEM 1000mg/m ² day1,8
			CBDCA 目標AUC=5 day1
			3週毎
			副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、発熱
尿管癌 (C66) 根治切除不能な尿路上皮癌の一次治療	AADC-0360	Pembrolizumab+Enfortumab Vedotin	Pembrolizumab 200mg/body day1
			Enfortumab Vedotin 1.25mg/kg day1,8
			3週毎
			副作用: 皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患
尿管癌 (C66) 根治切除不能な尿路上皮癌	AADC-0377	Nivolumab+GC	Nivolumab 360mg/body day1
			CDDP 70mg/m ² day1
			GEM 1000mg/m ² day1, day8
			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、重症筋無力症

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			3週毎 最大6コース
			Nivolumab 480mg/body day1
			4週毎 最長2年間
			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
			血球食食症候群、結核
			悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎
膀胱癌 (C67)	AADC-0012	Furtulon	5'-DFUR 800-1200mgを3-4回に分けて服用
			副作用: 食欲不振、下痢、白血球減少
膀胱癌 (C67)	AADC-0071	Epirubicin 膀胱内注入	EPI 40mgを週1回膀胱内へ注入 10回
			副作用: 悪心・嘔吐、白血球減少、食欲不振、脱毛
膀胱癌 (C67)	AADC-0072	Immunobladder 膀胱内注入	BCG 40mgまたは80mgを週1回膀胱内へ注入 10回
			副作用: BCG感染、排尿痛、頻尿、肉眼的血尿、肝機能障害、発熱、
膀胱癌 (C67)	AADC-0121	GC療法	GEM 1000mg/m ² day1.8.15
			CDDP 70mg/m ² day2
			1クール: 4週
			副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱
膀胱癌 (C67)	AADC-0268	Pembrolizumab (6週間)	ペムブロリズマブ 1回400mg 6週間隔
			副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症
			甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐
			口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害
			肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害
			膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
膀胱癌 (C67)	AADC-0283	Avelumab	Avelumab 10mg/kg day1
根治切除不能尿路上皮癌における化学療法後の維持療法			2週毎
			副作用: 間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病
			肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー
膀胱癌 (C67)	AADC-0294	Enfortumab Vedotin	Enfortumab Vedotin 1.25mg/kg day1.8.15
がん化学療法後に増悪した根治切除不能尿路上皮癌			4週毎
			副作用: 皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患
			肝機能障害、Infusion reaction
膀胱癌 (C67)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ 240mg/body 2週間隔
筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
膀胱癌 (C67)	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ 480mg/body 4週間隔
筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
			大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
膀胱癌 (C67)	AADC-0336	GEM+PTX	GEM 1000mg/m ² day1.8.15
切除不能または転移を有する尿路上皮癌			PTX 200mg/m ² day1
			4週毎
			副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱
			関節痛、筋肉痛、末梢神経障害

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
膀胱癌 (C67) 切除不能または転移を有する尿路上皮癌	AADC-0337	GEM+CBDCA	GEM 1000mg/m ² day1,8
			CBDCA 目標AUC=5 day1
			3週毎
			副作用: 悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、発熱
膀胱癌 (C67) 根治切除不能な尿路上皮癌の一次治療	AADC-0360	Pembrolizumab+Enfortumab Vedotin	Pembrolizumab 200mg/body day1
			Enfortumab Vedotin 1.25mg/kg day1,8
			3週毎
			副作用: 皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患 肝機能障害、Infusion reaction 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、静脈血栓塞栓症
膀胱癌 (C67) 根治切除不能な尿路上皮癌	AADC-0377	Nivolumab+GC	Nivolumab 360mg/body day1
			CDDP 70mg/m ² day1
			GEM 1000mg/m ² day1,day8
			3週毎 最大6コース
			Nivolumab 480mg/body day1
			4週毎 最長2年間
			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球食食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎
膀胱癌 (C67) 術前・術後補助療法	AADC-0385	Durvalumab+GEM+CDDP (CCr>60ml/min)	Durvalumab 1500mg/body day1 BW ≤ 30kgは20mg/kg
			CDDP 70mg/m ² day1
			GEM 1000mg/m ² day1,day8
			術前 3週毎 最大4コース
			Durvalumab 1500mg/body day1 BW ≤ 30kgは20mg/kg
			術後 4週毎 最大8コース
			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球食食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎
膀胱癌 (C67) 術前・術後補助療法	AADC-0386	Durvalumab+GEM+CDDP (CCr=40-60ml/min)	Durvalumab 1500mg/body day1 BW ≤ 30kgは20mg/kg
			CDDP 35mg/m ² day1,day8
			GEM 1000mg/m ² day1,day8
			術前 3週毎 最大4コース
			Durvalumab 1500mg/body day1 BW ≤ 30kgは20mg/kg
			術後 4週毎 最大8コース
			副作用: 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション 血球食食症候群、結核 悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎
悪性膠芽腫、乏突起神経膠腫 (C71)	AADC-0078	IFNβ+MCNU+IMRT(IMR療法)	IFNβまたはフェロン 300万単位 5投2休(5週間)、1回/週(6週目以降)
			サイメリン 1mg/kg 2ヶ月に1回
			放射線照射
			副作用: 発熱、骨髄抑制、蛋白尿、食欲不振、悪心嘔吐
悪性神経膠腫 (C71)	AADC-0104	Temodal	

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			テモダール 経口又は点滴静注 初発)放射線照射との併用 テモゾロミドとして1回75mg/m ² 1日1回連日42日間投与し4週間休薬 その後本剤単独にて、テモゾロミドとして1回150mg/m ² を1日1回連日5日間 投与し、23日間休薬。28日間1クール 再発) テモゾロミドとして1回150mg/m ² 1日1回連日5日間投与し23日間休薬 28日間1クール
			副作用: 放射線照射との併用 脱毛、悪心・嘔吐、疲労 併用後の単独投与時 疲労、脱毛、悪心・嘔吐、食欲不振、頭痛、便秘
悪性神経腫瘍 (G71)	AADC-0197	BV+RT/TMZ 療法	ベバシズマブ 1回10mg/kgを2週間間隔で計4回点滴静注 テモダール 1回75mg/m ² 1日1回連日経口投与 放射線照射 2Gy/日 週5日 総線量60Gy その後 ベバシズマブ 1回10mg/kgを2週間間隔点滴静注 テモダール 1回150mg～200mg/m ² 1日1回連日5日間経口投与し23日間休薬 28日間1クール その後 ベバシズマブ 1回15mg/kgを3週間間隔点滴静注 PDになるまで 副作用: 脳出血、粘膜皮膚出血、動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、創傷治癒遅延 骨髄抑制、感染症、高血圧、蛋白尿、可逆性後白質脳症症候群、消化管穿孔 うつ血性心不全、疲労、脱毛、悪心・嘔吐、食欲不振、頭痛、便秘
悪性神経腫瘍 (G71)	AADC-0198	Gliadel	ギリアデル 腫瘍切除腔の大きさや形状に応じて、8枚または適宜減じた枚数を 脳腫瘍切除術時の切除面を被覆するように留置 副作用: 脳浮腫、発熱、リンパ球数減少、片麻痺、悪心、嘔吐、食欲減退 頭痛、肝機能異常、痙攣、創傷治癒不良、血栓塞栓症
悪性リンパ腫 (G72)	AADC-0116	髄注MTX+PSL療法	MTX 15mg PSL 20mg 髄液中悪性リンパ腫細胞が陰性化するまで2回/週 繰り返し施行 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、口内炎、下痢、腎機能障害、
悪性リンパ腫 (G72)	AADC-0118	high dose MTX	MTX 3.5g/m ² 24時間点滴 LV 15mg/body 静注 LVはMTX終了12時間後から6時間毎に投与 副作用: 骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、口内炎、下痢、腎機能障害、 肝機能障害、食欲不振
悪性リンパ腫 (G72)	AADC-0267	Tirabrutinib	チラブルチニブ 1回480mg (80mgを6錠) 1日1回 空腹時経口投与 連日 副作用: 感染症、皮膚障害、骨髄抑制、過敏症、間質性肺疾患 肝機能障害、出血、下痢、悪心嘔吐 高カリウム血症、高トリグリセリド血症
甲状腺癌 (G73)	AADC-0160	Sorafenib	用法・用量 1回400mg 1日2回 経口投与 適宜増減 副作用: 手足症候群、剥脱性皮膚炎、発疹、脱毛、下痢、高血圧、疲労 食欲不振、そう痒感、体重減少、肝機能障害、出血 間質性肺炎、急性肺障害、高血圧クリーゼ、可逆性後白室脳症 皮膚粘膜眼症候群、消化管穿孔、心筋虚血・心筋梗塞
甲状腺癌 (G73)	AADC-0222	Lenvatinib	用法・用量 1回24mg 1日1回

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
			副作用:	高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労 口内炎、蛋白尿、手掌・足底発赤知覚不全症候群、出 動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔 可逆性後白質脳症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延 低カルシウム血症	
甲状腺癌 (C73) BRAF遺伝子変異陽性	AADC-0357	Encorafenib+Binimetinib	Encorafenib Binimetinib 副作用:	1回450mg 1日1回経口投与 1回45mg 1日2回経口投与 手足症候群、眼障害、心機能障害、肝障害、横紋筋融解症 高血圧、出血、腫瘍崩壊症候群	
甲状腺癌 (C73) RET遺伝子変異陽性	AADC-0384	Selpercatinib	Selpercatinib 副作用:	1回160mg 1日2回経口投与 肝機能障害、QT間隔延長、過敏症、高血圧 間質性肺疾患、骨端離開および骨成長の異常、出血 口内乾燥、下痢、疲労、便秘、悪心、口内炎、腹痛 浮腫、発熱、食欲減退、頭痛、発疹 骨髄抑制、血中クレアチニン増加	
悪性リンパ腫 (C77) 非ホジキンリンパ腫	AADC-0048	CHOP療法	CPA DXR VCR PSL 1クール: 3週 副作用:	750mg/m ² day1 50mg/m ² day1 1.4mg/m ² day1 100mg/body day1～5 骨髄抑制、心毒性、末梢神経障害、肝障害、悪心・嘔吐、脱毛、出血性膀胱炎	
悪性リンパ腫 (C77) 非ホジキンリンパ腫	AADC-0049	R-CHOP療法	リツキシマブ CPA DXR VCR PSL 1クール: 3週 副作用:	375mg/m ² (CHOP療法の前日) 750mg/m ² day1 50mg/m ² day1 1.4mg/m ² day1 100mg/body day1～5 全身浮腫、呼吸障害、発熱、悪寒、頭痛、血圧上昇、発疹、骨髄抑制、悪心・嘔吐 出血性膀胱炎、心毒性、末梢神経障害、肝障害、脱毛、下肢深部反射減弱・消失、	
悪性リンパ腫 (C77) 非ホジキンリンパ腫	AADC-0236	High dose MTX + High dose Ara-C	MTX MTX ソル・メルコート キロサイト 1クール: 3週 副作用:	200mg/m ² day1 800mg/m ² 持続 day1 50mg/body day1～3 6000mg/m ² /日 day2～3 骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、口内炎、下痢、腎機能障害、 肝機能障害、食欲不振、間質性肺炎、急性呼吸促進症候群 中枢神経障害、代謝異常	
原発不明癌 (C80)	AADC-0015	GEM	GEM 副作用:	1000 mg/m ² を週1回 3回投与 1週休薬 1000 mg/m ² を2週間に1回 骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感	
原発不明癌 (C80)	AADC-0225	Nivolumab	ニボルマブ 副作用:	240mg/body 2週間隔 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害 腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
原発不明癌 (C80)	AADC-0272	4週毎 Nivolumab	ニボルマブ 副作用:	480mg/body 4週間隔 発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症 大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
リンパ性白血病(C91)	AADC-0319	Acalabrutinib	用法・用量 1回100mg 1日2回 経口投与
再発又は難治性の慢性リンパ性白血病			副作用: 下痢、悪心・嘔吐、頭痛
			骨髄抑制、感染症、出血
			不整脈、虚血性心疾患、間質性肺疾患
			腫瘍崩壊症候群、二次性悪性腫瘍
骨髄異形成症候群(D46)	AADC-0301	Azacitidine 皮下注	アザシチジン 75mg/m ² day1-7 皮下注
			21日間休薬
			副作用: 骨髄抑制、感染症、出血、腎尿管アシドーシス、低血圧
			食欲不振、便秘、悪心、口内炎、下痢
			発疹、掻痒、倦怠感、発熱、注射部位反応、注射部位紅斑
骨髄異形成症候群(D46)	AADC-0302	Azacitidine 点滴静注	アザシチジン 75mg/m ² day1-7 10分かけて点滴静注
			21日間休薬
			副作用: 骨髄抑制、感染症、出血、腎尿管アシドーシス、低血圧
			食欲不振、便秘、悪心、口内炎、下痢
			発疹、掻痒、倦怠感、発熱
固形癌(MSI-High)	AADC-0235	Pembrolizumab	ペムブロリズマブ 1回200mg 3週間隔
			副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症
			甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐
			口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害
			肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害
			肺炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
固形癌(MSI-High)	AADC-0268	Pembrolizumab(6週間)	ペムブロリズマブ 1回400mg 6週間隔
			副作用: 骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症
			甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐
			口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害
			肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害
			肺炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
固形癌(NTRK融合遺伝子陽性)	AADC-0346	Larotrectinib	ラロトレクチニブ 1回 100mg、1日2回、連日経口投与
			副作用: 浮動性めまい、頭痛、末梢性感覚ニューロパシー
			肝機能障害、骨髄抑制
			疲労、筋肉痛、関節痛
固形癌(RET融合遺伝子陽性)	AADC-0384	Selpercatinib	Selpercatinib 1回160mg 1日2回経口投与
			副作用: 肝機能障害、QT間隔延長、過敏症、高血圧
			間質性肺疾患、骨端離開および骨成長の異常、出血
			口内乾燥、下痢、疲労、便秘、悪心、口内炎、腹痛
			浮腫、発熱、食欲減退、頭痛、発疹
			骨髄抑制、血中クレアチニン増加
固形癌(標準治療終了)	AADC-0264	Trastuzumab Deruxtecan	Trastuzumab Deruxtecan 5.4mg/kg day1
			3週ごと
			副作用: 間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション
			骨髄抑制、脱毛、疲労、悪心・嘔吐、下痢、便秘、口内炎
小細胞癌(臓器横断的)	AADC-0023	CBDCA+ETP療法(CE)	VP-16 80mg/m ² day1~3
			CBDCA 目標AUC=5/body day1
			3~4週ごと
			副作用: 骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振

がんの部位 (ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
フォン・ヒッペル・リンドウ病関連腫瘍	AADC-0376	Belzutifan	ベルズチファン
			1回 120mg、1日1回、連日経口投与
			副作用:
			貧血、低酸素症
			出血、骨折