がん治療薬剤承認レジメン一覧

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等			
頭頸部癌(C00)	*AADC-0001*	*S-1(CG)*				
			用法	a.4週投与　2週休薬法		
				b.2週投与　1週休薬法(副作用の軽減を目的)		
			用量	朝食後および夕食後の1日2回		
				体表面積	1.25㎡未満	40mg/回
					1.25から1.5㎡未満	50mg/回
					1.5㎡以上	60mg/回
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹		
				流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、		
頭頸部癌(C00)	*AADC-0091*	*tri-weekly DTX*				
			DTX	60mg/㎡	day1	
			3週ごと			
			副作用:	脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制		
				肝機能障害、腎機能障害		
頭頸部癌(C00)	*AADC-0008*	*DCF 療法*				
			CDDP 80 mg/㎡		day1	
			TXT 70mg/㎡		day1	
			5Fu 800 mg/㎡		day1からday5	
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害,口内炎		
				脱毛、食欲不振、全身倦怠感、発熱、		
頭頸部癌(C00)	*AADC-0182*	*Cetuximab + FP*				
			セツキシマブ	初回400 mg/㎡ 、2回目以降250 mg/㎡		毎週点滴静注
			CDDP	100 mg/㎡	day1	3週に1回
			5Fu	1000 mg/㎡/day	day1～day4	3週に1回
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛		
				ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、低マグネシウム血症、間質性肺炎、		
				掻痒感、infusion reaction、食欲不振、疲労感、心不全、血栓塞栓症		
頭頸部癌(C00)	*AADC-0225*	*Nivolumab*	ニボルマブ	240mg/body	2週間隔	
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症		
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害		
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション		
頭頸部癌(C00)	*AADC-0272*	*4週毎 Nivolumab*	ニボルマブ	480mg/body	4週間隔	
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症		
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害		
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション		
頭頸部癌(C00)	*AADC-0235*	*Pembrolizumab*	ペムブロリズマブ	1回200mg	3週間隔	
			副作用:	骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症		
				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐		
				口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害		
				肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害		
				膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎		
頭頸部癌(C00)	*AADC-0268*	*Pembrolizumab(6週間)*	ペムブロリズマブ	1回400mg	6週間隔	
			副作用:	骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症		
				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐		
				口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害		
				肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害		
				膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎		
食道癌(C15)	*AADC-0007*	*CDDP+5-FU 療法(FP)*				
			CDDP	10 mg/body	day1からday5	
			5Fu	500 mg/㎡	day1からday5	
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛		

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等			
食道癌(C15)	*AADC-0008*	*DCF療法*				
			CDDP 80 mg/㎡		day1	
			TXT 70mg/㎡		day1	
			5Fu 800 mg/㎡		day1からday5	
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害,口内炎		
				脱毛、食欲不振、全身倦怠感、発熱、		
食道癌(C15)	*AADC-0105*	*FP+IMRT療法*				
			5-FU	500 mg/body	day1からday5	
			CDDP	5 mg/body	day1からday5	
			トモセラピー	2Gy/body	day1からday5	
			day6,7は休薬 6週連続 (到達目標60Gy)			
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛		
食道癌(C15)	*AADC-0164*	*DTX*				
			DTX	70mg/㎡	day1	
			3週ごと			
			副作用:	脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制		
				肝機能障害、腎機能障害		
食道癌(C15)	*AADC-0184*	*IMRT+FP*				
			CDDP	70 mg/㎡	day1	
			5Fu	700 mg/㎡	day1からday5	
			IMRT	50Gy 25分割		
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛		
				食道炎、心嚢水貯留、胸水貯留、肺臓炎		
			化学療法は4週毎に繰り返す			
食道癌(C15)	*AADC-0185*	*FP*				
			CDDP	80 mg/㎡	day1	
			5Fu	800 mg/㎡	day1からday5	
			4週毎			
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎、脱毛		
食道癌(C15)	*AADC-0227*	*PTX(6投2休)*	PTX	100 mg/㎡	day1.8.15.22.29.36	少なくとも2週休薬
			副作用:	脱毛、発疹、爪の障害、感覚減退、味覚異常、浮動性めまい、疲労		
				浮腫、発熱、悪心、嘔吐、下痢、便秘、食欲不振、口内炎、筋痛、関節痛		
				骨髄抑制、末梢神経障害、間質性肺炎		
食道癌(C15)	*AADC-0233*	*Nedaplatin + 5-FU*	Nedaplatin	90 mg/㎡	day1	
			5Fu	800 mg/㎡ /day	day1からday5	
			4週毎			
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、腎機能障害、口内炎、脱毛、肝機能異常		
				色素沈着、ショック、アナフィラキシー、電解質異常、間質性肺炎		
食道癌(C15)	*AADC-0014*	*mFOLFOX6療法*	L-OHP	85mg/㎡	day1	
			5-FU(bolus)	400mg/㎡	day1	
			5-FU(infusion)	2400mg/㎡	46～48hr	
			l-LV	200mg/㎡	day1	
					2週ごと	
			副作用:	末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢		
				発熱		
食道癌(C15)	*AADC-0225*	*Nivolumab*	ニボルマブ	240mg/body	2週間隔	(術後補助の場合投与は1年間)
がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症		
術前治療でpCRでなかったStageⅡ/Ⅲの術後補助				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害		
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション		
食道癌(C15)	*AADC-0272*	*4週毎 Nivolumab*	ニボルマブ	480mg/body	4週間隔	(術後補助の場合投与は1年間)
がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症		
術前治療でpCRでなかったStageⅡ/Ⅲの術後補助				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害		
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション		

がんの部位（ICD-Oコード）	承認番号	レジメン名称	用法等		
食道癌（C15）	*AADC-0298*	*Pembrolizumab+5-FU+CDDP*	ペムブロリズマブ	1回200mg	day1
			CDDP	80 mg/㎡	day1
			5FU	800 mg/㎡	day1からday5
			3週毎		
			副作用：	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎	
				インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症	
				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感	
				肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害	
				下垂体機能障害、1型糖尿病	
				膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎	
食道癌（C15）	*AADC-0300*	*DCF療法(術前)*	CDDP 70 mg/㎡	day1	
切除可能、局所進行食道扁平上皮癌(cT1N1-3M0,cT2-3N0-3M0)			DTX 70mg/㎡	day1	
年齢20歳以上75歳以下mECOG PS 0-1			5Fu 750 mg/㎡	day1からday5	
			3週毎に3回施行		
			副作用：	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害,口内炎	
				脱毛、食欲不振、全身倦怠感、発熱、	
食道癌（C15）	*AADC-0309*	*Nivolumab+ipilimumab*	Nivolumab	240mg/body	2週間隔
			Ipilimumab	1mg/kg	6週間隔
			副作用：	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
				血球貪食症候群、結核	
食道癌（C15）	*AADC-0310*	*Nivolumab+FP*	ニボルマブ	240mg/body	2週間隔
			CDDP	80 mg/㎡	day1
			5Fu	800 mg/㎡	day1からday5
			4週毎		
			副作用：	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎	
				インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症	
				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感	
				肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害	
				下垂体機能障害、1型糖尿病	
				膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎	
食道癌（C15）	*AADC-0373*	*Tislelizumab+FP*	Tislelizumab	200mg/body	day1
根治切除不能な進行・再発			CDDP	80 mg/㎡	day1
			5FU	800 mg/㎡	day1からday5
			3週毎		
			副作用：	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎	
				インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症	
				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感	
				肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害	
				下垂体機能障害、1型糖尿病	
				膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎	
食道癌（C15）	*AADC-0374*	*Tislelizumab*	Tislelizumab	200mg/body	3週間隔
がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発			副作用：	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
胃癌（C16）	*AADC-0001*	*S-1(CG)*			
			用法	a.4週投与　2週休薬法	
				b.2週投与　1週休薬法（副作用の軽減を目的）	
			用量	朝食後および夕食後の1日2回	
				体表面積　1.25㎡未満	40mg/回

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等			
				1.25から1.5㎡未満		50mg/回
				1.5㎡以上		60mg/回
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹		
				流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、		
胃癌(C16)	*AADC-0002*	*S-1+CDDP 療法*	TS-1 3週投与2週休薬			
			TS-1開始8日目にCDDP60 mg/㎡			
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹		
				流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、		
胃癌(C16)	*AADC-0003*	*PTX*	a. 70 mg/㎡を1週に1回 3回投与 1週休薬			
			b. 80 mg/㎡を2週に1回 もしくは 3週に1回			
			副作用:	脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害		
				筋肉痛、関節痛、悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常		
胃癌(C16)	*AADC-0006*	*CPT-11+ CDDP療法(IP)*				
			CDDP	80 mg/㎡	day1	
			CPT-11	70 mg/㎡	day1,15	
			4週毎			
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、全身倦怠感		
				末梢神経障害、脱毛		
胃癌(C16)	*AADC-0014*	*mFOLFOX6療法*				
			L-OHP	85mg/㎡	day1	
			5-FU(bolus)	400mg/㎡	day1	
			5-FU(infusion)	2400mg/㎡	46～48hr	
			l-LV	200mg/㎡	day1	
					2週ごと	
			副作用:	末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢		
				発熱		
胃癌(C16)	*AADC-0085*	*CPT-11*				
			CPT-11	150 mg/㎡	2週に1回	
			副作用:	下痢、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、骨髄抑制、肝機能障害		
胃癌(C16)	*AADC-0101*	*外来 CPT-11+CDDP療法(IP)*				
			CDDP	30 mg/㎡	day1,15	
			CPT-11	60 mg/㎡	day1,15	
			4週毎			
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、全身倦怠感		
				末梢神経障害、脱毛		
胃癌(C16)	*AADC-0122*	*S-1+DTX 療法*				
			TS-1	2週投与1週休薬		
				朝食後および夕食後の1日2回		
				80 mg/㎡/day		
			DTX	40 mg/㎡	day1	
			3週毎			
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、色素沈着、神経障害、脱毛		
				浮腫、悪心・嘔吐、流涙、結膜炎、角膜炎、肝機能障害、		
胃癌(C16)	*AADC-0134*	*XELOX 療法*	カペシタビン	1日2回	14日間内服7日間休薬	
				体表面積	1.36㎡未満	1200mg/回
					1.36以上1.66㎡未満	1500mg/回
					1.66以上1.96㎡未満	1800mg/回
					1.96㎡以上	2100mg/回
			L-OHP	130mg/㎡	day1 3週ごと	
			副作用:	手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加		
				口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着		
胃癌(C16)	*AADC-0150*	*tri-weekly Abraxane*	アブラキサン	1回 260mg/㎡	3週毎	
			副作用:	脱毛、疲労、筋痛、末梢神経障害、骨髄抑制、下痢、悪心嘔吐		

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
胃癌(C16)	*AADC-0153*	*tri weekly Trastuzumab + XP療法*	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	8mg/kg day1	(2回目からは6mg/kg)
			CDDP	80 mg/㎡ day1	
			カペシタビン	1日2回1回1000mg/㎡	day1夕からday15朝まで内服その後7日間休薬
			3週毎		
			副作用:	発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制、下痢、口内炎、色素沈着	
				手足症候群、血中ビリルビン増加、腎機能障害、脱毛、末梢神経障害	
胃癌(C16)	*AADC-0154*	*DCS療法*			
			TS-1	朝食後および夕食後の1日2回	
				80 mg/㎡/day	day1夕からday15朝まで内服その後14日間休薬
			DTX	35 mg/㎡ day1、day15	
			CDDP	35 mg/㎡ day1、day15	
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、色素沈着、神経障害、脱毛	
				浮腫、悪心・嘔吐、腎機能障害、下痢	
胃癌(C16)	*AADC-0179*	*DTX*			
			DTX	75mg/㎡ day1	
			3週ごと		
			副作用:	脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制	
				肝機能障害、腎機能障害、間質性肺炎	
胃癌(C16)	*AADC-0213*	*SOX*	L-OHP	130mg/㎡ day1 3週ごと	
			TS-1	朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14 3週ごと	
				体表面積 1.25㎡未満	40mg/回
				1.25から1.5㎡未満	50mg/回
				1.5㎡以上	60mg/回
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹	
				末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック	
胃癌(C16)	*AADC-0219*	*RAM療法*	RAM	8mg/kg day1 2週ごと	
一次治療が無効の治癒切除不能胃癌			副作用:	腹痛、高血圧、下痢、	
				動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害	
				インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血	
				骨髄抑制、低カリウム血症、低ナトリウム血症	
胃癌(C16)	*AADC-0220*	*PTX+RAM療法*	RAM	8mg/kg day1 2週ごと	
一次治療が無効の治癒切除不能胃癌			PTX	70mg/㎡ day1、8 2週ごと	
			副作用:	腹痛、高血圧、下痢、疲労、無力症、末梢性浮腫	
				口内炎、肝機能障害、呼吸困難、蛋白尿、発疹、皮膚乾燥	
				動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害	
				インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血	
				骨髄抑制、低アルブミン血症、低ナトリウム血症、ざ瘡様皮膚炎	
				眼瞼浮腫、顔面浮腫、鼻出血	
胃癌(C16)	*AADC-0225*	*Nivolumab*	ニボルマブ	240mg/body 2週間隔	
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
胃癌(C16)	*AADC-0253*	*Weekly nab-PTX*	nab-PTX	100mg/㎡ 週1回投与 3週連続投与1週休薬	
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感	
				脱毛、末梢神経障害、発疹、下痢	
胃癌(C16)	*AADC-0206*	*Trifluridine*	トリフルリジン	1回35mg/㎡を1日2回	
				5日間連続経口投与した後2日間休薬し、これを2回繰り返した後	
				14日間休む	
				1コース28日間	
			副作用:	骨髄抑制、悪心、食欲減退、疲労、下痢、嘔吐、口内炎、感染症、間質性肺炎	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等			
胃癌(C16)	*AADC-0272*	*4週毎 Nivolumab*	ニボルマブ	480mg/body	4週間隔	
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症		
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害		
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション		
胃癌(C16)	*AADC-0273*	*Trastuzumab Deruxtecan*	Trastuzumab Deruxtec	6.4mg/kg	day1	
HER2陽性切除不能進行再発			3週ごと			
			副作用:	間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション		
				骨髄抑制、脱毛、疲労、悪心・嘔吐、下痢、便秘、口内炎		
胃癌(C16)	*AADC-0295*	*Nivolumab+CAPOX*	ニボルマブ	360mg/body	day1	3週ごと
			カペシタビン	1日2回	14日間内服7日間休薬	
				体表面積	1.36㎡未満	1200mg/回
					1.36以上1.66㎡未満	1500mg/回
					1.66以上1.96㎡未満	1800mg/回
					1.96㎡以上	2100mg/回
			L-OHP	130mg/㎡	day1	3週ごと
			副作用:	手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加		
				口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着		
				発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症		
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害		
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション		
胃癌(C16)	*AADC-0296*	*Nivolumab+SOX*	ニボルマブ	360mg/body	day1	3週ごと
			L-OHP	130mg/㎡	day1	3週ごと
			TS-1	朝食後および夕食後の1日2回	day1～day14 3週ごと	
				体表面積	1.25㎡未満	40mg/回
					1.25から1.5㎡未満	50mg/回
					1.5㎡以上	60mg/回
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹		
				末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック		
				発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症		
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害		
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション		
胃癌(C16)	*AADC-0297*	*Nivolimab+mFOLFOX6*	ニボルマブ	240mg/body	day1	
			L-OHP	85mg/㎡	day1	
			5-FU(bolus)	400mg/㎡	day1	
			5-FU(infusion)	2400mg/㎡	46～48hr	
			l-LV	200mg/㎡	day1	
					2週ごと	
			副作用:	末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢		
				発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症		
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害		
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション		
胃癌(C16)	*AADC-0353*	*Pembrolizumab+CAPOX*	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	3週ごと
			カペシタビン	1日2回	14日間内服7日間休薬	
				体表面積	1.36㎡未満	1200mg/回
					1.36以上1.66㎡未満	1500mg/回
					1.66以上1.96㎡未満	1800mg/回
					1.96㎡以上	2100mg/回
			L-OHP	130mg/㎡	day1	3週ごと
			副作用:	手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加		
				口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着		
				発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症		
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害		
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション		

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等			
胃癌(C16)	*AADC-0354*	*Zolbetuximab+CAPOX*	ゾルベツキシマブ	初回 800mg/㎡(2回目以降は600mg/㎡)		3週ごと
			カペシタビン	1日2回	14日間内服7日間休薬	
				体表面積	1.36㎡未満	1200mg/回
					1.36以上1.66㎡未満	1500mg/回
					1.66以上1.96㎡未満	1800mg/回
					1.96㎡以上	2100mg/回
			L-OHP	130mg/㎡	day1	3週ごと
			副作用:	重度の悪心・嘔吐、過敏症、インフュージョンリアクション		
				手足症候群、骨髄抑制、下痢、血中ビリルビン増加		
				口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着		
胃癌(C16)	*AADC-0355*	*Zolbetuximab+mFOLFOX6*	ゾルベツキシマブ	初回 800mg/㎡(2回目以降は600mg/㎡)		3週ごと
			L-OHP	85mg/㎡	day1	
			5-FU(bolus)	400mg/㎡	day1	
			5-FU(infusion)	2400mg/㎡	46～48hr	
			l-LV	200mg/㎡	day1	
					2週ごと	
			副作用:	重度の悪心・嘔吐、過敏症、インフュージョンリアクション		
				末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、倦怠感、下痢		
				発熱、高血圧		
胃癌(C16)	*AADC-0370*	*Pembrolizumab+Trastuzumab+CAPOX*	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	
HER2陽性かつCPS≧1の進行再発胃癌			ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	8mg/kg	day1	(2回目からは6mg/kg)
			カペシタビン	1日2回	14日間内服7日間休薬	
				体表面積	1.36㎡未満	1200mg/回
					1.36以上1.66㎡未満	1500mg/回
					1.66以上1.96㎡未満	1800mg/回
					1.96㎡以上	2100mg/回
			L-OHP	130mg/㎡	day1	
			3週ごと			
			副作用:	手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加		
				口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着		
				発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症		
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害		
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション		
胃癌(C16)	*AADC-0371*	*Pembrolizumab+Trastuzumab+FP*	ペムブロリズマブ	1回200mg		day1
HER2陽性かつCPS≧1の進行再発胃癌			ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	8mg/kg (2回目からは6mg/kg)		day1
			CDDP	80 mg/㎡		day1
			5FU	800 mg/㎡		day1からday5
			3週毎			
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎		
				インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症		
				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感		
				肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害		
				下垂体機能障害、1型糖尿病		
				膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎		
胃癌(C16)	*AADC-0398*	*D-FLOT*	Durvalumab	1500mg/body	点滴	day1
根治切除可能臨床病期Ⅱ～ⅣAの胃癌・胃食道接合部癌			L-OHP	85mg/㎡	点滴	day1、15
			DTX	50mg/㎡	点滴	day1、15
			5-FU	2600mg/㎡	24時間持続点滴	day1、15
			l-LV	200mg/㎡	点滴	day1、15
			4週毎	術前1-2サイクル		
				術後1-2サイクル		
			Durvalumab	1500mg/body	点滴	day1
			4週毎	術後3-12サイクル		
			副作用:	末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢、脱毛		

がんの部位（ICD-Oコード）	承認番号	レジメン名称	用法等			
				発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症		
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害		
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション		
胃癌（C16）	*AADC-0400*	*Tislelizumab+CAPOX*	Tislelizumab	200mg/body	day1	
HER2陰性の治癒切除不能な進行・再発の胃/食道接合部 腺癌			カペシタビン	1日2回	14日間内服7日間休薬	
				体表面積	1.36㎡未満	1200mg/回
					1.36以上1.66㎡未満	1500mg/回
					1.66以上1.96㎡未満	1800mg/回
					1.96㎡以上	2100mg/回
			L-OHP	130mg/㎡	day1	3週ごと
			副作用：	手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加		
				口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着		
				発熱、倦怠感、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症		
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害		
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション		
胃癌（C16）	*AADC-0401*	*Tislelizumab+FP*	Tislelizumab	200mg/body	day1	
HER2陰性の治癒切除不能な進行・再発の胃/食道接合部 腺癌			CDDP	80 mg/㎡	day1	
			5FU	800 mg/㎡	day1からday5	
			3週毎			
			副作用：	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、腎機能障害、末梢神経障害、口内炎		
				インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症		
				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感		
				肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害		
				下垂体機能障害、1型糖尿病		
				膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎		
GIST(C16～C17)	*AADC-0009*	*Glivec*	イマチニブ1日1回400mgを食後に投与			
			副作用：	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、浮腫、発疹、倦怠感、電解質異常		
				肝機能障害、血中アルブミン減少		
GIST(C16～C17)	*AADC-0112*	*Sutent*	スニチニブ1日1回50mg			
			4週間連続投与2週間休薬			
			副作用：	骨髄抑制、皮膚変色、手足症候群、食欲不振、肝機能異常、疲労感		
				味覚異常、口内炎、下痢、悪心、歯肉炎、代謝異常、浮腫、発熱、高血圧		
GIST(C16～C17)	*AADC-0316*	*Pimitespib*	ピミテスピブ　1日1回　160mg　空腹時			
			5日間連続経口投与後2日間休薬			
			副作用：	下痢、食欲不振、倦怠感、悪心、血清クレアチニン上昇		
				腎機能低下、夜盲症、貧血		
大腸癌（C18）	*AADC-0001*	*S-1(CG)*				
			用法	a.4週投与　2週休薬法		
				b.2週投与　1週休薬法（副作用の軽減を目的）		
			用量	朝食後および夕食後の1日2回		
				体表面積	1.25㎡未満	40mg/回
					1.25から1.5㎡未満	50mg/回
					1.5㎡以上	60mg/回
			副作用：	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹		
大腸癌（C18）	*AADC-0010*	*UFT(UFTE)*				
			用法・用量	1日量としてテガフール300-600mgを1日2-3回に分割投与		
			副作用：	食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害		
大腸癌（C18）	*AADC-0011*	*UFT(UFT-E)/LV 療法*				
			UFT-E　300mg/㎡/日　1日3回に分けて			
			LV　75mg/日　1日3回に分けて　食間に服用			

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
			4週投与　1週休薬		
			副作用:	食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害	
大腸癌(C18)	*AADC-0014*	*mFOLFOX6療法*			
			L-OHP	85mg/㎡	day1
			5-FU(bolus)	400mg/㎡	day1
			5-FU(infusion)	2400mg/㎡	46～48hr
			l-LV	200mg/㎡	day1
					2週ごと
			副作用:	末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢	
				発熱	
大腸癌(C18)	*AADC-0084*	*FOLFIRI療法*			
			5-FU(bolus)	400mg/㎡	day1
			5-FU(infusion)	2400mg/㎡	46～48hr
			l-LV	200mg/㎡	day1
			CPT-11	150mg/㎡	day1
					2週ごと
			副作用:	食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛	
大腸癌(C18)	*AADC-0092*	*Bevacizumab based mFOLFOX6療法*			
			ベバシズマブ	1回5mg/kgまたは10mg/kg	day1
			L-OHP	85mg/㎡	day1
			5-FU(bolus)	400mg/㎡	day1
			5-FU(infusion)	2400mg/㎡	46～48hr
			l-LV	200mg/㎡	day1
					2週ごと
			副作用:	末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐倦怠感、下痢	
				発熱、消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症	
				高血圧性クリーゼ	
大腸癌(C18)	*AADC-0093*	*Bevacizumab based FOLFIRI療法*			
			ベバシズマブ	1回5mg/kgまたは10mg/kg	day1
			5-FU(bolus)	400mg/㎡	day1
			5-FU(infusion)	2400mg/㎡	46～48hr
			l-LV	200mg/㎡	day1
			CPT-11	150mg/㎡	day1
					2週ごと
			副作用:	食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛、発熱	
				消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症	
				高血圧性クリーゼ	
大腸癌(C18)	*AADC-0099*	*5-FU/LV療法*			
			5-FU(bolus)	400mg/㎡	day1
			5-FU(infusion)	2400mg/㎡	46～48hr
			l-LV	200mg/㎡	day1
			2週ごと		
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、口内炎、手足症候群、脱毛	
				全身倦怠感、肝機能障害、下痢	
大腸癌(C18)	*AADC-0102*	*Xeloda*			
			カペシタビン　1日2回	2週連続投与　1週休薬	
				体表面積　1.33㎡未満	1500mg/回
				1.33から1.57㎡未満	1800mg/回
				1.57から1.81㎡未満	2100mg/回
				1.81㎡以上	2400mg/回
			副作用:	手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加	
				口内炎	
大腸癌(C18)	*AADC-0107*	*Bevacizumab based 5-FU/LV療法*			
			ベバシズマブ	1回5mg/kgまたは10mg/kg	day1
			5-FU(bolus)	400mg/㎡	day1
			5-FU(infusion)	2400mg/㎡	46～48hr
			l-LV	200mg/㎡	day1

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等			
			2週ごと			
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、口内炎、手足症候群、脱毛		
				全身倦怠感、肝機能障害、下痢、高血圧性クリーゼ		
				消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症		
大腸癌(C18)	*AADC-0108*	*UFT/LV+IMRT療法*				
			UFT 300mg/㎡/日 1日3回に分けて			
			LV 75mg/日 1日3回に分けて 食間に服用			
				ﾄﾓｾﾗﾋﾟｰ実施日day1～5		
			トモセラピー 2Gy/day (day1～5まで行い、day6,7は中止)			
			4週連続投与(到達目標40Gy)			
			副作用:	食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害		
大腸癌(C18)	*AADC-0109*	*Cetuximab + FOLFIRI 療法*				
			セツキシマブ	初回 400mg/㎡(2回目以降は250mg/㎡)	day1	週1回
			CPT-11	150mg/㎡(75歳以上は120mg/㎡)	day1	2週ごと
			l-LV	200mg/㎡	day1	2週ごと
			5-FU(bolus)	400mg/㎡	day1	2週ごと
			5-FU(infusion)	2400mg/㎡	46～48hr	2週ごと
			副作用:	食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛、発熱		
				ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、		
				掻痒感、infusion reaction		
大腸癌(C18)	*AADC-0110*	*Cetuximab + CPT-11 療法*				
			セツキシマブ	初回 400mg/㎡(2回目以降は250mg/㎡)	day1	週1回
			CPT-11	150mg/㎡(75歳以上は120mg/㎡)	day1	2週ごと
			副作用:	ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、		
				掻痒感、infusion reaction、食欲不振、下痢、悪心・嘔吐		
				脱毛、疲労感、骨髄抑制		
大腸癌(C18)	*AADC-0115*	*Cetuximab*				
			セツキシマブ	初回 400mg/㎡(2回目以降は250mg/㎡)	day1	
			週1回			
			副作用:	ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、		
				掻痒感、infusion reaction、下痢		
大腸癌(C18)	*AADC-0134*	*XELOX 療法*				
			カペシタビン	1日2回	14日間内服7日間休薬	
				体表面積	1.36㎡未満	1200mg/回
					1.36以上1.66㎡未満	1500mg/回
					1.66以上1.96㎡未満	1800mg/回
					1.96㎡以上	2100mg/回
			L-OHP	130mg/㎡	day1	3週ごと
			副作用:	手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加		
				口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着		
大腸癌(C18)	*AADC-0135*	*Bevacizumab based XELOX 療法*				
			ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1	3週ごと
			カペシタビン	1日2回	14日間内服7日間休薬	
				体表面積	1.36㎡未満	1200mg/回
					1.36以上1.66㎡未満	1500mg/回
					1.66以上1.96㎡未満	1800mg/回
					1.96㎡以上	2100mg/回
			L-OHP	130mg/㎡	day1	3週ごと
			副作用:	手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加		
				口内炎、神経症状、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着		
				消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症		
				高血圧性クリーゼ		
大腸癌(C18)	*AADC-0136*	*S-1+CPT-11*	S-1	80mg/㎡	2週投与1週休薬	
			CPT-11	150 mg/㎡	day1	
			3週毎			
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹、脱毛		
大腸癌(C18)	*AADC-0140*	*Bevacizumab based XELODA 療法*				

がんの部位（ICD-Oコード）	承認番号	レジメン名称	用法等			
			ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1	3週ごと
			カペシタビン	1日2回	14日間内服7日間休薬	
				体表面積	1.36㎡未満	1200mg/回
					1.36以上1.66㎡未満	1500mg/回
					1.66以上1.96㎡未満	1800mg/回
					1.96㎡以上	2100mg/回
			副作用：	手足症候群、骨髄抑制、悪心、食欲不振、下痢、血中ビリルビン増加		
				口内炎、アレルギー症状、全身倦怠感、味覚障害、色素沈着		
				消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症		
				高血圧性クリーゼ		
大腸癌（C18）	*AADC-0146*	*Panitumumab*				
			パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	2週毎
			副作用：	infusion reaction、ざ瘡、皮膚乾燥、発疹、掻痒、爪周炎、低ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ血症		
				疲労、口内炎、食欲不振、下痢、間質性肺疾患		
大腸癌（C18）	*AADC-0147*	*Panitumumab based FORFIRI療法*				
			パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	
			5-FU（bolus）	400mg/㎡	day1	
			5-FU（infusion）	2400mg/㎡	46～48hr	
			l-LV	200mg/㎡	day1	
			CPT-11	150mg/㎡（76才以上は120mg/㎡）	day1	
			2週毎			
			副作用：	infusion reaction、ざ瘡、皮膚乾燥、発疹、掻痒、爪周炎、低ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ血症		
				疲労、口内炎、食欲不振、下痢、間質性肺疾患、悪心・嘔吐、骨髄抑制		
				肝機能障害、脱毛		
大腸癌（C18）	*AADC-0148*	*Panitumumab based FOLFOX療法*				
			パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	
			L-OHP	85mg/㎡	day1	
			5-FU（bolus）	400mg/㎡	day1	
			5-FU（infusion）	2400mg/㎡	46～48hr	
			l-LV	200mg/㎡	day1	
			2週毎			
			副作用：	infusion reaction、ざ瘡、皮膚乾燥、発疹、掻痒、爪周炎、低ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ血症		
				疲労、口内炎、食欲不振、下痢、間質性肺疾患、発熱		
				末梢神経障害、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐、倦怠感、		
大腸癌（C18）	*AADC-0168*	*Cetuximab based mFOLFOX6 療法*				
			セツキシマブ	初回 400mg/㎡（2回目以降は250mg/㎡）	day1	週1回
			L-OHP	85mg/㎡	day1	2週ごと
			5-FU（bolus）	400mg/㎡	day1	2週ごと
			5-FU（infusion）	2400mg/㎡	46～48hr	2週ごと
			l-LV	200mg/㎡	day1	2週ごと
			副作用：	ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、		
				掻痒感、infusion reaction、食欲不振、下痢、悪心・嘔吐、発熱		
				脱毛、疲労感、骨髄抑制、 末梢神経障害、注射部位反応、		
大腸癌（C18）	*AADC-0191*	*Regorafenib*				
治癒切除不能な進行・再発大腸癌			レゴラフェニブ	1日1回160mgを3週間連日経口投与、その後1週間休薬 これを繰り返す		
			副作用：	手足症候群、TEN、Stevens-Johhnson症候群、多形紅斑		
				肝機能障害、出血、血栓塞栓症、高血圧、高血圧クリーゼ、可逆性後白質脳症		
				消化管穿孔、下痢、食欲不振、口内炎、悪心・嘔吐、頻脈、発声障害、骨髄抑制		
				脱毛、掻痒、多汗症		
大腸癌（C18）	*AADC-0192*	*BV/SOX*				
治癒切除不能な進行・再発大腸癌			ベバシズマブ	5mg/kg	day1	3週ごと
			L-OHP	130mg/㎡	day1	3週ごと
			TS-1	朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14 3週ごと		
				体表面積	1.25㎡未満	40mg/回
					1.25から1.5㎡未満	50mg/回
					1.5㎡以上	60mg/回
			副作用：	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹		
				末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック、消化管穿孔		

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称		用法等		
				創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クリーゼ		
				可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、間質性肺炎		
				肝機能障害、脱毛、		
大腸癌(C18)	*AADC-0206*	*Trifluridine*	トリフルリジン	1回35mg/㎡を1日2回		
				5日間連続経口投与した後2日間休薬し、これを2回繰り返した後		
				14日間休む		
				1コース28日間		
			副作用:	骨髄抑制、悪心、食欲減退、疲労、下痢、嘔吐、口内炎、感染症、間質性肺炎		
大腸癌(C18)	*AADC-0213*	*SOX*	L-OHP	130mg/㎡	day1	3週ごと
			TS-1	朝食後および夕食後の1日2回	day1～day14	3週ごと
				体表面積 1.25㎡未満		40mg/回
				1.25から1.5㎡未満		50mg/回
				1.5㎡以上		60mg/回
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹		
				末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック		
大腸癌(C18)	*AADC-0214*	*Panitumumab+5-FU/LV*	パニツムマブ	6mg/kg	day1	
			5-FU(bolus)	400mg/㎡	day1	
			5-FU(infusion)	2400mg/㎡	46～48hr	
			l-LV	200mg/㎡	day1	
			2週毎			
			副作用:	Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、低マグネシウム血症、口内炎		
				ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎		
				骨髄抑制、感染症、肝機能障害、手足症候群		
大腸癌(C18)	*AADC-0215*	*Cetuximab+5-FU/LV*	セツキシマブ	初回 400mg/㎡(2回目以降は250mg/㎡)	day1	週1回
			5-FU(bolus)	400mg/㎡	day1	2週ごと
			5-FU(infusion)	2400mg/㎡	46～48hr	2週ごと
			l-LV	200mg/㎡	day1	2週ごと
			副作用:	Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、心不全、血栓塞栓症、口内炎		
				ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎		
				骨髄抑制、感染症、肝機能障害、手足症候群、低マグネシウム血症		
				末梢神経障害		
大腸癌(C18)	*AADC-0216*	*Panitumumab+CPT-11*	パニツムマブ	6mg/kg 点滴静注		
			CPT-11	150mg/㎡(76才以上は120mg/㎡)	day1	
			2週毎			
			副作用:	Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、低マグネシウム血症、口内炎		
				ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎		
				骨髄抑制、腸管穿孔、消化管出血、腸閉塞、末梢神経障害、脱毛		
				腎機能障害、血栓塞栓症		
大腸癌(C18)	*AADC-0223*	*bevacizumab+XELIRI*	ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1	
			CPT-11	200mg/㎡	day1	
			XELODA	1600mg/㎡/日	day1～14	
			3週毎			
			副作用:	infusion reaction、消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、高血圧性脳症		
				可逆性後白質脳症症候群、ネフローゼ症候群、骨髄抑制、感染症		
				うっ血性心不全、間質性肺炎、神経障害、食欲減退、悪心、口内炎		
				脱毛、下痢、手足症候群、腎障害、色素沈着		
大腸癌(C18)	*AADC-0228*	*Bevacizumab + FOLFOXIRI*	ベバシズマブ	5mg/kg	day1	
			5-FU(infusion)	3200mg/㎡	46hr	
			l-LV	200mg/㎡	day1	
			L-OHP	85mg/㎡	day1	
			CPT-11	165mg/㎡	day1	
			2週毎			

がんの部位（ICD-Oコード）	承認番号	レジメン名称	用法等			
			副作用：	骨髄抑制、下痢、悪心、嘔吐、口内炎、無力症、末梢神経障害		
				高血圧、静脈血栓塞栓症、アナフィラキシー反応、間質性肺炎		
				腸管穿孔、創傷治癒遅延、白質脳症		
大腸癌（C18）	*AADC-0229*	*Capecitabine + IMRT*	カペシタビン	1日2回	週5日	
				体表面積	1.31㎡未満	900mg/回
					1.31以上1.64㎡未満	1200mg/回
					1.64以上	1500mg/回
			トモセラピー	2Gy/day	day1-5実施、day6-7中止	
				最大50Gy （2Gy×25回 5週間）		
			副作用：	骨髄抑制、手足症候群、下痢、悪心・嘔吐、口内炎、腹痛		
				疲労、無力症、脱毛、皮膚の発赤、掻痒感		
大腸癌（C18）	*AADC-0230*	*RAM + FOLFIRI*	ラムシルマブ	8mg/kg	day1	
			5-FU（bolus）	400mg/㎡	day1	
			5-FU（infusion）	2400mg/㎡	day1～3	
			l-LV	200mg/㎡	day1	
			CPT-11	150mg/㎡	day1	
			2週毎			
			副作用：	食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛		
				口内炎、鼻出血、高血圧、動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症		
				消化管穿孔		
大腸癌（C18）	*AADC-0259*	*bevacizumab+S-1(3週毎)*	ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1	3週ごと
治癒切除不能な進行・再発大腸癌			TS-1	朝食後および夕食後の1日2回	day1～day14	3週ごと
				体表面積	1.25㎡未満	40mg/回
					1.25から1.5㎡未満	50mg/回
					1.5㎡以上	60mg/回
			副作用：	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹		
				消化管穿孔、肝機能障害		
				創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クリーゼ		
				可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、間質性肺炎		
大腸癌（C18）	*AADC-0260*	*bevacizumab+S-1(4週毎)*	ベバシズマブ	5mg/kg	day1、15	
治癒切除不能な進行・再発大腸癌			TS-1	朝食後および夕食後の1日2回	day1～day14	
				体表面積	1.25㎡未満	40mg/回
					1.25から1.5㎡未満	50mg/回
					1.5㎡以上	60mg/回
			副作用：	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹		
				消化管穿孔、肝機能障害		
				創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クリーゼ		
				可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、間質性肺炎		
大腸癌（C18）	*AADC-0261*	*bevacizumab+IRIS*	ベバシズマブ	5mg/kg	day1、15	
治癒切除不能な進行・再発大腸癌			CPT-11	150mg/㎡	day1、15	
			TS-1	朝食後および夕食後の1日2回	day1～day14	
				体表面積	1.25㎡未満	40mg/回
					1.25から1.5㎡未満	50mg/回
					1.5㎡以上	60mg/回
			副作用：	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹		
				末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック、消化管穿孔		
				創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クリーゼ		
				可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、間質性肺炎		
				肝機能障害、脱毛		
大腸癌（C18）	*AADC-0252*	*Nivolumab+Ipilimumab*	Nivolumab	240mg/body		
MSI-high			Ipilimumab	1mg/kg		
			3週毎4コースまで			
			5コースから			

がんの部位（ICD-Oコード）	承認番号	レジメン名称	用法等	
			Nivolumab	240mg/body　2週毎　又は　480mg/body　4週毎
			副作用：	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
				血球貪食症候群、結核
大腸癌（C18）	*AADC-0284*	*Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab*	Cetuximab	初回　400mg/㎡（2回目以降は250mg/㎡）を週1回
BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌			Encorafenib	1回300mg　1日1回経口投与
			Binimetinib	1回45mg　1日2回経口投与
			副作用：	ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、
				掻痒感、infusion reaction、下痢、悪心嘔吐、疲労
				手足症候群、眼障害、心機能障害、肝障害、横紋筋融解症
大腸癌（C18）	*AADC-0285*	*Encorafenib+Cetuximab*	Cetuximab	初回　400mg/㎡（2回目以降は250mg/㎡）を週1回
BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌			Encorafenib	1回300mg　1日1回経口投与
			副作用：	ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、
				掻痒感、infusion reaction、下痢、悪心嘔吐、疲労
				皮膚悪性腫瘍、手足症候群、眼障害、横紋筋融解症
大腸癌（C18）	*AADC-0303*	*Pertuzumab+Trastuzumab(Her2陽性大腸癌)*	Pertuzumab	初回840mg/body　2回目以降420mg/body　day1
Her2陽性大腸癌 RAS野生型			Trastuzumab	初回8mg/kg　2回目以降6mg/kg　day1
			3週ごと	
			副作用：	インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感
				間質性肺炎,悪心、口内炎
大腸癌（C18）	*AADC-0317*	*Bevacizumab+Trifluridine*	ベバシズマブ	5mg/kg　day1、15
			トリフルリジン	1回35mg/㎡を1日2回
				5日間連続経口投与した後2日間休薬し、これを2回繰り返した後
				14日間休む
				1コース28日間
			副作用：	骨髄抑制、悪心、食欲減退、疲労、下痢、嘔吐、口内炎、感染症、間質性肺炎
				創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クリーゼ
大腸癌（C18）	*AADC-0321*	*bi weekly cetuximab*	セツキシマブ	500mg/㎡　day1
			2週毎	
			副作用：	ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、
				掻痒感、infusion reaction、下痢
大腸癌（C18）	*AADC-0322*	*bi weekly cetuximab+mFOLFOX6*	セツキシマブ	500mg/㎡　day1
			L-OHP	85mg/㎡　day1
			5-FU（bolus）	400mg/㎡　day1
			5-FU（infusion）	2400mg/㎡　46～48hr
			l-LV	200mg/㎡　day1
			2週毎	
			副作用：	ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、
				掻痒感、infusion reaction、食欲不振、下痢、悪心・嘔吐、発熱
				脱毛、疲労感、骨髄抑制、　末梢神経障害、注射部位反応、
大腸癌（C18）	*AADC-0323*	*bi weekly cetuximab+FOLFIRI*	セツキシマブ	500mg/㎡　day1
			CPT-11	150mg/㎡（75歳以上は120mg/㎡）　day1
			l-LV	200mg/㎡　day1
			5-FU（bolus）	400mg/㎡　day1
			5-FU（infusion）	2400mg/㎡　46～48hr
			2週毎	
			副作用：	食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害、脱毛、発熱
				ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、
				掻痒感、infusion reaction
大腸癌（C18）	*AADC-0324*	*bi weekly cetuximab+5FU+l-LV*	セツキシマブ	500mg/㎡　day1

がんの部位（ICD-Oコード）	承認番号	レジメン名称	用法等		
			5-FU（bolus）	400mg/㎡	day1
			5-FU（infusion）	2400mg/㎡	46～48hr
			l-LV	200mg/㎡	day1
			2週毎		
			副作用：	Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、心不全、血栓塞栓症、口内炎	
				ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎	
				骨髄抑制、感染症、肝機能障害、手足症候群、低マグネシウム血症	
大腸癌（C18）	*AADC-0329*	*Cetuximab+CPT-11(bi-weekly)*	セツキシマブ	500mg/㎡	day1
			CPT-11	150mg/㎡（76才以上は120mg/㎡）	day1
			2週毎		
			副作用：	Infusion reaction、間質性肺炎、下痢、低マグネシウム血症、口内炎	
				ざ瘡様皮膚炎、皮膚乾燥、爪囲炎、発疹、味覚異常、悪心・嘔吐、結膜炎	
				骨髄抑制、腸管穿孔、消化管出血、腸閉塞、末梢神経障害、脱毛	
				腎機能障害、血栓塞栓症	
大腸癌（C18）	*AADC-0330*	*IRIS+bev(TRICOLORE)*	ベバシズマブ	7.5mg/kg day1	
			CPT-11	150mg/㎡ day1	
			TS-1	朝食後および夕食後の1日2回 day1～day14	
				体表面積 1.25㎡未満	40mg/回
				1.25から1.5㎡未満	50mg/回
				1.5㎡以上	60mg/回
			3週毎		
			副作用：	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹	
				末梢神経障害、感覚異常、アナフィラキシーショック、消化管穿孔	
				創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クリーゼ	
				可逆性後白質脳症、ネフローゼ症候群、うっ血性心不全、間質性肺炎	
				肝機能障害、脱毛	
大腸癌（C18）	*AADC-0344*	*PHESGO*	ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として		
Her2陽性大腸癌 RAS野生型			初回（IN）	それぞれ 1200mg、600mg、30000U	day1
			2回目以降（MA）	それぞれ 600mg、600mg、20000U	day1
				初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与	
			3週ごと		
			副作用：	インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感	
				間質性肺炎,悪心、口内炎	
大腸癌（C18）	*AADC-0356*	*Bevacizumab+mFOLFOXIRI*	ベバシズマブ	5mg/kg day1	
			5-FU（infusion）	2400mg/㎡ 46hr	
			l-LV	200mg/㎡ day1	
			L-OHP	85mg/㎡ day1	
			CPT-11	150mg/㎡ day1	
			2週毎		
			副作用：	骨髄抑制、下痢、悪心、嘔吐、口内炎、無力症、末梢神経障害	
				高血圧、静脈血栓塞栓症、アナフィラキシー反応、間質性肺炎	
				腸管穿孔、創傷治癒遅延、白質脳症	
大腸癌（C18）	*AADC-0364*	*Fruquintinib*	フルキンチニブ	1日1回 5mgを3週間連日経口投与、その後1週間休薬 これを繰り返す	
がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発大腸癌			副作用：	手足症候群、蛋白尿、創傷治癒遅延、甲状腺機能低下症、動脈解離	
				肝機能障害、出血、血栓塞栓症、高血圧、高血圧クリーゼ、可逆性後白質脳症	
				消化管穿孔、下痢、食欲不振、口内炎、悪心・嘔吐、頻脈、発声障害、骨髄抑制	
大腸癌（C18）	*AADC-0378*	*Sotorasib+Panitumumab*	ソトラシブ	1日1回 960mg（8錠）を連日経口投与	
がん化学療法後に増悪したKRAS G12C変異陽性の			パニツムマブ	6mg/kg 点滴静注 2週毎	
治癒切除不能な進行・再発大腸癌			副作用：	食欲不振、悪心、嘔吐、下痢	
				肝機能障害、間質性肺疾患	
				infusion reaction、ざ瘡、皮膚乾燥、発疹、掻痒、爪周炎	
				疲労、口内炎、低ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ血症	

がんの部位（ICD-Oコード）	承認番号	レジメン名称	用法等		
大腸癌（C18）	*AADC-0387*	*ENCO+Cmab+mFOLFOX6*	セツキシマブ	500mg/㎡	day1
BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌			Encorafenib	1回300mg　1日1回経口投与	
			L-OHP	85mg/㎡	day1
			5-FU（bolus）	400mg/㎡	day1
			5-FU（infusion）	2400mg/㎡	46～48hr
			l-LV	200mg/㎡	day1
			2週毎		
			副作用：	ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、	
				掻痒感、infusion reaction、食欲不振、下痢、悪心・嘔吐、発熱	
				脱毛、疲労感、骨髄抑制、末梢神経障害、注射部位反応	
				皮膚悪性腫瘍、手足症候群、眼障害、横紋筋融解症	
大腸癌（C18）	*AADC-0388*	*Bi weekly Encorafenib+Cetuximab*	Cetuximab	500mg/㎡　　2週毎	
BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌			Encorafenib	1回300mg　1日1回経口投与	
			副作用：	ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、	
				掻痒感、infusion reaction、下痢、悪心嘔吐、疲労	
				皮膚悪性腫瘍、手足症候群、眼障害、横紋筋融解症	
大腸癌（C18）	*AADC-0389*	*Bi weekly Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab*	Cetuximab	500mg/㎡　　2週毎	
BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌			Encorafenib	1回300mg　1日1回経口投与	
			Binimetinib	1回45mg　1日2回経口投与	
			副作用：	ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、口内炎、低マグネシウム血症、	
				掻痒感、infusion reaction、下痢、悪心嘔吐、疲労	
				手足症候群、眼障害、心機能障害、肝障害、横紋筋融解症	
肛門管癌（C21.1）	*AADC-0196*	*5-FU+MMC+RT*	5-FU（infusion）	1000mg/㎡/day　　day1～4　29～32	
			MMC(bolus)	10mg/㎡/day　　day1,29	
			RT	1.8Gy/day 週5回　計33回　総線量　59.4Gy	
			副作用：	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、全身倦怠感、体重減少、脱毛、口内炎	
				出血傾向、溶血性尿毒症症候群、腎障害、間質性肺炎、下痢、色素沈着	
				肝機能障害、ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ、白質脳症、うっ血性心不全、手足症候群	
				食道炎、	
肝癌（C22）	*AADC-0017*	*Epirubicin 肝動注*			
			1日60mg/㎡ を動脈内投与		
			副作用：	骨髄抑制、食欲不振、脱毛、悪心・嘔吐	
肝癌（C22）	*AADC-0141*	*Miriplatin肝動注*			
			1日1回70mg を肝動脈内投与（1回120mgを上限）		
				繰り返し投与する場合は4週間以上の観察期間をおく	
			副作用：	肝機能障害、骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、発熱、投与部位の疼痛	
				腎機能障害、全身倦怠感	
肝癌（C22）	*AADC-0160*	*Sorafenib*			
			用法・用量	1回400mg　1日2回　経口投与　適宜増減	
			副作用：	手足症候群。剥脱性皮膚炎、発疹、脱毛、下痢、高血圧、疲労	
				食欲不振、そう痒感、体重減少、肝機能障害、出血	
				間質性肺炎、急性肺障害、高血圧クリーゼ、可逆性後白室脳症	
				皮膚粘膜眼症候群、消化管穿孔、心筋虚血・心筋梗塞	
肝癌（C22）	*AADC-0240*	*Lenvatinib*	用法・用量	体重60kg以上　1日1回12mg経口投与	
				体重60kg未満　1日1回8mg経口投与	
			副作用：	高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労	
				口内炎、蛋白尿、手掌・足底発赤知覚不全症候群、出	
				動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔	
				可逆性後白質脳症症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延	
				低カルシウム血症	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
肝癌(C22)	*AADC-0293*	*Atezolizumab+Bevacizumab*	アテゾリズマブ	1200mg day1	
切除不能肝細胞癌			ベバシズマブ	15mg/kg day1	3週ごと
			副作用:	疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢	
				間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病	
				甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎	
				髄膜炎、神経障害	
				消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧	
肝癌(C22)	*AADC-0327*	*Durvalumab+Tremelimumab*	Duruvalumab	1500mg(体重30kg以下の場合は20mg/kg)	4週間隔
進行再発肝細胞癌			Tremelimumab	300mg(体重30kg以下の場合は4mg/kg)	初回単回のみ
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
肝癌(C22)	*AADC-0348*	*Durvalumab*	Durvalumab	1500mg/body day1	
進行再発肝細胞癌				体重30kg以下の場合は1回20mg/kg	
			4週毎		
			副作用:	間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病	
				肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー	
肝癌(C22)	*AADC-0278*	*Cabozantinib*	カボザンチニブ	1回60mg 1日1回空腹時	
がん化学療法後に増悪した切除不能な肝細胞癌			副作用:	高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労	
				口内炎、蛋白尿、手足症候群、横紋筋融解症	
				動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔	
				可逆性後白質脳症症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延	
				低カルシウム血症	
肝癌(C22)	*AADC-0309*	*Nivolumab+ipilimumab*	Nivolumab	80mg/body	
切除不能肝細胞癌			Ipilimumab	3mg/kg	
			3週毎 4回投与後、Nivolumab 240mg/bodyを2週毎、又は480mg/bodyを4週毎 で継続		
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
				肝機能障害、肝炎、血球貪食症候群、結核	
胆道癌(C22～24)	*AADC-0001*	*S-1(CG)*	用法	a.4週投与 2週休薬法	
				b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的)	
			用量	朝食後および夕食後の1日2回	
				体表面積	1.25㎡未満 40mg/回
					1.25から1.5㎡未満 50mg/回
					1.5㎡以上 60mg/回
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹	
胆道癌(C22～24)	*AADC-0015*	*GEM*			
			GEM	1000 mg/㎡を週1回 3回投与 1週休薬	
				1000 mg/㎡を2週間に1回	
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感	
胆道癌(C22～24)	*AADC-0163*	*GC療法*			
			GEM	1000mg/㎡	day1.8
			CDDP	25mg/㎡	day1.8
			1クール:3週		
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱	
胆道癌(C22～24)	*AADC-0320*	*Durvalumab+GEM+CDDP*	Durvalumab	1500mg/body	day1

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
			GEM	1000mg/㎡	day1.8
			CDDP	25mg/㎡	day1.8
			1クール:3週		
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱	
				間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病	
				肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー	
胆道癌(C22～24)	*AADC-0347*	*GCS*	GEM	1000mg/㎡	day1
			CDDP	25mg/㎡	day1
			S-1	80mg/㎡	day1-7
			1クール:2週		
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱	
				下痢、色素沈着、発疹	
胆道癌(C22～24)	*AADC-0352*	*Pembrolizumab+GEM+CDDP*	Pembrolizumab	200mg/body	day1
			GEM	1000mg/㎡	day1.8
			CDDP	25mg/㎡	day1.8
			1クール:3週	CDDPは最大8ｸｰﾙまで、以降Pembrolizumab+GEM or Pembrolizumab単剤で継続	
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱	
				間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病	
				肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー	
胆道癌(C22～24)	*AADC-0399*	*Ivosidenib*	**イボシデニブ**	1日1回　500mg　連日経口投与	
がん化学療法後に増悪したIDH1遺伝子変異陽性の			副作用:	QT延長、ギラン・バレー症候群、分化症候群	
治癒切除不能な胆道癌				下痢、悪心・嘔吐、疲労、食欲減退	
膵癌(C25)	*AADC-0001*	*S-1(CG)*			
			用法	a.4週投与　2週休薬法	
				b.2週投与　1週休薬法(副作用の軽減を目的)	
			用量	朝食後および夕食後の1日2回	
				体表面積　1.25㎡未満	40mg/回
				1.25から1.5㎡未満	50mg/回
				1.5㎡以上	60mg/回
膵癌(C25)	*AADC-0015*	*GEM*			
			GEM	1000 mg/㎡を週1回　3回投与　1週休薬	
				1000 mg/㎡を2週間に1回	
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感	
膵癌(C25)	*AADC-0143*	*GEM +IMRT療法*			
			GEM	1000 mg/㎡を週1回　3回投与　1週休薬	
			放射線照射	1.8Gy×28Fr　total50.4Gy	
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感	
膵癌(C25)	*AADC-0159*	*Erlotinib+GEM療法*			
			Erlotinib	100mg/day　連日経口投与	
			GEM	1000 mg/㎡を週1回　3回投与　1週休薬	
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、ざ瘡様皮疹等の発疹、悪心・嘔吐、下痢	
				間質性肺炎	
膵癌(C25)	*AADC-0200*	*FOLFIRINOX*			
治癒切除不能膵癌			L-OHP	85mg/㎡	day1
			5-FU(bolus)	400mg/㎡	day1
			5-FU(infusion)	2400mg/㎡	46hr

がんの部位（ICD-Oコード）	承認番号	レジメン名称	用法等		
			l-LV	200mg/㎡	day1
			CPT-11	180mg/㎡	day1
			2週ごと		
			副作用：	末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐、倦怠感、下痢	
				発熱、脱毛、肝機能障害	
膵癌（C25）	*AADC-0212*	*GEM+nab-PTX*	GEM	1000mg/㎡	day1
治癒切除不能膵癌			nab-PTX	125mg/㎡	day1
			3週投与1週休薬		
			副作用：	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感	
				脱毛、末梢神経障害、発疹、下痢	
膵癌（C25）	*AADC-0248*	*Olaparib*	オラパリブ	1回300mgを1日2回経口投与	
BRCA遺伝子変異陽性、プラチナ製剤を含む化学療法後に疾患進行が認められていない膵癌			副作用：	悪心、嘔吐、味覚異常	
				貧血、好中球減少、血小板減少、リンパ球減少	
				疲労、無力症、間質性肺炎	
				下痢、頭痛	
膵癌（C25）	*AADC-0256*	*GEM+S-1(膵癌NAC)*	GEM	1000 mg/㎡ day1.day8 30分かけて点滴静注	
切除可能膵癌術前			S-1	体表面積毎（80mg～120mg） 14日間 分2で内服	
				（day1の夕方からday15の朝まで）	
				これを2コース繰り返す。	
			副作用：	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感	
				下痢、口内炎、色素沈着、発疹	
膵癌（C25）	*AADC-0318*	*Nal-IRI+5FU/LV*	Lipospmal Irinotecan	70mg/㎡	day1
治癒切除不能膵癌			5-FU（infusion）	2400mg/㎡	day1～3
			l-LV	200mg/㎡	day1
			2週毎		
			副作用：	食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、肝機能障害、脱毛	
				倦怠感、好中球減少、貧血、低カリウム血症	
膵癌（C25）	*AADC-0014*	*mFOLFOX6療法*	L-OHP	85mg/㎡	day1
治癒切除不能膵癌			5-FU（bolus）	400mg/㎡	day1
			5-FU（infusion）	2400mg/㎡	46hr
			l-LV	200mg/㎡	day1
			2週ごと		
			副作用：	末梢神経障害、食欲不振、骨髄抑制、注射部位反応、悪心・嘔吐、倦怠感、下痢	
				発熱、肝機能障害	
膵内分泌腫瘍（C25.4）	*AADC-0169*	*Everolimus*	Everolimus	10mg/day 連日経口投与	
			副作用：	口内炎、発疹、下痢、疲労、末梢性浮腫、悪心・嘔吐、食欲不振	
				鼻出血、貧血、味覚障害、体重減少、頭痛、掻痒症、高血糖	
				血小板減少、無力症、間質性肺炎、腎不全、アナフィラキシー様症状	
				急性呼吸窮迫症候群、肺塞栓症、深部静脈血栓症、好中球減少	
				悪性腫瘍（二次発癌）、皮膚乾燥、爪の障害、心嚢液貯留	
				進行性多巣性白室脳症、BKウィルス腎症、細胞蛋白症	
消化管神経内分泌腫瘍（C26.9）	*AADC-0188*	*ｻﾝﾄｽﾀﾁﾝLAR*	サンドスタチンLAR	1回30mgを4週毎に臀部筋肉内に注射	
			副作用：	注射部位硬結、注射部位疼痛、胆石症、下痢	
膵・消化管神経内分泌腫瘍（C25.4、C26.9）	*AADC-0257*	*Lanreotide*	Lanreotide	1回120mgを4週毎に深部皮下内に注射	
			副作用：	注射部位硬結、注射部位疼痛、徐脈	
				胆石症、下痢、白色便	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
膵・消化管神経内分泌腫瘍(C25.4、C26.9)	*AADC-0277*	*Streptozocin*	Streptozocin	1000 mg/㎡ 1週間毎 30分かけて点滴静注
			副作用:	腎障害、骨髄抑制、耐糖能異常、肝障害
				血管痛、悪心、便秘、味覚異常、倦怠感
肺癌(C34)	*AADC-0001*	*S-1(CG)*		
非小細胞肺癌			用法	a.4週投与 2週休薬法
				b.2週投与 1週休薬法(副作用の軽減を目的)
			用量	朝食後および夕食後の1日2回
				体表面積 1.25㎡未満 40mg/回
				1.25から1.5㎡未満 50 mg/回
				1.5㎡以上 60mg/回
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
肺癌(C34)	*AADC-0010*	*UFT(UFTE)*		
非小細胞肺癌			用法・用量	1日量としてテガフール300-600mgを1日2-3回に分割投与
			副作用:	食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
肺癌(C34)	*AADC-0015*	*GEM*		
非小細胞肺癌			GEM	1000 mg/㎡を週1回 3回投与 1週休薬
				1000 mg/㎡を2週間に1回
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感
肺癌(C34)	*AADC-0019*	*PTX + CBDCA療法(TC)*		
非小細胞肺癌			PTX 200mg/㎡ day1	
			CBDCA 目標AUC=6 day1	
			3週ごと	
			副作用:	脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、
				肝機能障害
肺癌(C34)	*AADC-0020*	*DTX + CDDP療法(DC)*		
非小細胞肺癌			DTX 60mg/㎡ day1	
			CDDP 80mg/㎡ day1	
			3～4週ごと	
			副作用:	悪心・嘔吐、腎機能障害、神経毒性、聴覚障害、電解質異常、 浮腫、倦怠感
				味覚異常、爪の変形、骨髄抑制、脱毛
肺癌(C34)	*AADC-0022*	*Iressa*		
非小細胞肺癌			250mgを1日1回経口投与	
			副作用:	下痢、皮膚乾燥症、ニキビ様皮疹、肝機能障害、間質性肺炎
肺癌(C34)	*AADC-0025*	*CPT-11*		
非細胞肺癌			CPT-11 100mg/㎡ day1.8.15	
			1週間隔で3回投与、1週休薬	
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、間質性肺炎
肺癌(C34)	*AADC-0091*	*tri-weekly DTX*		
非小細胞肺癌			DTX 60mg/㎡ day1	
			3週ごと	
			副作用:	脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制
				肝機能障害、腎機能障害
肺癌(C34)	*AADC-0098*	*CPT-11+CDDP療法(IP)*		
非小細胞肺癌			CDDP 80mg/㎡ day1	
			CPT-11 60mg/㎡ day1.8.15	
			4週ごと	
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、倦怠感、腎機能障害、下痢、間質性肺炎、食欲不振
				末梢神経障害、脱毛、
肺癌(C34)	*AADC-0106*	*Tarceva*		

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
非小細胞肺癌			エルロチニブ	150mg 1日1回経口投与	
			副作用:	発疹、下痢、皮膚乾燥、掻痒感、間質性肺疾患、肝機能障害	
肺癌(C34)	*AADC-0111*	*VNR*			
非小細胞肺癌			ビノレルビン	25mg/㎡	day1.8
			3週ごと(4クール以上、最大6クール)		
肺癌(C34)	*AADC-0114*	*Pemetrexed+ CDDP療法*			
非小細胞肺癌			Pemetrexed	500mg/㎡	day1
			CDDP	75mg/㎡	day1
			3週毎		
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、倦怠感、口内炎、神経障害	
肺癌(C34)	*AADC-0119*	*CDDP+VNR+IMRT療法*			
非小細胞肺癌			CDDP	80mg/㎡	day1
			VNR	20mg/㎡	day1、8
			3週ごと	4コース	
			放射線療法	2Gy/日 5回/週 計6週30回60Gy (化学療法1コース目のday3から開始	
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、間質性肺炎、食欲不振、口内炎、倦怠感	
				腎機能障害	
肺癌(C34)	*AADC-0149*	*Bevacizumab based TC療法*			
非小細胞肺癌			PTX 200mg/㎡	day1	
			CBDCA 目標AUC=6	day1	
			ベバシズマブ	15mg/kg	day1 3週ごと
			CBDCA+PTX+ベバシズマブを3週間間隔で4～6サイクル実施後、アバスチン単独を		
			3週間間隔で投与する		
			副作用:	脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、	
				肝機能障害、高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、喀血、肺出血、血栓塞栓症	
肺癌(C34)	*AADC-0151*	*CDDP+VNR療法*			
非小細胞肺癌			CDDP	80mg/㎡	day1
			VNR	25mg/㎡	day1、8
			3週ごと	4コース	
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、間質性肺炎、食欲不振、口内炎、倦怠感	
				腎機能障害	
肺癌(C34)	*AADC-0170*	*Pemetrexed*			
非小細胞肺癌			Pemetrexed	500mg/㎡	day1
			3週毎	4コース	
			副作用:	肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心	
肺癌(C34)	*AADC-0180*	*CBDCA+Pemetrexed*			
非小細胞肺癌			Pemetrexed	500mg/㎡	day1
			CBDCA	目標AUC=6	day1
			3週毎	4コース	
			副作用:	肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感	
				下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり	
肺癌(C34)	*AADC-0176*	*Crizotinib*			
ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行再発非小細胞肺癌			Crizotinib	1回250mg1日2回内服	
ROS1融合遺伝子陽性の切除不能な進行再発非小細胞肺癌			副作用:	悪心・嘔吐、視力障害、下痢、便秘、末梢性浮腫、間質性肺炎	
				肝機能障害、QT間隔延長、骨髄抑制	
肺癌(C34)	*AADC-0181*	*PEM+CBDCA+BV followed by PEM+BV*			
進行性非扁平非小細胞肺癌			Pemetrexed	500mg/㎡	day1
			CBDCA	目標AUC=6	day1
			ベバシズマブ	15mg/kg	day1
			3～4週毎4コース後 CR、PR、SDなら維持療法へ		
			維持療法		
			Pemetrexed	500mg/㎡	day1
			ベバシズマブ	15mg/kg	day1

がんの部位（ICD-Oコード）	承認番号	レジメン名称	用法等		
			3週毎PDになるまで継続		
			副作用：	肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感	
				下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり	
				高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、喀血、肺出血、血栓塞栓症	
肺癌（C34）	*AADC-0186*	*CBDCA+S-1療法*			
非小細胞肺癌			CBDCA	目標AUC=5	day1
			TS-1	80～120mg/body	day1～14
			3週毎		
			副作用	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹	
				神経障害、関節痛、脱毛	
肺癌（C34）	*AADC-0189*	*IMRT+CBDCA*			
非小細胞肺癌			CBDCA	30mg/㎡	day1～day5
			IMRT	2Gy/日	day1～day5
			1週毎		
			CBDCAは4週間実施、IMRTは6週間実施		
			副作用：	嘔気・嘔吐、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、発熱、骨髄抑制、肝機能障害	
				アナフィラキシー様症状、間質性肺炎、急性腎不全、肝不全、	
				消化管壊死、消化管出血、出血性腸炎、偽膜性大腸炎、麻痺性イレウス	
				脳梗塞、肺梗塞、血栓・塞栓症、心筋梗塞、うっ血性心不全、溶血性尿毒症症候群	
				急性呼吸窮迫症候群、DIC、急性膵炎、難聴、皮膚炎、放射線肺炎、放射線食道炎	
				脊髄症	
肺癌（C34）	*AADC-0194*	*nab-paclitaxel + Carboplatin*			
非小細胞肺癌			アブラキサン	100mg/㎡	day1, 8, 15
			CBDCA	目標AUC=6/body	day1
			4週毎		
			副作用：	脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、 発疹	
				食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、脳神経麻痺、アナフィラキシー	
				間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全	
				難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群	
				急性腎不全、白質脳症、	
肺癌（C34）	*AADC-0201*	*AVAPERL*	Pemetrexed	500mg/㎡	day1
非小細胞肺癌			CDDP	75mg/㎡	day1
			ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1
			3週毎4コース後　SDもしくはresponse(＋)なら維持療法へ		
			維持療法		
			Pemetrexed	500mg/㎡	day1
			ベバシズマブ	7.5mg/kg	day1
			3週毎PDになるまで継続		
			副作用：	腎機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感	
				下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり	
				高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、喀血、肺出血、血栓塞栓症	
肺癌（C34）	*AADC-0202*	*S-1+CDDP+RT*	CDDP	60mg/㎡	day1
局所進行非小細胞肺癌			TS-1	1回40mg/㎡ 1日2回	day1～14
			4週毎2コース施行中に放射線治療施行		
			1回2Gy 週5日 30回照射 計60Gy(6週間)		
			上記化学放射線療法終了後2週間後から		
			CDDP	60mg/㎡	day1
			TS-1	1回40mg/㎡ 1日2回	day1～14
			4週毎2コース施行		
			副作用：	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹	
肺癌（C34）	*AADC-0204*	*Afatinib*	Afatinib	1日1回40mg経口投与	
EGFR遺伝子変異陽性の手術不能または再発				患者の状態により適宜増減 1日50mgまで	
非小細胞肺癌			副作用：	下痢、発疹、爪囲炎、口内炎、間質性肺炎、皮膚障害、肝機能障害	

がんの部位（ICD-Oコード）	承認番号	レジメン名称	用法等		
				鼻出血、食欲減退、疲労、粘膜の炎症、体重減少、味覚異常	
				結膜炎、心障害	
肺癌（C34）	*AADC-0010*	*UFT(UFTE)*			
小細胞肺癌			用法・用量	1日量としてテガフール300-600mgを1日2-3回に分割投与	
			副作用：	食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害	
肺癌（C34）	*AADC-0023*	*CBDCA+ETP療法(CE)*			
小細胞肺癌			VP-16	80mg/㎡	day1～3
			CBDCA	目標AUC=5/body	day1
			3～4週ごと		
			副作用：	骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振	
肺癌（C34）	*AADC-0024*	*CPT-11+ CDDP療法(IP)*			
小細胞肺癌			CDDP	60mg/㎡	day1
			CPT-11	60mg/㎡	day1.8.15
			4週ごと		
			副作用：	骨髄抑制、悪心・嘔吐、倦怠感、腎機能障害、下痢、間質性肺炎、食欲不振	
				末梢神経障害、脱毛、	
肺癌（C34）	*AADC-0025*	*CPT-11*			
小細胞肺癌			CPT-11	100mg/㎡	day1.8.15
			1週間隔で3回投与、2週休薬		
			副作用：	骨髄抑制、悪心・嘔吐、下痢、間質性肺炎	
肺癌（C34）	*AADC-0100*	*PE(CDDP+ETP)+IMRT療法*			
小細胞肺癌			CDDP	80mg/㎡	day1
			VP-16	100mg/㎡	day1～3
			3～4週ごと	4コース	
			副作用：	骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振	
肺癌（C34）	*AADC-0137*	*AMR*			
			AMR	35～40mg/㎡	3日間連続投与
			3週ごと	3～6コース	
			副作用：	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、脱毛、肝機能障害、発熱	
肺癌（C34）	*AADC-0145*	*GC療法*			
			GEM	1000mg/㎡	day1.8
			CDDP	80mg/㎡	day1
			3週毎	4～6コース	
			副作用：	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱	
肺癌（C34）	*AADC-0176*	*Crizotinib*	クリゾチニブ	1回250mgを1日2回経口投与	
ALK陽性・ROS1陽性肺癌			副作用：	間質性肺疾患、肝機能障害、QT間隔延長、徐脈	
				血液障害、心不全、発疹、便秘、口内炎、悪心	
				腎機能障害、倦怠感、筋肉痛、光線過敏性	
肺癌（C34）	*AADC-0177*	*CDDP＋VP-16*			
CPT-11が使用できない進展型小細胞肺癌			CDDP	80mg/㎡	day1
			VP-16	100mg/㎡	day1～3
			副作用：	骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振	
肺癌（C34）	*AADC-0210*	*Alectinib*	アレクチニブ	1回300mg1日2回経口投与	
			副作用：	間質性肺疾患、肝機能障害、骨髄抑制、消化管穿孔	
				血栓塞栓症、味覚異常、発疹、便秘、口内炎、悪心	
				腎機能障害、倦怠感、筋肉痛、光線過敏性	
肺癌（C34）	*AADC-0211*	*Erlotinib+Bevacizumab併用療法*	ベバシズマブ	15mg/kg	3週間毎
EGFR遺伝子変異陽性肺癌			エルロチニブ	100～150mg	1日1回経口投与
			副作用：	発疹、下痢、皮膚乾燥、掻痒感、肝機能障害、神経毒性、食欲減退	
				口内炎、嘔吐、高血圧、脱毛、関節痛、疲労、倦怠感、卵巣機能不全	
			重大な副作用：	ショック、アナフィラキシー、消化管穿孔、創傷治癒遅延、出血	
				血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧クリーゼ、可逆性後白質脳症症候群	
				ネフローゼ症候群、骨髄抑制、感染症、うっ血性心不全、間質性肺炎	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
				血栓性微小血管症、	
肺癌(C34)	*AADC-0225*	*Nivolumab*	ニボルマブ	240mg/body	2週間隔
切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
肺癌(C34)	*AADC-0231*	*Osimertinib*	タグリッソ	1日1回80mg	
			副作用:	発疹、ざ瘡、下痢、皮膚乾燥、爪の障害、間質性肺炎、QT間隔延長	
				骨髄抑制、肝機能障害	
肺癌(C34)	*AADC-0232*	*RAM+DTX*	RAM	10mg/kg	day1 3週ごと
非小細胞肺癌			DTX	60mg/㎡	day1 3週ごと
			副作用:	腹痛、高血圧、下痢、	
				動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害	
				インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血	
				骨髄抑制、低カリウム血症、低ナトリウム血症	
				脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、	
肺癌(C34)	*AADC-0235*	*Pembrolizumab*	ペムブロリズマブ	1回200mg	3週間隔
PD-L1陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌			副作用:	骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症	
PD-L1陽性の未治療非小細胞肺癌				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐	
				口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害	
				肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害	
				膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎	
肺癌(C34)	*AADC-0237*	*Ceritinib*	セリチニブ	1日1回750mg空腹時に経口投与	
			副作用:	間質性肺炎、肝機能障害、QT間隔延長、徐脈、下痢	
				高血糖、眼障害、皮下組織障害、胃腸障害、疲労	
				腎及び尿路障害	
肺癌(C34)	*AADC-0241*	*Atezolizumab*	アテゾリズマブ	1200mg	day1 3週ごと
切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌			副作用:	疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢	
				間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病	
				甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎	
				髄膜炎、神経障害	
肺癌(C34)	*AADC-0243*	*Lorlatinib*	ロルラチニブ	1日1回100mgを経口投与	
			副作用:	間質性肺炎、肝機能障害、QT間隔延長、徐脈、下痢	
				膵炎、高コレステロール血症、高トリグリセリド血症	
				末梢性ニューロパチー	
肺癌(C34)	*AADC-0245*	*CBDCA+PEM+Pembrolizumab→PEM+Pembrolizumab*			
進行性非扁平上皮非小細胞肺癌			Pemetrexed	500mg/㎡	day1
			CBDCA	目標AUC=5	day1
			Pembrolizumab	200mg/body	day1
			3週毎4コース後	維持療法へ	
			維持療法		
			Pemetrexed	500mg/㎡	day1
			Pembrolizumab	200mg/body	day1
			3週毎		
			副作用:	肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感	
				下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
				大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病	
				膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎	
肺癌(C34)	*AADC-0246*	*CBDCA+nab-PTX+Pembrolizumab→Pembrolizumab*			
扁平上皮癌			アブラキサン	100mg/㎡	day1, 8, 15
			CBDCA	目標AUC=6/body	day1
			Pembrolizumab	200mg/body	day1
			3週毎4コース後　維持療法へ		
			維持療法		
			Pembrolizumab	200mg/body	day1
			3週毎		
			副作用:	脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、　発疹	
				食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー	
				間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全	
				難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群	
				急性腎不全、白質脳症、	
				大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病	
				膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎	
肺癌(C34)	*AADC-0247*	*CBDCA+PTX+Bevacizumab+Atezolizumab→Bevacizumab+Atezolizumab維持療法*			
非扁平上皮非小細胞肺癌			PTX	200mg/㎡	day1
			CBDCA	目標AUC=6	day1
			ベバシズマブ	15mg/kg	day1
			アテゾリズマブ	1200mg/body	day1
			3週毎4-6ｺｰｽ後　維持療法へ		
			維持療法		
			ベバシズマブ	15mg/kg	day1
			アテゾリズマブ	1200mg/body	day1
			3週毎		
			副作用:	脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、悪心・嘔吐	
				疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢	
				間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病	
				甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎	
				髄膜炎、神経障害	
肺癌(C34)	*AADC-0254*	*CBDCA+VP-16+Atezolizumab f/b Atezolizumab*			
小細胞肺癌			VP-16　100mg/㎡		day1～3
			CBDCA　目標AUC=5		day1
			アテゾリズマブ	1200mg/body	day1
			3週毎4コース後　維持療法へ		
			維持療法		
			アテゾリズマブ	1200mg/body	day1
			3週毎		
			副作用:	骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振	
				疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢	
				間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病	
				甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎	
				髄膜炎、神経障害	
肺癌(C34)	*AADC-0262*	*CBDCA+PEM+Atezolizumab→PEM+Atezolizumab*			
進行性非扁平上皮非小細胞肺癌			Pemetrexed	500mg/㎡	day1
			CBDCA	目標AUC=6	day1
			Atezolizumab	1200mg/body	day1
			3週毎4-6コース後　維持療法へ		
			維持療法		
			Pemetrexed	500mg/㎡	day1
			Atezolizumab	1200mg/body	day1
			3週毎		

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
			副作用:	肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感	
				下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり	
				大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病	
				膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎	
肺癌(C34)	*AADC-0264*	*Trastuzumab Deruxtecan*	Trastuzumab Deruxtec	5.4mg/kg	day1
HER2遺伝子変異陽性 非小細胞肺癌			3週ごと		
			副作用:	間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション	
				骨髄抑制、脱毛、疲労、悪心・嘔吐、下痢、便秘、口内炎	
肺癌(C34)	*AADC-0268*	*Pembrolizumab(6週間)*	ペムブロリズマブ	1回400mg	6週間隔
非小細胞肺癌			副作用:	骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症	
				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐	
				口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害	
				肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害	
				膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎	
肺癌(C34)	*AADC-0270*	*CDDP+VP-16+Durvalumab→維持療法Durvalumab*			
小細胞肺癌			VP-16 80-100mg/㎡		day1～3
			CDDP 75-80mg/㎡		day1
			Durvalumab	1500mg/body	day1
			3週毎4コース後 維持療法へ		
			維持療法		
			Durvalumab	1500mg/body	day1
			4週毎		
			副作用:	骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振	
				腎機能障害、疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢	
				間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病	
				甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎	
				髄膜炎、神経障害	
肺癌(C34)	*AADC-0271*	*CBDCA+VP-16+Durvalumab→維持療法Durvalumab*			
小細胞肺癌			VP-16 80-100mg/㎡		day1～3
			CBDCA 目標AUC=5-6		day1
			Durvalumab	1500mg/body	day1
			3週毎4コース後 維持療法へ		
			維持療法		
			Durvalumab	1500mg/body	day1
			4週毎		
			副作用:	骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振	
				疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症、下痢	
				間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病	
				甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎	
				髄膜炎、神経障害	
肺癌(C34)	*AADC-0272*	*4週毎 Nivolumab*	ニボルマブ	480mg/body	4週間隔
切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
肺癌(C34)	*AADC-0274*	*Ipilimumab+Nivolumab*	Ipilimumab	1mg/kg	6週間隔
非小細胞肺癌			Nivolumab	360mg/body	3週間隔
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
				血球貪食症候群、結核	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
肺癌(C34)	*AADC-0275*	*Nogitecan*	Nogitecan	1mg/㎡	5日間連続投与
小細胞肺癌			3週ごと		
			副作用:	骨髄抑制、消化管出血、間質性肺炎、血栓塞栓症	
				悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、発熱、易疲労感	
肺癌(C34)	*AADC-0276*	*nab-PTX単剤*	nab-PTX	100mg/㎡	day1,8,15
非小細胞肺癌(前治療2レジメン以内)			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感	
				脱毛、末梢神経障害、発疹、下痢	
肺癌(C34)	*AADC-0279*	*Ipilimumab+Nivolumab+PEM+CDDP*	Ipilimumab	1mg/kg	6週間隔
非小細胞肺癌			Nivolumab	360mg/body	3週間隔
			Pemetrexed	500mg/㎡	3週間隔
			CDDP	75mg/㎡	3週間隔
			★CDDP+Pemetrexedは2コースで終了		
			★維持療法はNivolumab(±Pemetrexed)を3週毎+Ipilimumab6週毎		
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
				血球貪食症候群、結核	
				悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎	
肺癌(C34)	*AADC-0280*	*Ipilimumab+Nivolumab+PEM+CBDCA*	Ipilimumab	1mg/kg	6週間隔
非小細胞肺癌			Nivolumab	360mg/body	3週間隔
			Pemetrexed	500mg/㎡	3週間隔
			CBDCA	目標AUC=6	3週間隔
			★CBDCA+Pemetrexedは2コースで終了		
			★維持療法はNivolumab(±Pemetrexed)を3週毎+Ipilimumab6週毎		
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
				血球貪食症候群、結核	
				発疹、骨髄抑制、悪心、下痢、味覚異常、便秘、しゃっくり	
肺癌(C34)	*AADC-0281*	*Ipilimumab+Nivolumab+CBDCA+PTX*	Ipilimumab	1mg/kg	6週間隔
非小細胞肺癌			Nivolumab	360mg/body	3週間隔
			PTX	200mg/㎡	3週間隔
			CBDCA	目標AUC=6	3週間隔
			★CBDCA+PTXは2コースで終了		
			★維持療法はNivolumabを3週毎+Ipilimumab6週毎		
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
				血球貪食症候群、結核	
				脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、悪心・嘔吐	
肺癌(C34)	*AADC-0282*	*Necttumumab+GEM+CDDP*	Necitumumab	800mg	day1.8
扁平上皮癌			GEM	1250mg/㎡	day1.8
			CDDP	75mg/㎡	day1
			3週毎		
			★CDDP+GEMは最大6ｺｰｽ		
			★維持療法はNecitumumab単剤でPDまで継続		
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱	
				ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、低マグネシウム血症、	
				掻痒感、インフュージョンリアクション、下痢	
肺癌(C34)	*AADC-0299*	*CBDCA+PTX+Pembrolizumab*	CBDCA	目標AUC=6/body	day1

がんの部位（ICD-Oコード）	承認番号	レジメン名称	用法等	
			PTX	200mg/㎡　day1
			Pembrolizumab	200mg/body　day1
			3週毎4コース後　維持療法へ	
			維持療法	
			Pembrolizumab	200mg/body　day1
			3週毎	
			副作用：	脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、　発疹
				食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー
				間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全
				難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群
				急性腎不全、白質脳症、
				大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病
				膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
肺癌（C34）	*AADC-0304*	*Erlotinib+Ramucirumab*	ラムシルマブ	10mg/kg　2週間毎
EGFR遺伝子変異陽性肺癌			エルロチニブ	150mg　1日1回　空腹時　連日経口投与
			副作用：	高血圧、動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害
				インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血
				発疹、下痢、皮膚乾燥、掻痒感、間質性肺疾患、肝機能障害
肺癌（C34）	*AADC-0305*	*Gefitinib+Ramucirumab*	ラムシルマブ	10mg/kg　2週間毎
EGFR遺伝子変異陽性肺癌			ゲフィチニブ	250mg　1日1回　連日経口投与
			副作用：	高血圧、動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、心筋梗塞、脳血管障害
				インフュージョンリアクション、消化管穿孔、消化管出血
				発疹、下痢、皮膚乾燥、掻痒感、間質性肺疾患、肝機能障害
肺癌（C34）	*AADC-0306*	*Dabrafenib+Trametinib*	ダブラフェニブ	1回150mg　1日2回　空腹時連日経口投与
BRAF遺伝子変異陽性肺癌			トラメチニブ	1回2mg　1日1回　空腹時連日経口投与
			副作用：	発熱、肝機能障害、眼障害、心障害
				静脈血栓塞栓症、脳血管障害
				有棘細胞癌、横紋筋融解症、間質性肺疾患
肺癌（C34）	*AADC-0307*	*CBDCA+PTX+RT*	PTX　40mg/㎡　day1	
局所進行非小細胞肺癌			CBDCA　目標AUC=2　day1	
			毎週投与　計6回（放射線療法を行っている間）	
			副作用：	脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、
				肝機能障害
肺癌（C34）	*AADC-0315*	*Atezolizumab+nab-PTX+CBDCA→Atezolizumab*	アブラキサン	100mg/㎡　day1，8，15
非小細胞肺癌　非扁平上皮癌			CBDCA	目標AUC=6/body　day1
			Atezolizumab	1200mg/body　day1
			3週毎4コース後　維持療法へ	
			維持療法	
			Atezolizumab	1200mg/body　day1
			3週毎	
			副作用：	脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、　発疹
				食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー
				間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全
				難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群
				急性腎不全、白質脳症、
				大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病
				膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
肺癌（C34）	*AADC-0325*	*Brigatinib*	ブリグチニブ	1日1回90mgを7日間経口投与後、1日1回180mgを経口投与
ALK陽性肺癌				（14日以上休薬した場合は90mgにて再開）
			副作用：	間質性肺疾患、高血圧、徐脈、高血糖
				視覚障害、CK上昇、リパーゼorアミラーゼ上昇（膵炎）

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
				下痢、悪心、肝機能障害、口内炎、発疹	
肺癌(C34)	*AADC-0328*	*Sotorasib*	ソトラシブ	1日1回　960mg(8錠)を連日経口投与	
KRAS G12C変異陽性肺癌			副作用:	食欲不振、悪心、嘔吐、下痢	
				肝機能障害、間質性肺疾患	
肺癌(C34)	*AADC-0331*	*Entrectinib*	エヌトレクチニブ	1日1回　600mg(3Cap)を連日経口投与	
ROS1融合遺伝子陽性肺癌			副作用:	心臓障害、QT延長、認知障害・運動失調	
				間質性肺疾患、失神、成長発達遅延	
				味覚異常、浮動性めまい、末梢感覚ニューロパチー	
肺癌(C34)	*AADC-0332*	*Tremelimumab+durvalumab+PEM+CBDCA*	Tremelimumab	75mg/body	day1
非小細胞肺癌			Durvalumab	1500mg/body	day1
			Pemetrexed	500mg/㎡	day1
			CBDCA	目標AUC=6	day1
			3週毎	CBDCAは4ｺｰｽで終了	
			維持療法は4週毎にPemetrexed+Durvalumab		
			★維持療法の2回目のみ　Pemetrexed+Durvalumab+Tremelimumab		
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
				血球貪食症候群、結核	
				発疹、骨髄抑制、悪心、下痢、味覚異常、便秘、しゃっくり	
肺癌(C34)	*AADC-0333*	*Tremelimumab+durvalumab+nab-PTX+CBDCA*	Tremelimumab	75mg/body	day1
非小細胞肺癌			Durvalumab	1500mg/body	day1
			nab-PTX	100mg/㎡	day1、8、15
			CBDCA	目標AUC=6	day1
			3週毎	CBDCA+nab-PTXは4ｺｰｽで終了	
			維持療法は4週毎にDurvalumab		
			★維持療法の2回目のみ　Durvalumab+Tremelimumab		
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
				血球貪食症候群、結核	
				脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、悪心・嘔吐	
肺癌(C34)	*AADC-0334*	*Nivolumab+PTX+CBDCA(術前のみ)*	Nivolumab	360mg/body	day1
術前　StageⅢA(StageⅡでも症例によって考慮)			CBDCA	目標AUC=5 or 6	day1
			PTX	175mg/㎡	day1
			3週毎　最大3ｺｰｽ		
			副作用:	脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、　発疹	
				食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー	
				間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全	
				難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群	
				急性腎不全、白質脳症、	
				大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病	
				膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎	
肺癌(C34)	*AADC-0335*	*Nivolumab+CDDP+PEM(術前のみ)*	Nivolumab	360mg/body	day1
肺腺癌術前　StageⅢA(StageⅡでも症例によって考慮)			Pemetrexed	500mg/㎡	day1
			CDDP	75mg/㎡	day1
			3週毎　最大3ｺｰｽ		
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
				血球貪食症候群、結核	

がんの部位（ICD-Oコード）	承認番号	レジメン名称	用法等		
				悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎	
肺癌（C34）	*AADC-0338*	*Nivolumab+GEM+CDDP(術前のみ)*	Nivolumab	360mg/body	day1
切除可能非小細胞肺癌			CDDP	75mg/㎡	day1
			GEM	1000mg/㎡	day1,day8
			3週毎　最大3ｺｰｽ		
			副作用：	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
				血球貪食症候群、結核	
				悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎	
肺癌（C34）	*AADC-0345*	*Durvalumab*	Durvalumab	1500mg/body	day1
切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における				体重30kg以下の場合は1回20mg/kg	
根治的化学放射線療法後の維持療法			4週毎		
投与期間は12ヶ月まで			副作用：	間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病	
				肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー	
肺癌（C34）	*AADC-0350*	*Capmatinib*	カプマチニブ	1日2回　1回400mg　を連日経口投与	
METエクソン14スキッピング変異陽性			副作用：	間質性肺疾患、体液貯留、肝機能障害、腎機能障害	
切除不能な進行・再発非小細胞性肺癌				悪心・嘔吐、下痢、リパーゼ増加、疲労	
				低リン酸血症、発疹、便秘、血中ビリルビン増加	
肺癌（C34）	*AADC-0359*	*Osimertinib+PEM+CDDP*	Osimertinib	1日1回80mg	を連日経口投与
EGFR変異陽性肺癌			CDDP	75mg/㎡	day1
			Pemetrexed	500mg/㎡	day1
			3週毎　CDDP併用は最大4コース		
			維持療法はPEM　500mg/m^2　day1 3週毎　＋　Osimertinib 80mg 連日		
			副作用：	悪心・嘔吐、下痢、便秘、食欲不振、口内炎	
				皮疹、皮膚乾燥、浮腫	
				貧血、好中球減少、血小板減少	
肺癌（C34）	*AADC-0361*	*Pembrolizumab+GEM+CDDP*	Pembrolizumab	200mg/body	day1
肺扁平上皮癌（周術期）			CDDP	75mg/㎡	day1
			GEM	1000mg/㎡	day1,day8
			（術前）　3週毎　最大4ｺｰｽ		
			Pembrolizumab	200 or 400mg/body	day1
			（術後）　200mg 3週毎　もしくは　400mg6週毎		
			副作用：	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
				血球貪食症候群、結核	
				悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎	
肺癌（C34）	*AADC-0362*	*Pembrolizumab+PEM+CDDP*	Pembrolizumab	200mg/body	day1
非扁平上皮非小細胞肺癌（周術期）			Pemetrexed	500mg/㎡	day1
			CDDP	75mg/㎡	day1
			（術前）　3週毎　最大4ｺｰｽ		
			Pembrolizumab	200 or 400mg/body	day1
			（術後）　200mg 3週毎　もしくは　400mg6週毎		
			副作用：	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
				血球貪食症候群、結核	
				悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎	

がんの部位（ICD-Oコード）	承認番号	レジメン名称	用法等		
肺癌（C34）	*AADC-0366*	*Tarlatamab*	Tarlatamab	1mg day1　10mg day8	
白金製剤を含む化学療法後に増悪した小細胞肺癌				10mg day15 以降	
			2週毎		
			副作用：	サイトカイン放出症候群（CRS）	
				免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群（ICANS）を含む神経学的事象	
				骨髄抑制、間質性肺疾患、食欲不振、味覚異常	
肺癌（C34）	*AADC-0368*	*Durvalumab*	Durvalumab	1500mg/body	day1
限局型小細胞肺癌における				体重30kg以下の場合は1回20mg/kg	
根治的化学放射線療法後の維持療法			4週毎		
投与期間は24ヶ月まで			副作用：	間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病	
				肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー	
肺癌（C34）	*AADC-0369*	*Amivantamab+CBDCA+PEM*	Amivantamab	80kg未満　80kg以上	
EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の				350mg/body　350mg/body	day1
切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌				1050mg/body　1400mg/body	day2
EGFR遺伝子変異陽性の				1400mg/body　1750mg/body	day8、day15
切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌				1400mg/body　1750mg/body	day1（2サイクル目）
				1750mg/body　2100mg/body	day1（3サイクル目以降）
			CBDCA	目標AUC=5	day1
			Pemetrexed	500mg/㎡	day1
			3週毎	CBDCAは4ｺｰｽで終了	
			副作用：	ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、爪囲炎、低マグネシウム血症、体液貯留	
				掻痒感、インフュージョンリアクション、下痢、静脈血栓塞栓症	
				肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感	
				下痢、脱毛、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり	
肺癌（C34）	*AADC-0379*	*Durvalumab+PTX+CBDCA*	Durvalumab	1500mg/body	day1
切除可能な非小細胞癌(扁平上皮癌) ⅡA～ⅢB(N2)期			CBDCA	目標AUC=6	day1
			PTX	200mg/㎡	day1
			術前 3週毎 4ｺｰｽ		
			Durvalumab	1500mg/body	day1
			術後 4週毎 12ｺｰｽ		
			副作用：	脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、 発疹	
				食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー	
				間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全	
				難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群	
				急性腎不全、白質脳症、	
				大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病	
				膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎	
肺癌（C34）	*AADC-0380*	*Durvalumab+CBDCA+GEM*	Durvalumab	1500mg/body	day1
切除可能な非小細胞癌(扁平上皮癌) ⅡA～ⅢB(N2)期			CBDCA	目標AUC=5	day1
			GEM	1000mg/㎡	day1,day8
			術前 3週毎 4ｺｰｽ		
			Durvalumab	1500mg/body	day1
			術後 4週毎 12ｺｰｽ		
			副作用：	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
				血球貪食症候群、結核	
				悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎	
肺癌（C34）	*AADC-0381*	*Durvalumab+CDDP+GEM*	Durvalumab	1500mg/body	day1
切除可能な非小細胞癌(扁平上皮癌) ⅡA～ⅢB(N2)期			CDDP	75mg/㎡	day1
			GEM	1000mg/㎡	day1,day8
			術前 3週毎 4ｺｰｽ		

がんの部位（ICD-Oコード）	承認番号	レジメン名称	用法等		
			Durvalumab	1500mg/body	day1
			術後　4週毎　12ｺｰｽ		
			副作用：	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
				血球貪食症候群、結核	
				悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎	
肺癌（C34）	*AADC-0382*	*Durvalumab+CBDCA+PEM*	Durvalumab	1500mg/body	day1
切除可能な非小細胞癌(非扁平上皮癌)　ⅡA～ⅢB(N2)期			Pemetrexed	500mg/㎡	day1
			CBDCA	目標AUC=5	day1
			術前　3週毎　4ｺｰｽ		
			Durvalumab	1500mg/body	day1
			術後　4週毎　12ｺｰｽ		
			副作用：	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
				血球貪食症候群、結核	
				発疹、骨髄抑制、悪心、下痢、味覚異常、便秘、しゃっくり	
肺癌（C34）	*AADC-0383*	*Durvalumab+CDDP+PEM*	Durvalumab	1500mg/body	day1
切除可能な非小細胞癌(非扁平上皮癌)　ⅡA～ⅢB(N2)期			Pemetrexed	500mg/㎡	day1
			CDDP	75mg/㎡	day1
			術前　3週毎　4ｺｰｽ		
			Durvalumab	1500mg/body	day1
			術後　4週毎　12ｺｰｽ		
			副作用：	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
				血球貪食症候群、結核	
				悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎	
肺癌（C34）	*AADC-0390*	*Cemiplimab*	Cemiplimab	1回350mg	3週毎
PD-L1 50% 以上の非小細胞肺癌			副作用：	骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症	
				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐	
				口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害	
				肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害	
				膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎	
肺癌（C34）	*AADC-0391*	*Zongertinib*	Zongertinib	1日1回　1回120mg　を連日経口投与	
化学療法後に増悪したHER2（ERBB2）遺伝子変異陽性の			副作用：	肝機能障害、間質性肺疾患、心機能障害	
切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌				重度の下痢、悪心、血球減少	
				口内炎、皮膚乾燥、そう痒症、爪の障害、発疹	
肺癌（C34）	*AADC-0395*	*Amivantamab(SC)+Lazertinib*	Amivantamab	1600mg/body（80kg未満）　2240mg/body（80kg以上）　皮下投与	
EGFR遺伝子変異陽性の				day1　day8　day15　day22　1サイクル目	
切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌				day1　day15　2サイクル目以降	
			Lazertinib	1回240mg　1日1回　連日経口投与	
			4週毎		
			副作用：	インフュージョンリアクション、間質性肺疾患、静脈血栓塞栓症、動脈血栓塞栓症	
				体液貯留、心不全、角膜障害	
				ざ瘡、発疹、皮膚乾燥、掻痒感、爪囲炎	
				下痢、肝機能障害、低マグネシウム血症、	
肺癌（C34）	*AADC-0396*	*Taletrectinib*	Taletrectinib	1日1回　600mg（3Cap）を空腹時に連日経口投与	
ROS1融合遺伝子陽性肺癌			副作用：	肝機能障害、間質性肺疾患、QT延長、中枢神経障害	

がんの部位（ICD-Oコード）	承認番号	レジメン名称	用法等		
				皮膚粘膜眼症候群、光線過敏性	
				下痢、悪心・嘔吐、脂質異常症、貧血	
胸腺腫（C37）	*AADC-0308*	*ADOC*	DXR	40mg/㎡	day1
			CDDP	50mg/㎡	day1
			VCR	0.6mg/㎡(最大2mg/body)	day3
			CPA	700mg/㎡	day4
			3週毎		
			副作用：	骨髄抑制、心毒性、末梢神経障害、肝障害、悪心・嘔吐、脱毛	
				腎障害、出血性膀胱炎	
胸腺癌（C37）	*AADC-0222*	*Lenvatinib*	用法・用量	1回24mg　1日1回	
進行胸腺癌2次治療以降			副作用：	高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労	
				口内炎、蛋白尿、手掌・足底発赤知覚不全症候群、出	
				動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔	
				可逆性後白質脳症症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延	
				低カルシウム血症	
胸腺癌（C37）	*AADC-0137*	*AMR*	AMR	35～40mg/㎡	
			3週ごと	3～6コース	3日間連続投与
			副作用：	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、脱毛、肝機能障害、発熱	
悪性胸膜中皮腫（C38）	*AADC-0114*	*Pemetrexed+ CDDP療法*	Pemetrexed	500mg/㎡	day1
			CDDP	75mg/㎡	day1
			3週毎		
			副作用：	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、倦怠感、口内炎、神経障害	
悪性胸膜中皮腫（C38）	*AADC-0225*	*Nivolumab*	ニボルマブ	240mg/body	2週間隔
			副作用：	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
悪性胸膜中皮腫（C38）	*AADC-0274*	*Ipilimumab+Nivolumab*	Ipilimumab	1mg/kg	6週間隔
			Nivolumab	360mg/body	3週間隔
			副作用：	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
				血球貪食症候群、結核	
悪性胸膜中皮腫（C38）	*AADC-0349*	*CBDCA+Pemetrexed*	Pemetrexed	500mg/㎡	day1
			CBDCA	目標AUC=5	day1
			3週毎	4-6コース	
			副作用：	肝機能障害、発疹、骨髄抑制、食欲不振、悪心、間質性肺炎、疲労感	
				下痢、味覚異常、アナフィラキシー様症状、便秘、しゃっくり	
悪性胸膜中皮腫（C38）	*AADC-0404*	*Pembrolizumab+CDDP+PEM*	Pembrolizumab	200mg/body	day1
			Pemetrexed	500mg/㎡	day1
			CDDP	75mg/㎡	day1
			3週毎　最大6ｺｰｽ		
			Pembrolizumab	200mg/body	day1
			3週毎　最大35ｺｰｽ(2年間)		
			副作用：	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
				血球貪食症候群、結核	
				悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
悪性胸膜中皮腫(C38)	*AADC-0405*	*Pembrolizumab+CBDCA+PEM*	Pembrolizumab	200mg/body	day1
			Pemetrexed	500mg/㎡	day1
			CBDCA	目標AUC=5	day1
			3週毎 最大6ｺｰｽ		
			Pembrolizumab	200mg/body	day1 day1
			3週毎 最大35ｺｰｽ(2年間)		
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
				血球貪食症候群、結核	
				発疹、骨髄抑制、悪心、下痢、味覚異常、便秘、しゃっくり	
骨髄腫(C42)	*AADC-0161*	*Bortezomib*			
			ボルテゾミブ	1.3mg/㎡ 1日1回 day1.4.8.11	
			3週毎		
			副作用:	肺障害、心障害、末梢性ニューロパシー、イレウス	
				骨髄抑制、低血圧、腫瘍崩壊症候群、皮膚粘膜眼症候群	
				中毒性表皮壊死症、発熱、可逆性後白質脳症症候群	
				食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、肝機能障害	
骨髄腫(C42)	*AADC-0165*	*Bortezomib+Dexamethasone*			
			ボルテゾミブ	1.3mg/㎡ 1日1回 day1.4.8.11	
			デキサメタゾン	20mg 1日1回 day1.2.4.5.8.9.11.12	
			3週毎		
			副作用:	肺障害、心障害、末梢性ニューロパシー、イレウス	
				骨髄抑制、低血圧、腫瘍崩壊症候群、皮膚粘膜眼症候群	
				中毒性表皮壊死症、発熱、可逆性後白質脳症症候群	
				食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、肝機能障害、血管浮腫	
				不眠症、無力症、疲労、錯覚症、筋痙攣、高血糖	
				誘発感染症、続発性副腎皮質機能不全、消化性潰瘍	
				骨粗鬆症、霧視、紅斑、味覚異常、血栓塞栓症、緑内障、	
骨髄腫(C42)	*AADC-0218*	*DRC療法*	デキサメタゾン	20mg 点滴	day1
原発性マクログロブリン血症			リツキシマブ	375mg/㎡ 点滴	day1
			シクロホスファミド	200mg/㎡ 経口	day1～5
			3週毎6ヶ月間		
			副作用:	アナフィラキシー様症状、腫瘍崩壊症候群、肝機能障害、	
				皮膚粘膜症状、皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死融解症	
				骨髄抑制、間質性肺炎、心障害、消化管穿孔、イレウス、 SIADH	
				横紋筋融解症、悪心・嘔吐、脱毛、色素沈着、食欲不振	
				口内炎、不眠、高血糖	
骨髄腫(C42)	*AADC-0397*	*DBd療法*	ダラツムマブ	1800mg 皮下注	1～3サイクル day 1, 8, 15
再発・難治性多発性骨髄腫					4～8サイクル day 1
					9サイクル以降 day 1
			ボルテゾミブ	1.3mg/㎡ 皮下注	1～8サイクル day 1, 4, 8, 11
			デキサメタゾン	20mg/body 1日1回 経口投与	1～8サイクル day 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12
			1～8サイクル	3週毎	
			9サイクル以降	4週毎	
			副作用:	アナフィラキシー様症状、腫瘍崩壊症候群、間接クームス試験への干渉	
				骨髄抑制、末梢性感覚ニューロパチー、呼吸困難、肺炎	
				筋痙縮、疲労、無力症、下痢、便秘、高血圧	
				不眠、末梢浮腫、発熱	
悪性黒色腫(C43)	*AADC-0225*	*Nivolumab*	ニボルマブ	240mg/body 2週間隔	
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	

がんの部位（ICD-Oコード）	承認番号	レジメン名称	用法等		
悪性黒色腫（C43）	*AADC-0272*	*4週毎 Nivolumab*	ニボルマブ	480mg/body　　4週間隔	
			副作用：	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
腹膜癌（C48.2）	*AADC-0402*	*PTX+CBDCA+BEV*	PTX	175mg/㎡	day1
			CBDCA	目標AUC＝6	day1（MAX 800mg/body）
			ベバシズマブ	15mg/kg	day1
			3週毎		
			副作用：	脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振	
				悪心・嘔吐、肝機能障害	
				創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クリーゼ	
腹膜癌（C48.2）	*AADC-0406*	*Weekly TC*	PTX	60mg/㎡	day1
			CBDCA	目標AUC＝2	day1
			週1回　18週間		
			副作用：	脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振	
				悪心・嘔吐、肝機能障害	
悪性軟部腫瘍（C49）	*AADC-0199*	*Pazopanib*	パゾパニブ	1日1回800mg　経口投与	
			副作用：	下痢、疲労、悪心、高血圧、毛髪変色、食欲減退、体重減少、味覚異常	
				肝機能障害、心機能障害、動脈血栓性事象、静脈血栓性事象、出血	
				甲状腺機能障害、ネフローゼ症候群、蛋白尿、感染症、創傷治癒遅延	
悪性軟部腫瘍（C49）	*AADC-0265*	*doxorubicin*	doxorubicin	75mg/㎡	day1
			3週毎 total 6回施行（心毒性に対する用量制限）		
			副作用：	悪心・嘔吐、白血球減少、食欲不振、脱毛、肝機能異常、下痢・軟便	
				全身倦怠感、口内炎	
乳癌（C50）	*AADC-0027*	*Tamoxifen*			
内分泌療法　閉経前			TAM　1日1回20mg		
			副作用：	無月経、月経異常、悪心・嘔吐、食欲不振	
乳癌（C50）	*AADC-0069*	*Zoladex*	ｺﾞｾﾚﾘﾝ	4週に1回3.6mgを皮下投与	
内分泌療法　閉経前			副作用：	肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下	
乳癌（C50）	*AADC-0070*	*Zoladex LA*	ｺﾞｾﾚﾘﾝ	10.8mgを前腹部に12～13週毎に1回投与	
内分泌療法　閉経前			副作用：	肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下	
乳癌（C50）	*AADC-0094*	*Leuprorelin*			
内分泌療法　閉経前			リュープロレリン	4週に1回3.75mgを皮下投与	
				12週に1回11.25mgを皮下投与へ切り替え使用あり	
			副作用：	間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、肝機能障害、黄疸、うつ状態	
				熱感、ほてり、のぼせ、頭痛・頭重、発汗、寝汗、注射部位障害	
				悪心・嘔吐、体重増加	
乳癌（C50）	*AADC-0095*	*Leuprorelin +TAM療法*			
内分泌療法　閉経前			リュープロレリン	4週に1回3.75mgを皮下投与	
				12週に1回11.25mgを皮下投与へ切り替え使用あり	
			TAM	1日1回20mg	
			副作用：	間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、肝機能障害、黄疸、うつ状態	
				熱感、ほてり、のぼせ、頭痛・頭重、発汗、寝汗、注射部位障害	
				悪心・嘔吐、体重増加、無月経、月経異常	
乳癌（C50）	*AADC-0096*	*Leuprorelin + Femara療法*			
内分泌療法　閉経前			リュープロレリン	4週に1回3.75mgを皮下投与	
				12週に1回11.25mgを皮下投与へ切り替え使用あり	
			レトロゾール	1日1回2.5mg	
			副作用：	間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、肝機能障害、黄疸、うつ状態	
				熱感、ほてり、のぼせ、頭痛・頭重、発汗、寝汗、注射部位障害	
				悪心・嘔吐、体重増加、関節痛、発疹、掻痒感、血栓症、塞栓症	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
乳癌(C50)	*AADC-0097*	*Femara*	
内分泌療法 閉経前			レトロゾール　1日1回2.5mg
			副作用:　ほてり、頭痛、関節痛、悪心、発疹、掻痒感、肝機能障害
			塞栓症、血栓症
乳癌(C50)	*AADC-0030*	*Arimidex*	
内分泌療法 閉経後			アナストロゾール　1日1回　1mg
			副作用:　ほてり、嘔気、脱毛、性器出血
乳癌(C50)	*AADC-0031*	*Aromasin*	
内分泌療法 閉経後			エキセメスタン　1日1回　25mg
			副作用:　ほてり、多汗、高血圧、めまい、悪心、疲労
乳癌(C50)	*AADC-0032*	*Fareston*	
内分泌療法 閉経後			トレミフェン　1日1回40mg
			副作用:　肝機能障害、白血球減少
乳癌(C50)	*AADC-0033*	*high dose Fareston*	
内分泌療法 閉経後			トレミフェン　1日1回120mg
			副作用:　肝機能障害、白血球減少
乳癌(C50)	*AADC-0034*	*Hysron-H*	
内分泌療法 閉経後			MPA　1日600から1200mg　分3
			副作用:　体重増加、満月様顔貌、子宮出血、浮腫、血栓症、月経異常
乳癌(C50)	*AADC-0001*	*S-1(CG)*	
化学療法			用法　a.4週投与　2週休薬法
			b.2週投与　1週休薬法(副作用の軽減を目的)
			用量　朝食後および夕食後の1日2回
			体表面積　1.25㎡未満　40mg/回
			1.25から1.5㎡未満　50 mg/回
			1.5㎡以上　60mg/回
			副作用:　骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、口内炎、色素沈着、発疹
乳癌(C50)	*AADC-0010*	*UFT(UFTE)*	
化学療法			用法・用量　1日量としてテガフール300-600mgを1日2-3回に分割投与
			副作用:　食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、骨髄抑制、肝機能障害
乳癌(C50)	*AADC-0035*	*Xeloda*	
化学療法			カペシタビン　1日2回　3週連続投与　1週休薬
			体表面積　1.31㎡未満　900mg/回
			1.31から1.64㎡未満　1200mg/回
			1.64㎡以上　1500mg/回
			副作用:　手足症候群、骨髄抑制
乳癌(C50)	*AADC-0036*	*weekly PTX*	
化学療法			PTX　100mg/㎡　6週投与2週休薬
			副作用:　脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛、関節痛
			悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常
乳癌(C50)	*AADC-0038*	*tri-weekly DTX*	
化学療法			DTX　60～75mg/㎡　day1　3週毎
			副作用:　脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制
			肝機能障害、腎機能障害
乳癌(C50)	*AADC-0040*	*FEC100療法*	
化学療法			5-FU　500mg/㎡　day1
			EPI　100mg/㎡　day1
			CPA　500mg/㎡　day1
			3週毎
			副作用:　悪心・嘔吐、白血球減少、食欲不振、脱毛、肝機能異常、下痢・軟便
			全身倦怠感、口内炎
乳癌(C50)	*AADC-0042*	*weekly Trastuzumab*	
化学療法			トラスツズマブ　初回　4mg/kg
			2回目以降　2mg/kg
			毎週投与
			副作用:　発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制
乳癌(C50)	*AADC-0043*	*bi weekly Trastuzumab*	
化学療法			ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ　4mg/kg　day1
			2週毎

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等			
			副作用:	発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制		
乳癌(C50)	*AADC-0044*	***bi weekly PTX + Trastuzumab療法***				
化学療法			PTX	80mg/㎡	day1	
			ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	4mg/kg	day1	
			2週毎			
			副作用:	脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛		
				関節痛、悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常、発熱、悪寒		
乳癌(C50)	*AADC-0045*	***VNR***		アントラサイクリン系・タキサン系無効例		
化学療法			VNR	25mg/㎡ 1週間間隔で2回投与 1週休薬		
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、嘔気・嘔吐、静脈炎、発熱、口内炎		
				電解質異常		
乳癌(C50)	*AADC-0046*	***VNR + Trastuzumab療法***				
化学療法			VNR	25mg/㎡	day1	2回投与1週休薬
			ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	2mg/kg	day1	毎週投与 (初回は4mg/kg)
			3週毎			
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、嘔気・嘔吐、静脈炎、発熱、口内炎		
				電解質異常、悪寒		
乳癌(C50)	*AADC-0087*	***tri-weekly Trastuzumab***				
化学療法			ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	初回8mg/kg	day1	
				2回目以降 6mg/kg day1		
			3週毎			
			副作用:	発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制		
乳癌(C50)	*AADC-0088*	***weekly trastuzumab + PTX療法***				
化学療法			PTX	80mg/㎡	day1	
			ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	2mg/kg	day1	
			毎週投与			
			副作用:	脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛		
				関節痛、悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常、発熱、悪寒		
乳癌(C50)	*AADC-0129*	***Tykerb + Xeloda 療法***				
化学療法			ﾀｲｹﾙﾌﾞ	1回1250mg 1日1回 連日投与		
			カペシタビン	1回1000mg/㎡ 1日2回 2週連続投与 1週休薬		
			副作用:	手足症候群、骨髄抑制、下痢、口内炎、倦怠感、嘔気・嘔吐		
乳癌(C50)	*AADC-0130*	***DTX+Cyclohosphamide療法***				
化学療法			DTX	60～75mg/㎡	day1	
			CPA	500～600mg/㎡	day1	
			3週毎			
			副作用:	脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制		
				肝機能障害、腎機能障害		
乳癌(C50)	*AADC-0131*	***DTX +Xeloda療法***				
化学療法			DTX	60～75mg/㎡	day1	3週毎
			カペシタビン	1回1250mg/㎡ 1日2回 2週連続投与 1週休薬		
			副作用:	脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制		
				肝機能障害、腎機能障害、手足症候群		
乳癌(C50)	*AADC-0132*	***DTX+tri-weekly Trastuzumab 療法***				
化学療法			DTX	60～75mg/㎡	day1	3週毎
			ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	初回8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	day1	3週毎
			副作用:	脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制		
				肝機能障害、腎機能障害		
乳癌(C50)	*AADC-0144*	***XELODA + Trastuzumab療法***				
化学療法			カペシタビン	1回1250mg/㎡ 1日2回 2週連続投与 1週休薬		
			ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	6mg/kg	day1	3週毎
			副作用:	発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制、手足症候群		
乳癌(C50)	*AADC-0149*	***Bevacizumab based TC療法***	PTX	200mg/㎡ day1		
トリプルネガティブ			CBDCA	目標AUC=6 day1		
			ベバシズマブ	15mg/kg	day1	3週ごと
			CBDCA＋PTX＋ベバシズマブを3週間間隔で4～6サイクル実施後、アバスチン単独を			
			3週間間隔で投与する			

がんの部位（ICD-Oコード）	承認番号	レジメン名称	用法等	
			副作用：	脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振、悪心・嘔吐、
				肝機能障害、高血圧、消化管穿孔、創傷治癒遅延、喀血、肺出血、血栓塞栓症
乳癌（C50）	*AADC-0150*	*tri-weekly Abraxane*		
進行・再発乳癌			アブラキサン	1回　260mg/㎡　　3週毎
化学療法			副作用：	脱毛、疲労、筋痛、末梢神経障害、骨髄抑制、下痢、悪心嘔吐
乳癌（C50）	*AADC-0166*	*Eribulin*		
ｱﾝﾄﾗｻｲｸﾘﾝ及びタキサンを含む抗がん剤治療後			ハラヴェン	1.4mg/㎡　　day1、8
再発・転移乳癌			3週ごと	
化学療法			副作用：	骨髄抑制、脱毛、疲労、食欲減退、発熱、便秘、下痢、嘔吐
				口内炎、味覚異常、末梢神経障害、肝機能障害、間質性肺炎
乳癌（C50）	*AADC-0167*	*Fulvestrant*		
内分泌療法　閉経後			フルベストラント	1回2筒（1筒250mg）　左右の臀部に1筒ずつ筋肉内投与
				初回、2週後、4週後、その後4週ごとに1回
			副作用：	注射部位疼痛、注射部位硬結、ほてり、注射部位掻痒感
				肝機能障害、血栓塞栓症、悪心、便秘、卵巣腫大、頭痛
				感覚異常、不眠症、背部痛、筋肉痛、高TG血症、高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症
乳癌（C50）	*AADC-0172*	*CMF(経口法)*		
			MTX	40mg/㎡　　day1、8
			5-FU	600mg/㎡　　day1、8
			CPA	1回50mg　1日2回　　day1～15
			4週ごと	
			副作用：	嘔気・嘔吐、食欲不振、脱毛、肝機能障害、口内炎、骨髄抑制
乳癌（C50）	*AADC-0173*	*CMF(静注法)*		
			MTX	40mg/㎡　　day1
			5-FU	600mg/㎡　　day1
			CPA	600mg/㎡　　day1
			3週ごと	
			副作用：	嘔気・嘔吐、食欲不振、脱毛、肝機能障害、口内炎、骨髄抑制
乳癌（C50）	*AADC-0174*	*Bevacizumab ＋ PTX療法*		
			PTX	90mg/㎡　　day1,8,15
			ベバシズマブ	10mg/kg　　day1,15
			4週ごと	
			副作用：	嘔気・嘔吐、食欲不振、脱毛、肝機能障害、口内炎、骨髄抑制
				末梢神経障害、関節痛、筋肉痛、下痢、高血圧、蛋白尿
				出血、消化管穿孔、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クリーゼ
				可逆性後白質脳症症候群、創傷治癒遅延、味覚異常、爪の障害
乳癌（C50）	*AADC-0190*	*Gemcitabine*	GEM	1250mg/㎡　　day1,8
		手術不能又は再発乳癌	3週ごと	
			副作用：	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感
				間質性肺炎、アナフィラキシー様症状、心筋梗塞、うっ血性心不全
				肺水腫、気管支痙攣、ARDS、腎不全、溶血性尿毒症症候群
乳癌（C50）	*AADC-0195*	*THP療法*	用法・用量	1クール目
進行・再発乳癌				Pertuzumab　840mg/body　　day1
補助化学療法				Trastuzumab 8mg/kg　　day1
				DTX 75mg/㎡　　day1
				2クール目
				Pertuzumab　420mg/body　　day1
				Trastuzumab 6mg/kg　　day1
				DTX 75mg/㎡　　day1
				1クール＝3週間
				DTX を6サイクルまで投与し、7サイクル以降が主治医の判断で継続
			副作用	下痢、脱毛、爪の異常、倦怠感、嘔気・嘔吐、しびれ、発疹、骨髄抑制
				インフュージョンリアクション、うっ血性心不全
乳癌（C50）	*AADC-0203*	*Everolimus*	Everolimus	1日1回10mgを経口投与　（ホルモン療法併用）

がんの部位（ICD-Oコード）	承認番号	レジメン名称	用法等			
			副作用：	口内炎、発疹、疲労、食欲減退、下痢、味覚異常、悪心		
				感染症、体重減少、貧血、鼻出血、高血糖、血小板減少		
				掻痒症		
乳癌（C50）	*AADC-0207*	*P/T+Eribulin*	Pertuzumab	初回840mg/body	2回目以降420mg/body	day1
			Trastuzumab	初回8mg/kg	2回目以降6mg/kg	day1
			Eribulin	1.4mg/㎡		day1、day8
			3週ごと			
			副作用：	インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、脱毛、倦怠感		
				骨髄抑制、悪心、爪の異常、ニューロパチー、発疹、間質性肺炎		
				流涙増加、肝機能障害、アナフィラキシー、浮腫、疼痛		
乳癌（C50）	*AADC-0209*	*T-DM1(手術不能または再発乳癌)*	T-DM1	3.6mg/kg	day1	
			3週ごと			
			副作用：	倦怠感、鼻出血、悪心、発熱、食欲減退、骨髄抑制、肝機能障害		
				間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション		
				末梢神経障害		
乳癌（C50）	*AADC-0217*	*EC療法*	EPI	100mg/㎡	day1	
			CPA	600mg/㎡	day1	
			3週毎			
			副作用：	骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎		
				出血性膀胱炎、下痢、口内炎、アナフィラキシー、排尿障害		
				イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、		
乳癌（C50）	*AADC-0221*	*AC療法*	ADM	60mg/㎡	day1	
			CPA	600mg/㎡	day1	
			3週毎			
			副作用：	骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎		
				口内炎、心電図異常、出血性膀胱炎、下痢、、肝機能障害		
				イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、急性腎不全		
				アナフィラキシー、排尿障害		
乳癌（C50）	*AADC-0226*	*Leuprorerin Pro*	Leuprorerin Pro22.5mg		24週毎皮下注射	
			副作用：	注射部位硬結、注射部位紅斑、注射部位疼痛、糖尿病、ほてり		
				間質性肺炎、アナフィラキシー、肝機能障害、血栓塞栓症		
乳癌（C50）	*AADC-0234*	*TC+tri weekly Trastuzumab*	DTX	75mg/㎡	day1	
化学療法			CPA	600mg/㎡	day1	
			ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	初回8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	day1	
			3週毎			
			副作用：	脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制		
				肝機能障害、腎機能障害		
乳癌（C50）	*AADC-0238*	*Palbociclib + Letrozole*	パルボシクリブ	1日1回125mg	3週連続投与1週休薬	
			レトロゾール	1日1回2.5mg	連続投与	
			4週毎			
			副作用：	ほてり、頭痛、関節痛、悪心、発疹、掻痒感、肝機能障害		
				塞栓症、血栓症		
				骨髄抑制、脱毛、疲労、感染症、口内炎、下痢、間質性肺炎		
乳癌（C50）	*AADC-0239*	*Palbociclib + fulvestrant*	パルボシクリブ	1日1回125mg	3週連続投与1週休薬	
			フルベストラント	1回2筒（1筒250mg） 左右の臀部に1筒ずつ筋肉内投与		
				day1,day15 その後はサイクル1の1日目から換算して18日（±7日）毎		
			副作用：	注射部位疼痛、注射部位硬結、ほてり、注射部位掻痒感		
				肝機能障害、血栓塞栓症、悪心、便秘、卵巣腫大、頭痛		
				感覚異常、不眠症、背部痛、筋肉痛、高TG血症、高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症		
				骨髄抑制、脱毛、疲労、感染症、口内炎、下痢、間質性肺炎		

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
乳癌(C50)	*AADC-0244*	*Abemaciclib*	アベマシクリブ　1回150mgを1日2回経口投与（ﾌﾙﾍﾞｽﾄﾗﾝﾄorﾚﾄﾛｿﾞｰﾙorｱﾅｽﾄﾛｿﾞｰﾙと併用）
			副作用：　肝機能障害、骨髄抑制、下痢、間質性肺炎
			静脈血栓塞栓症、感染症、悪心、嘔吐
			疲労、脱毛症
			血清クレアチニン上昇
乳癌(C50)	*AADC-0248*	*Olaparib*	オラパリブ　1回300mgを1日2回経口投与
			副作用：　悪心、嘔吐、味覚異常
			貧血、好中球減少、血小板減少、リンパ球減少
			疲労、無力症、間質性肺炎
			下痢、頭痛
乳癌(C50)	*AADC-0249*	*nab-PTX+trasutuzumab*	nab-PTX　1回　260mg/㎡　3週毎
			ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ　初回8mg/kg　day1
			2回目以降　6mg/kg　day1
			3週毎
			副作用：　発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制
			脱毛、筋痛、末梢神経障害、下痢
乳癌(C50)	*AADC-0255*	*nab-PTX+Atezolizumab*	Atezolizumab　840mg/回　点滴静注　day1、day15
ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性　再発進行			nab-PTX　100mg/㎡　点滴静注　day1、day8、day15
			その後13日間休薬　28日で1ｺｰｽ
			副作用：　発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制
			脱毛、筋痛、末梢神経障害、下痢
			疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症
			間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病
			甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎
			髄膜炎、神経障害
乳癌(C50)	*AADC-0258*	*DD-EC*	EPI　90mg/㎡　day1
			CPA　600mg/㎡　day1
			ﾍﾟｸﾞﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑ　3.6mg　day2
			2週毎
			副作用：　骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎
			出血性膀胱炎、下痢、口内炎、アナフィラキシー、排尿障害
			イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、
乳癌(C50)	*AADC-0263*	*DD-PTX*	PTX　175mg/㎡　day1
			ﾍﾟｸﾞﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑ　3.6mg　day2
			2週毎
			副作用：　脱毛、疲労、筋痛、末梢神経障害、骨髄抑制、下痢、悪心嘔吐
乳癌(C50)	*AADC-0264*	*Trastuzumab Deruxtecan*	Trastuzumab Deruxtec　5.4mg/kg　day1
進行再発乳癌			3週ごと
			副作用：　間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション
			骨髄抑制、脱毛、疲労、悪心・嘔吐、下痢、便秘、口内炎
乳癌(C50)	*AADC-0269*	*T-DM1(術後)*	T-DM1　3.6mg/kg　day1
			3週ごと　(投与回数は14回まで)
			副作用：　倦怠感、鼻出血、悪心、発熱、食欲減退、骨髄抑制、肝機能障害
			間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション
			末梢神経障害
乳癌(C50)	*AADC-0286*	*CBDCA+GEM*	GEM　1000mg/㎡　day1.8
			CBDCA　AUC2　day1.8
			3週毎
			副作用：　悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、発熱、皮疹

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等			
乳癌(C50)	*AADC-0287*	*Pembrolizumab+CBDCA+GEM*	Pembrolizumab	200mg/body	day1	
			GEM	1000mg/㎡	day1.8	
			CBDCA	AUC2	day1.8	
			3週毎			
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、発熱、皮疹		
				疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症		
				間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病		
				甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎		
				髄膜炎、神経障害		
乳癌(C50)	*AADC-0288*	*Pembrolizumab+CBDCA+GEM*	Pembrolizumab	200mg/body	day1	
ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行			GEM	1000mg/㎡	day1.8	day22.29
			CBDCA	AUC2	day1.8	day22.29
			6週毎			
			副作用:	AADC-0287と同様		
乳癌(C50)	*AADC-0289*	*Pembrolizumab+nab-PTX*	Pembrolizumab	200mg/body	day1	3週毎
ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行			nab-PTX	100mg/㎡ 点滴静注	day1,8,15	4週毎
			副作用:	発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制		
				脱毛、筋痛、末梢神経障害、下痢		
				疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症		
				間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病		
				甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎		
				髄膜炎、神経障害		
乳癌(C50)	*AADC-0290*	*Pembrolizumab+nab-PTX*	Pembrolizumab	200mg/body	day1	6週毎
ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行			nab-PTX	100mg/㎡ 点滴静注	day1,8,15	4週毎
			副作用:	AADC-0289と同様		
乳癌(C50)	*AADC-0291*	*Pembrolizumab+PTX 3週*	Pembrolizumab	200mg/body	day1	3週毎
ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行			PTX	90mg/㎡ 点滴静注	day1,8,15	4週毎
			副作用:	脱毛、骨髄抑制、肝機能障害、腎機能障害、末梢神経障害、筋肉痛、関節痛		
				悪心・嘔吐、下痢、倦怠感、電解質異常		
				疲労、食欲減退、咳、呼吸困難、無力症		
				間質性肺炎、肝機能障害、大腸炎、膵炎、1型糖尿病		
				甲状腺機能障害、副腎機能障害、下垂体炎、脳炎		
				髄膜炎、神経障害		
乳癌(C50)	*AADC-0292*	*Pembrolizumab+PTX 6週*	Pembrolizumab	200mg/body	day1	6週毎
ホルモン受容体陰性・HER2陰性・PD-L1陽性 再発進行			PTX	90mg/㎡ 点滴静注	day1,8,15	4週毎
			副作用:	AADC-0291と同様		
乳癌(C50)	*AADC-0311*	*Pembrolizumab+CBDCA+PTX*	Pembrolizumab	200mg/body	day1	
トリプルネガティブ進行乳癌 術前			CBDCA	目標AUC=5/body	day1	
			PTX	80mg/㎡	day1,8,15	
			3週毎 術前4コース			
			副作用:	脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、 発疹		
				食欲不振、悪心、肝機能障害、口内炎、アナフィラキシー		
				間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全		
				難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群		
				急性腎不全、白質脳症、		
				大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病		
				膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎		
乳癌(C50)	*AADC-0312*	*Pembrolizumab+EC*	Pembrolizumab	200mg/body	day1	
トリプルネガティブ進行乳癌 術前			EPI	90mg/㎡	day1	
			CPA	600mg/㎡	day1	
			3週毎 術前4コース			
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、脱毛、心筋障害、間質性肺炎		

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等
			出血性膀胱炎、下痢、口内炎、アナフィラキシー、排尿障害
			イレウス、SIADH、皮膚障害、横紋筋融解症、
			難聴、消化管穿孔、腸管麻痺、DIC、TEN、皮膚粘膜眼症候群
			急性腎不全、白質脳症、
			大腸炎、皮膚障害、神経障害、内分泌障害、1型糖尿病
			膵炎、筋炎、重症筋無力症、心筋炎
乳癌(C50)	*AADC-0313*	*Pembrolizumab 200mg 3週毎*	ペムブロリズマブ　1回200mg　day1
トリプルネガティブ進行乳癌　術後　9回まで			3週毎　術後9コースまで
			副作用:　骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症
			甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐
			口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害
			肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害
			膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
乳癌(C50)	*AADC-0314*	*Pembrolizumab 400mg 6週毎*	ペムブロリズマブ　1回400mg　day1
トリプルネガティブ進行乳癌　術後　5回まで			6週毎　術後5コースまで
			副作用:　AADC-0313と同様
乳癌(C50)	*AADC-0326*	*PT+PTX*	用法・用量　1クール目
HER2陽性乳癌			Pertuzumab　840mg/body　day1
			Trastuzumab 8mg/kg　day1
			PTX 80mg/㎡　day1、8、15
			2クール目以降
			Pertuzumab　420mg/body　day1
			Trastuzumab 6mg/kg　day1
			PTX 80mg/㎡　day1、8、15
			1クール＝3週間
			副作用　下痢、脱毛、倦怠感、しびれ、骨髄抑制
			インフュージョンリアクション、うっ血性心不全
乳癌(C50)	*AADC-0339*	*P/T+nab-PTX*	用法・用量　1クール目
HER2陽性乳癌			Pertuzumab　840mg/body　day1
			Trastuzumab 8mg/kg　day1
			nab-PTX 260mg/㎡　day1
			2クール目以降
			Pertuzumab　420mg/body　day1
			Trastuzumab 6mg/kg　day1
			nab-PTX 260mg/㎡　day1
			1クール＝3週間
			副作用:　発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制
			脱毛、筋痛、末梢神経障害、下痢
			インフュージョンリアクション、うっ血性心不全
乳癌(C50)	*AADC-0340*	*PHESGO+DTX*	ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ　として
HER2陽性乳癌			初回(IN)　それぞれ　1200mg、600mg、30000U　day1
			2回目以降(MA)　それぞれ　600mg、600mg、20000U　day1
			初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与
			DTX 75mg/㎡　day1
			3週ごと
			副作用:　インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感
			間質性肺炎,悪心、口内炎
			脱毛、筋痛、末梢神経障害、爪の異常
乳癌(C50)	*AADC-0341*	*PHESGO+Eribulin*	ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ　として
HER2陽性乳癌			初回(IN)　それぞれ　1200mg、600mg、30000U　day1
			2回目以降(MA)　それぞれ　600mg、600mg、20000U　day1

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
				初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与	
				Eribulin 1.4mg/㎡	day1、8
			3週ごと		
			副作用:	インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感	
				間質性肺炎,悪心、口内炎、末梢神経障害	
乳癌(C50)	*AADC-0342*	*PHESGO+PTX*	ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として		
HER2陽性乳癌			初回(IN)	それぞれ 1200mg、600mg、30000U	day1
			2回目以降(MA)	それぞれ 600mg、600mg、20000U	day1
				初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与	
				PTX 80mg/㎡	day1、8、15
			3週ごと		
			副作用:	インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感	
				間質性肺炎,悪心、口内炎	
				脱毛、筋痛、末梢神経障害	
乳癌(C50)	*AADC-0343*	*PHESGO+nab-PTX*	ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として		
HER2陽性乳癌			初回(IN)	それぞれ 1200mg、600mg、30000U	day1
			2回目以降(MA)	それぞれ 600mg、600mg、20000U	day1
				初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与	
				nab-PTX 260mg/㎡	day1
			3週ごと		
			副作用:	インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感	
				間質性肺炎,悪心、口内炎	
				脱毛、筋痛、末梢神経障害	
乳癌(C50)	*AADC-0344*	*PHESGO*	ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼアルファ として		
HER2陽性乳癌			初回(IN)	それぞれ 1200mg、600mg、30000U	day1
術前・術後の場合は投与期間は12ヶ月まで			2回目以降(MA)	それぞれ 600mg、600mg、20000U	day1
				初回は8分以上、2回目以降は5分以上かけて皮下投与	
			3週ごと		
			副作用:	インフュージョンリアクション、左室機能不全、下痢、倦怠感	
				間質性肺炎,悪心、口内炎	
乳癌(C50)	*AADC-0351*	*Capivasertib*	カピバセルチブ	1回400mgを1日2回 経口投与 4日間服用3日間休薬	
			副作用:	高血糖、下痢、皮膚障害	
				悪心・嘔吐、口内炎、発疹、疲労	
				味覚不全、腎機能障害	
乳癌(C50)	*AADC-0358*	*Talazoparib*	タラゾパリブ	1回1mgを1日1回 経口投与	
BRCA遺伝子変異陽性かつHER2陰性乳癌			副作用:	骨髄抑制、間質性肺疾患、血栓塞栓症、二次性悪性腫瘍	
				口内炎、倦怠感、悪心、脱毛	
				下痢、頭痛	
乳癌(C50)	*AADC-0363*	*Sacituzumab Govitecan*	サシツズマブ ゴビテカ	10mg/kg	day1、8
化学療法歴のあるホルモン受容体陰性かつHER2陰性乳癌			3週ごと		
化学療法歴のあるホルモン受容体陽性かつHER3陰性乳癌			副作用:	骨髄抑制、下痢・腸炎、悪心・嘔吐、インフュージョンリアクション	
				間質性肺疾患、肝機能障害、脱毛、倦怠感	
乳癌(C50)	*AADC-0365*	*Datopotamab Deruxtecan*	Datopotamab Deruxtec	6mg/kg	day1
化学療法歴のあるホルモン受容体陽性かつHER2陰性乳癌			3週ごと		
			副作用:	間質性肺疾患、角膜障害、口内炎、過敏症、インフュージョンリアクション	
				骨髄抑制、脱毛、疲労、悪心・嘔吐、下痢、便秘	
乳癌(C50)	*AADC-0394*	*Tucatinib+Trastuzumab+Capecitabine*	ツカチニブ	1回300mg 1日2回	連日経口投与
化学療法歴のあるHER2陽性乳癌			カペシタビン	1回1000mg/㎡(C法) 1日2回	2週投与 1週休薬
			トラスツズマブ	初回 8mg/kg、2回目以降 6mg/kg	day1
			3週毎		
			副作用:	発熱、嘔気・嘔吐、悪寒、倦怠感、骨髄抑制、手足症候群	

がんの部位（ICD-Oコード）	承認番号	レジメン名称	用法等		
			下痢、肝機能障害、心機能障害、間質性肺疾患		
乳癌（C50）	*AADC-0403*	*T-DXd+PER*	Trastuzumab Deruxtec	5.4mg/kg	day1
HER2陽性乳癌			Pertuzumab	初回840mg/body	day1
				2回目以降420mg/body	
			3週ごと		
			副作用:	間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション	
				骨髄抑制、脱毛、疲労、悪心・嘔吐、下痢、便秘、口内炎	
				左室機能不全、倦怠感	
子宮頚癌（C53）	*AADC-0082*	*NDP+CPT-11療法*	CPT-11	60mg/㎡	day1、8
			ﾈﾀﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	100mg/㎡	day1
			3週毎		
			副作用:	下痢、悪心・嘔吐、骨髄抑制、腎機能障害、肝機能障害	
子宮体癌（C54）	*AADC-0019*	*PTX + CBDCA療法(TC)*			
			PTX	180mg/㎡	day1
			CBDCA	目標AUC＝5	day1
			3～4週ごと		
			副作用:	脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振	
				悪心・嘔吐、肝機能障害	
子宮体癌（C54）	*AADC-0080*	*DTX+CBDCA療法(DC)*			
			DTX	60～75mg/㎡	day1
			CBDCA	目標AUC＝5	day1
			副作用:	脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制	
				肝機能障害	
子宮体癌（C54）	*AADC-0081*	*CPA+ADM+CDDP療法(CAP)*			
			CPA	500mg/㎡	day1
			DXR	50mg/㎡	day1
			CDDP	50mg/㎡	day1
			4週ごと		
			副作用:	脱毛、骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、口内炎、全身倦怠感	
卵巣癌（C56）	*AADC-0019*	*PTX + CBDCA療法(TC)*			
			PTX	180mg/㎡	day1
			CBDCA	目標AUC＝5	day1
			3～4週ごと		
			副作用:	脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振	
				悪心・嘔吐、肝機能障害	
卵巣癌（C56）	*AADC-0080*	*DTX+CBDCA療法(DC)*			
			DTX	60～75mg/㎡	day1
			CBDCA	目標AUC＝5	day1
			副作用:	脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制	
				肝機能障害	
卵巣癌（C56）	*AADC-0081*	*CPA+ADM+CDDP療法(CAP)*			
			CPA	500mg/㎡	day1
			DXR	50mg/㎡	day1
			CDDP	50mg/㎡	day1
			4週ごと		
			副作用:	脱毛、骨髄抑制、悪心・嘔吐、食欲不振、口内炎、全身倦怠感	
卵巣癌（C56）	*AADC-0133*	*DOXIL*			
			DXR	50mg/㎡を1mg/分で静注	day1
			4週ごと		
			副作用:	骨髄抑制、アナフィラキシー用症状、手足症候群、口内炎、肝機能障害	
				悪心、食欲不振、発疹、疲労、体重減少、心筋障害	
卵巣癌（C56）	*AADC-0375*	*TC(術後補助化学療法)*	PTX	175mg/㎡	day1
			CBDCA	目標AUC＝6	day1（MAX 800mg/body）
			3週毎　最大6コース		
			副作用:	脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
				悪心・嘔吐、肝機能障害	
卵巣癌(C56)	*AADC-0402*	*PTX+CBDCA+BEV*	PTX	175mg/㎡	day1
			CBDCA	目標AUC＝6	day1 (MAX 800mg/body)
			ベバシズマブ	15mg/kg	day1
			3週毎		
			副作用:	脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振	
				悪心・嘔吐、肝機能障害	
				創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クリーゼ	
卵巣癌(C56)	*AADC-0406*	*Weekly TC*	PTX	60mg/㎡	day1
			CBDCA	目標AUC＝2	day1
			週1回 18週間		
			副作用:	脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振	
				悪心・嘔吐、肝機能障害	
卵巣杯細胞性悪性腫瘍(C56)	*AADC-0075*	*EP療法*			
			VP-16	100mg/㎡	day1～5
			CDDP	20mg/㎡	day1～5
			1クール:3週		
			副作用:	骨髄抑制、食欲不振、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、	
卵巣杯細胞性悪性腫瘍(C56)	*AADC-0083*	*BEP療法*			
			BLM	30mg/body	day2､9､16
			VP-16	100mg/㎡	day1～5
			CDDP	20mg/㎡	day1～5
			1クール:3週		
			副作用:	間質性肺炎、肺繊維症、皮膚の硬化、色素沈着、発熱・悪寒、脱毛、食欲不振	
			体重減少、全身倦怠感、悪心・嘔吐、骨髄抑制、		
卵管癌(C57.0)	*AADC-0402*	*PTX+CBDCA+BEV*	PTX	175mg/㎡	day1
			CBDCA	目標AUC＝6	day1 (MAX 800mg/body)
			ベバシズマブ	15mg/kg	day1
			3週毎		
			副作用:	脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振	
				悪心・嘔吐、肝機能障害	
				創傷治癒遅延、出血、血栓塞栓症、高血圧性脳症、高血圧性クリーゼ	
卵管癌(C57.0)	*AADC-0406*	*Weekly TC*	PTX	60mg/㎡	day1
			CBDCA	目標AUC＝2	day1
			週1回 18週間		
			副作用:	脱毛、骨髄抑制、関節痛、筋肉痛、末梢神経障害、食欲不振	
				悪心・嘔吐、肝機能障害	
前立腺癌(C61)	*AADC-0038*	*tri-weekly DTX*			
			DTX 60～75mg/㎡	day1	3週毎
			副作用:	脱毛、食欲不振、全身倦怠感、悪心・嘔吐、発熱、下痢、骨髄抑制	
				肝機能障害、腎機能障害	
前立腺癌(C61)	*AADC-0064*	*Prostal*			
			ｸﾛﾙﾏｼﾞﾝ	1回50mg1日2回	
			副作用:	インポテンツ、浮腫、体重増加、女性化乳房	
前立腺癌(C61)	*AADC-0065*	*Casodex*			
			ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ	1回80mg1日1回	
			副作用:	乳房腫脹、乳房圧痛、肝機能障害、勃起力低下	
前立腺癌(C61)	*AADC-0066*	*Odyne*			
			ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ	1回125mg 1日3回	
			副作用:	肝機能障害、女性型乳房、悪心・嘔吐	
前立腺癌(C61)	*AADC-0067*	*Estracyt*			
			ｴｽﾄﾗﾑｽﾁﾝ	1回280mg 1日2回	
			副作用:	女性化乳房、食欲不振、浮腫、貧血、肝機能異常	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
前立腺癌(C61)	*AADC-0068*	*Leuplin*		
			ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ	4週に1回3.75mgを皮下投与
			副作用:	肝機能障害、ほてり、熱感
前立腺癌(C61)	*AADC-0070*	*Zoladex LA*		
			ｺﾞｾﾚﾘﾝ	10.8mgを前腹部に12～13週毎に1回投与
			副作用:	肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下
前立腺癌(C61)	*AADC-0103*	*多剤ﾎﾙﾓﾝ療法無効前立腺癌 Prosexol*		
			ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ	1回0.5～1.0mg 1日3回
			副作用:	血栓症、心不全、狭心症、発疹、肝機能障害、血圧上昇、電解質異常
前立腺癌(C61)	*AADC-0124*	*Casodex + ZoladexLA 療法*		
			ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ	1回80mg1日1回
			ｺﾞｾﾚﾘﾝ	10.8mgを前腹部に12～13週毎に1回投与
			副作用:	肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下
				乳房腫脹、乳房圧痛、肝機能障害
前立腺癌(C61)	*AADC-0125*	*Casodex + Leuplin 療法*		
			ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ	1回80mg1日1回
			ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ	4週ごとに3.75mgまたは12週ごとに11.25mgを皮下投与
			副作用:	肝機能障害、代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下
				ほてり、熱感
前立腺癌(C61)	*AADC-0127*	*Odyne + ZoladexLA 療法*		
			ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ	1回125mg 1日3回
			ｺﾞｾﾚﾘﾝ	10.8mgを前腹部に12～13週毎に1回投与
			副作用:	肝機能障害、女性型乳房、悪心・嘔吐
				代謝・栄養障害、前立腺癌随伴症状の憎悪、勃起力低下
前立腺癌(C61)	*AADC-0187*	*Degarelix*	ﾃﾞｶﾞﾚﾘｸｽ	初回240mgを1箇所あたり120mgずつ腹部2箇所に皮下投与
				2回目以降80mgを腹部1箇所に皮下投与
				4週毎
			副作用:	注射部位疼痛、注射部位硬結、注射部位紅斑、ほてり、体重増加
				発熱、高血圧、注射部位熱感、間質性肺炎、肝機能障害、糖尿病憎悪
				心不全、血栓塞栓症、アナフィラキシー
前立腺癌(C61)	*AADC-0128*	*Odyne + Leuplin 療法*		
			ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ	1回125mg 1日3回
			ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ	4週ごとに3.75mgまたは12週ごとに11.25mgを皮下投与
			副作用:	肝機能障害、女性型乳房、悪心・嘔吐、ほてり、熱感
前立腺癌(C61)	*AADC-0205*	*Enzalutamide*	エンザルタミド	1回160mg 1日1回 経口投与 連日
去勢抵抗性前立腺癌			副作用:	疲労、悪心、食欲減退、無力症、痙攣発作、下痢、
前立腺癌(C61)	*AADC-0208*	*Abiraterone*	Abiraterone	1回1000mg 1日1回 経口投与 連日
去勢抵抗性前立腺癌			ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ	1回5mg 1日2回 経口投与 連日
			副作用:	肝機能障害、心障害、疲労、ほてり、悪心・嘔吐、低カリウム血症
				高血圧、消化器症状、高脂血症
前立腺癌(C61)	*AADC-0224*	*Cabazitaxel*	Cabazitaxel	20～25mg/㎡ day1
去勢抵抗性前立腺癌			Pegfilgrastin	3.6mg day2
			3週毎	
			副作用:	好中球減少症、骨髄抑制、疲労、悪心、下痢、食欲減退
				貧血、腎不全、消化管出血、アナフィラキシーショック
				心不全、末梢神経障害、DIC、皮膚粘膜眼症候群、心タンポナーデ
				心筋梗塞、静脈血栓塞栓症、間質性肺炎、口内炎、SIADH
前立腺癌(C61)	*AADC-0226*	*Leuprorerin Pro*	Leuprorerin Pro22.5mg	24週毎皮下注射
			副作用:	注射部位硬結、注射部位紅斑、注射部位疼痛、糖尿病、ほてり
				間質性肺炎、アナフィラキシー、肝機能障害、血栓塞栓症

がんの部位（ICD-Oコード）	承認番号	レジメン名称	用法等	
前立腺癌（C61）	*AADC-0250*	*Degarelix(12週毎)*	ﾃﾞｶﾞﾚﾘｸｽ	初回240mgを1箇所あたり120mgずつ腹部2箇所に皮下投与
				2回目以降は初回投与4週間後より480mgを維持用量として
				腹部2箇所に皮下投与し、12週間間隔で投与を繰り返す。
			副作用：	注射部位疼痛、注射部位硬結、注射部位紅斑、ほてり、体重増加
				発熱、高血圧、注射部位熱感、間質性肺炎、肝機能障害、糖尿病憎悪
				心不全、血栓塞栓症、アナフィラキシー
前立腺癌（C61）	*AADC-0251*	*Apalutamide*	ｱﾊﾟﾙﾀﾐﾄﾞ	1回240mg　1日1回　経口投与　連日
			副作用：	疲労、皮疹、甲状腺機能低下症、掻痒症、体重減少
				痙攣発作、心房細動、心筋梗塞、悪心、下痢
前立腺癌（C61）	*AADC-0266*	*Darolutamide*	ﾀﾞﾛﾙﾀﾐﾄﾞ	1回600mg（300mgを2錠）　1日2回　食後経口投与　連日
遠隔転移を有しない去勢抵抗性前立腺癌			副作用：	心臓障害、間質性肺疾患、疲労、皮疹、頭痛、めまい
				悪心、下痢、ほてり、高血圧、女性化乳房
前立腺癌（C61）	*AADC-0248*	*Olaparib*	オラパリブ	1回300mgを1日2回経口投与
BRCA遺伝子変異陽性の遠隔転移を有する去勢抵抗性前立腺癌			副作用：	悪心、嘔吐、味覚異常
				貧血、好中球減少、血小板減少、リンパ球減少
				疲労、無力症、間質性肺炎
				下痢、頭痛
前立腺癌（C61）	*AADC-0367*	*Cisplatin (CDK12陽性)*	CDDP	75mg/㎡　day2
CDK12陽性の前立腺癌			3週毎	
			副作用：	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、腎機能障害
精巣腫瘍（C63）	*AADC-0074*	*BEP療法*		
			BLM	30mg/body　day1.8.15
			VP-16	100mg/㎡　day1～5
			CDDP	20mg/㎡　day1～5
			1クール：3週	
			副作用：	間質性肺炎、肺繊維症、皮膚の硬化、色素沈着、発熱・悪寒、脱毛、食欲不振
				体重減少、全身倦怠感、悪心・嘔吐、骨髄抑制、
精巣腫瘍（C63）	*AADC-0075*	*EP療法*		
			VP-16	100mg/㎡　day1～5
			CDDP	20mg/㎡　day1～5
			1クール：3週	
			副作用：	骨髄抑制、食欲不振、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、
精巣腫瘍（C63）	*AADC-0171*	*CBDCA*		
セミノーマ			CBDCA	AUC＝7　単回投与
			副作用：	嘔気・嘔吐、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、発熱、骨髄抑制、肝機能障害
腎癌（C64）	*AADC-0076*	*Sumiferon*		
			IFN-α	1日1回300万～600万IU　連日または週1～3回
			副作用：	発熱、全身倦怠感、食欲不振、骨髄抑制、肝機能障害
腎癌（C64）	*AADC-0077*	*Imunace*		
			ﾃｾﾛｲｷﾝ	1日1回70万単位　連日
			副作用：	発熱、悪寒、倦怠感、食欲不振、悪心・嘔吐、好酸球増多、肝機能障害、浮腫
腎癌（C64）	*AADC-0112*	*Sutent*		
			スニチニブ1日1回50mg	
			4週間連続投与2週間休薬	
			副作用：	骨髄抑制、皮膚変色、手足症候群、食欲不振、肝機能異常、疲労感
				味覚異常、口内炎、下痢、悪心、歯肉炎、代謝異常、浮腫、発熱、高血圧
腎癌（C64）	*AADC-0160*	*Sorafenib*		
根治切除不能または転移性の腎細胞癌			用法・用量	1回400mg　1日2回　経口投与　適宜増減
			副作用：	手足症候群。剥脱性皮膚炎、発疹、脱毛、下痢、高血圧、疲労
				食欲不振、そう痒感、体重減少、肝機能障害、出血
				間質性肺炎、急性肺障害、高血圧クリーゼ、可逆性後白室脳症
				皮膚粘膜眼症候群、消化管穿孔、心筋虚血・心筋梗塞

がんの部位（ICD-Oコード）	承認番号	レジメン名称	用法等	
腎癌（C64）	*AADC-0169*	*Everolimus*	Everolimus	10mg/day　　連日経口投与
根治切除不能または転移性の腎細胞癌			副作用：	口内炎、発疹、貧血、疲労、下痢、無力症、食欲減退、高コレステロール血症
				悪心、粘膜の炎症、嘔吐、末梢性浮腫、高トリグリセリド血症、咳嗽、掻痒症
				感染症、皮膚乾燥、鼻出血、呼吸困難、味覚異常、間質性肺炎、腎不全
				高血糖、アナフィラキシー様症状、急性呼吸窮迫症候群、肺塞栓症、心嚢液貯留
				進行性多巣性白質脳症、BKウイルス腎症、血栓性微小血管障害、肺胞蛋白症
腎癌（C64）	*AADC-0178*	*Temsirolimus*		
			テムシロリムス	25mgを1週間に1回点滴
			副作用：	発疹、口内炎、食欲不振、肝機能障害、高血糖、間質性肺疾患
				infusion reaction、脂質代謝異常、創傷治癒遅延、腎不全
				消化管穿孔、心嚢液貯留、胸水、痙攣、脳出血、感染症
				皮膚粘膜眼症候群、横紋筋融解症、骨髄抑制
腎癌（C64）	*AADC-0183*	*Axitinib*	アキシチニブ	1回5mg1日2回経口投与
進行再発腎癌				患者の状態により増減可、増量は1回10mgまで
			副作用：	高血圧、甲状腺機能障害、創傷治癒遅延、蛋白尿、手足症候群
				肝機能障害、下痢、疲労、悪心嘔吐、発声障害、無力症、体重減少
				粘膜炎症、口内炎、味覚異常、鼻出血、
腎癌（C64）	*AADC-0199*	*Pazopanib*	パゾパニブ	1日1回800mg　経口投与
			副作用：	下痢、疲労、悪心、高血圧、毛髪変色、食欲減退、体重減少、味覚異常
				肝機能障害、心機能障害、動脈血栓性事象、静脈血栓性事象、出血
				甲状腺機能障害、ネフローゼ症候群、蛋白尿、感染症、創傷治癒遅延
腎癌（C64）	*AADC-0225*	*Nivolumab*	ニボルマブ	240mg/body　　2週間隔
			副作用：	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
腎癌（C64）	*AADC-0252*	*Nivolumab+Ipilimumab*	Nivolumab	240mg/body
			Ipilimumab	1mg/kg
			3週毎4コースまで	
			5コースから	
			Nivolumab	240mg/body
			2週毎継続	
			副作用：	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
				血球貪食症候群、結核
腎癌（C64）	*AADC-0272*	*4週毎 Nivolumab*	ニボルマブ	480mg/body　　4週間隔
			副作用：	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
腎癌（C64）	*AADC-0268*	*Pembrolizumab(6週間)*	ペムブロリズマブ	1回400mg　　6週間隔
			副作用：	骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症
				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐
				口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害
				肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害
				膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
腎癌（C64）	*AADC-0278*	*Cabozantinib*	カボザンチニブ	1回60mg　1日1回空腹時
			副作用：	高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労
				口内炎、蛋白尿、手足症候群、横紋筋融解症
				動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔
				可逆性後白質脳症症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延

がんの部位（ICD-Oコード）	承認番号	レジメン名称	用法等	
				低カルシウム血症
腎癌（C64）	*AADC-0392*	*Nivolumab+Cabozantinib 2週間*	Nivolumab	240mg/body
			カボザンチニブ	1回40mg　1日1回空腹時
			副作用：	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
				高血圧、下痢、悪心、疲労
				口内炎、蛋白尿、手足症候群、横紋筋融解症
				動脈血栓症、静脈血栓症、消化管穿孔、低カルシウム血症
				可逆性後白質脳症症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延
腎癌（C64）	*AADC-0393*	*Nivolumab+Cabozantinib 4週間*	Nivolumab	480mg/body
			カボザンチニブ	1回40mg　1日1回空腹時
			副作用：	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
				高血圧、下痢、悪心、疲労
				口内炎、蛋白尿、手足症候群、横紋筋融解症
				動脈血栓症、静脈血栓症、消化管穿孔、低カルシウム血症
				可逆性後白質脳症症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延
腎う癌（C65）	*AADC-0121*	*GC療法*	GEM	1000mg/㎡　day1.8.15
			CDDP	70mg/㎡　day2
			1クール：4週	
			副作用：	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱
腎う癌（C65）	*AADC-0268*	*Pembrolizumab(6週間)*	ペムブロリズマブ	1回400mg　6週間隔
			副作用：	骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症
				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐
				口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害
				肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害
				膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎
腎う癌（C65）	*AADC-0283*	*Avelumab*	Avelumab	10mg/kg　day1
根治切除不能尿路上皮癌における化学療法後の維持療法			2週毎	
			副作用：	間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病
				肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー
腎う癌（C65）	*AADC-0294*	*Enfortumab Vedotin*	Enfortumab Vedotin	1.25mg/kg　day1.8.15
がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌			4週毎	
			副作用：	皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患
				肝機能障害、Infusion reaction
腎う癌（C65）	*AADC-0225*	*Nivolumab*	ニボルマブ	240mg/body　2週間隔
筋層浸潤性尿路上皮癌術後　投与期間12ヶ月まで			副作用：	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
腎う癌（C65）	*AADC-0272*	*4週毎 Nivolumab*	ニボルマブ	480mg/body　4週間隔
筋層浸潤性尿路上皮癌術後　投与期間12ヶ月まで			副作用：	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション
腎う癌（C65）	*AADC-0336*	*GEM+PTX*	GEM	1000mg/㎡　day1.8.15
切除不能または転移を有する尿路上皮癌			PTX	200mg/㎡　day1
			4週毎	
			副作用：	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
				関節痛、筋肉痛、末梢神経障害	
腎う癌(C65)	*AADC-0337*	*GEM+CBDCA*	GEM	1000mg/㎡	day1.8
切除不能または転移を有する尿路上皮癌			CBDCA	目標AUC＝5	day1
			3週毎		
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、発熱	
腎う癌(C65)	*AADC-0360*	*Pembrolizumab+Enfortumab Vedotin*	Pembrolizumab	200mg/body	day1
根治切除不能な尿路上皮癌の一次治療			Enfortumab Vedotin	1.25mg/kg	day1.8
			3週毎		
			副作用:	皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患	
				肝機能障害、Infusion reaction	
				発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、静脈血栓塞栓症	
腎う癌(C65)	*AADC-0377*	*Nivolumab+GC*	Nivolumab	360mg/body	day1
根治切除不能な尿路上皮癌			CDDP	70mg/㎡	day1
			GEM	1000mg/㎡	day1,day8
			3週毎 最大6ｺｰｽ		
			Nivolumab	480mg/body	day1
			4週毎 最長2年間		
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
				血球貪食症候群、結核	
				悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎	
尿管癌(C66)	*AADC-0121*	*GC療法*	GEM	1000mg/㎡	day1.8.15
			CDDP	70mg/㎡	day2
			1クール:4週		
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱	
尿管癌(C66)	*AADC-0268*	*Pembrolizumab(6週間)*	ペムブロリズマブ	1回400mg	6週間隔
			副作用:	骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症	
				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐	
				口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害	
				肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害	
				膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎	
尿管癌(C66)	*AADC-0283*	*Avelumab*	Avelumab	10mg/kg	day1
根治切除不能尿路上皮癌における化学療法後の維持療法			2週毎		
			副作用:	間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病	
				肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー	
尿管癌(C66)	*AADC-0294*	*Enfortumab Vedotin*	Enfortumab Vedotin	1.25mg/kg	day1.8.15
がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌			4週毎		
			副作用:	皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患	
				肝機能障害、Infusion reaction	
尿管癌(C66)	*AADC-0225*	*Nivolumab*	ニボルマブ	240mg/body	2週間隔
筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
尿管癌(C66)	*AADC-0272*	*4週毎 Nivolumab*	ニボルマブ	480mg/body	4週間隔
筋層浸潤性尿路上皮癌術後 投与期間12ヶ月まで			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
尿管癌(C66)	*AADC-0336*	*GEM+PTX*	GEM	1000mg/㎡	day1.8.15
切除不能または転移を有する尿路上皮癌			PTX	200mg/㎡	day1
			4週毎		
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱	
				関節痛、筋肉痛、末梢神経障害	
尿管癌(C66)	*AADC-0337*	*GEM+CBDCA*	GEM	1000mg/㎡	day1.8
切除不能または転移を有する尿路上皮癌			CBDCA	目標AUC＝5	day1
			3週毎		
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、発熱	
尿管癌(C66)	*AADC-0360*	*Pembrolizumab+Enfortumab Vedotin*	Pembrolizumab	200mg/body	day1
根治切除不能な尿路上皮癌の一次治療			Enfortumab Vedotin	1.25mg/kg	day1.8
			3週毎		
			副作用:	皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患	
				肝機能障害、Infusion reaction	
				発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、静脈血栓塞栓症	
尿管癌(C66)	*AADC-0377*	*Nivolumab+GC*	Nivolumab	360mg/body	day1
根治切除不能な尿路上皮癌			CDDP	70mg/㎡	day1
			GEM	1000mg/㎡	day1,day8
			3週毎　最大6ｺｰｽ		
			Nivolumab	480mg/body	day1
			4週毎　最長2年間		
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
				血球貪食症候群、結核	
				悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎	
膀胱癌(C67)	*AADC-0012*	*Furtulon*			
			5'-DFUR	800-1200mgを3-4回に分けて服用	
			副作用:	食欲不振、下痢、白血球減少	
膀胱癌(C67)	*AADC-0071*	*Epirubicin 膀胱内注入*			
			EPI	40mgを週1回膀胱内へ注入　10回	
			副作用:	悪心・嘔吐、白血球減少、食欲不振、脱毛	
膀胱癌(C67)	*AADC-0072*	*Immunobladder 膀胱内注入*			
			BCG	40mgまたは80mgを週1回膀胱内へ注入　10回	
			副作用:	BCG感染、排尿痛、頻尿、肉眼的血尿、肝機能障害、発熱、	
膀胱癌(C67)	*AADC-0121*	*GC療法*			
			GEM	1000mg/㎡	day1.8.15
			CDDP	70mg/㎡	day2
			1クール:4週		
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱	
膀胱癌(C67)	*AADC-0268*	*Pembrolizumab(6週間)*	ペムブロリズマブ	1回400mg	6週間隔
			副作用:	骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症	
				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐	
				口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害	
				肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害	
				膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎	
膀胱癌(C67)	*AADC-0283*	*Avelumab*	Avelumab	10mg/kg	day1

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
根治切除不能尿路上皮癌における化学療法後の維持療法			2週毎		
			副作用:	間質性肺疾患、大腸炎、下痢、甲状腺機能低下症、1型糖尿病	
				肝機能障害、腎障害、筋炎・横紋筋融解症、アナフィラキシー	
膀胱癌(C67)	*AADC-0294*	*Enfortumab Vedotin*	Enfortumab Vedotin	1.25mg/kg	day1.8.15
がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌			4週毎		
			副作用:	皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患	
				肝機能障害、Infusion reaction	
膀胱癌(C67)	*AADC-0225*	*Nivolumab*	ニボルマブ	240mg/body	2週間隔
筋層浸潤性尿路上皮癌術後　投与期間12ヶ月まで			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
膀胱癌(C67)	*AADC-0272*	*4週毎 Nivolumab*	ニボルマブ	480mg/body	4週間隔
筋層浸潤性尿路上皮癌術後　投与期間12ヶ月まで			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
膀胱癌(C67)	*AADC-0336*	*GEM+PTX*	GEM	1000mg/㎡	day1.8.15
切除不能または転移を有する尿路上皮癌			PTX	200mg/㎡	day1
			4週毎		
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、脱毛、発熱	
				関節痛、筋肉痛、末梢神経障害	
膀胱癌(C67)	*AADC-0337*	*GEM+CBDCA*	GEM	1000mg/㎡	day1.8
切除不能または転移を有する尿路上皮癌			CBDCA	目標AUC＝5	day1
			3週毎		
			副作用:	悪心・嘔吐、骨髄抑制、食欲不振、口内炎、発熱	
膀胱癌(C67)	*AADC-0360*	*Pembrolizumab+Enfortumab Vedotin*	Pembrolizumab	200mg/body	day1
根治切除不能な尿路上皮癌の一次治療			Enfortumab Vedotin	1.25mg/kg	day1.8
			3週毎		
			副作用:	皮膚障害、高血糖、末梢性ニューロパチー、骨髄抑制、腎機能障害、間質性肺疾患	
				肝機能障害、Infusion reaction	
				発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、静脈血栓塞栓症	
膀胱癌(C67)	*AADC-0377*	*Nivolumab+GC*	Nivolumab	360mg/body	day1
根治切除不能な尿路上皮癌			CDDP	70mg/㎡	day1
			GEM	1000mg/㎡	day1,day8
			3週毎　最大6ｺｰｽ		
			Nivolumab	480mg/body	day1
			4週毎　最長2年間		
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害	
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション	
				血球貪食症候群、結核	
				悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎	
膀胱癌(C67)	*AADC-0385*	*Durvalumab+GEM+CDDP (CCr>60ml/min)*	Durvalumab	1500mg/body	day1　BW≦30kgは20mg/kg
術前・術後補助療法			CDDP	70mg/㎡	day1
			GEM	1000mg/㎡	day1,day8
			術前　3週毎　最大4ｺｰｽ		
			Durvalumab	1500mg/body	day1　BW≦30kgは20mg/kg
			術後　4週毎　最大8ｺｰｽ		
			副作用:	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症	

がんの部位（ICD-Oコード）	承認番号	レジメン名称	用法等			
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害		
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション		
				血球貪食症候群、結核		
				悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎		
膀胱癌（C67）	*AADC-0386*	*Durvalumab+GEM+CDDP (CCr=40-60ml/min)*	Durvalumab	1500mg/body	day1	BW≦30kgは20mg/kg
術前・術後補助療法			CDDP	35mg/㎡	day1,day8	
			GEM	1000mg/㎡	day1,day8	
			術前　3週毎　最大4ｺｰｽ			
			Durvalumab	1500mg/body	day1	BW≦30kgは20mg/kg
			術後　4週毎　最大8ｺｰｽ			
			副作用：	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症		
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害		
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション		
				血球貪食症候群、結核		
				悪心・嘔吐、骨髄抑制、倦怠感、口内炎		
悪性膠芽腫、乏突起神経膠腫（C71）	*AADC-0078*	*IFNβ+MCNU+IMRT(IMR療法)*				
			IFNβまたはフェロン		300万単位	5投2休（5週間）、1回/週（6週目以降）
			サイメリン		1mg/kg	2ヶ月に1回
			放射線照射			
			副作用：	発熱、骨髄抑制、蛋白尿、食欲不振、悪心嘔吐		
悪性神経膠腫（C71）	*AADC-0104*	*Temodal*				
			テモダール	経口又は点滴静注		
				初発）放射線照射との併用		
				テモゾロミドとして1回75mg/㎡　1日1回連日42日間投与し4週間休薬		
				その後に本剤単独にて、テモゾロミドとして1回150mg/㎡を1日1回連日5日間		
				投与し、23日間休薬。28日間1クール		
				再発）		
				テモゾロミドとして1回150mg/㎡　1日1回連日5日間投与し23日間休薬		
				28日間1クール		
			副作用：	放射線照射との併用　脱毛、悪心・嘔吐、疲労		
				併用後の単独投与時　疲労、脱毛、悪心・嘔吐、食欲不振、頭痛、便秘		
悪性神経膠腫（C71）	*AADC-0197*	*BV+RT/TMZ 療法*	ベバシズマブ	1回10mg/kgを2週間間隔で計4回点滴静注		
			テモダール	1回75mg/㎡　1日1回連日経口投与		
			放射線照射	2Gy/日　週5日　総線量60Gy		
			その後			
			ベバシズマブ	1回10mg/kgを2週間間隔点滴静注		
			テモダール	1回150mg～200mg/㎡　1日1回連日5日間経口投与し23日間休薬		
				28日間1クール		
			その後			
			ベバシズマブ	1回15mg/kgを3週間間隔点滴静注　PDになるまで		
			副作用：	脳出血、粘膜皮膚出血、動脈血栓塞栓症、静脈血栓塞栓症、創傷治癒遅延		
				骨髄抑制、感染症、高血圧、蛋白尿、可逆性後白質脳症症候群、消化管穿孔		
				うっ血性心不全、疲労、脱毛、悪心・嘔吐、食欲不振、頭痛、便秘		
悪性神経膠腫（C71）	*AADC-0198*	*Gliadel*	ギリアデル	腫瘍切除腔の大きさや形状に応じて、8枚または適宜減じた枚数を		
				脳腫瘍切除術時の切除面を被覆するように留置		
			副作用：	脳浮腫、発熱、リンパ球数減少、片麻痺、悪心、嘔吐、食欲減退		
				頭痛、肝機能異常、痙攣、創傷治癒不良、血栓塞栓症		
悪性リンパ腫（C72）	*AADC-0116*	*髄注MTX+PSL療法*				
			MTX	15mg		
			PSL	20mg		
			髄液中悪性リンパ腫細胞が陰性化するまで2回／週　繰り返し施行			

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等		
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、口内炎、下痢、腎機能障害、	
悪性リンパ腫(C72)	*AADC-0118*	*high dose MTX*			
			MTX	3.5g/㎡	24時間点滴
			LV	15mg/body	静注
			LVはMTX終了12時間後から6時間毎に投与		
			副作用:	骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、口内炎、下痢、腎機能障害、	
				肝機能障害、食欲不振	
悪性リンパ腫(C72)	*AADC-0267*	*Tirabrutinib*	チラブルチニブ	1回480mg(80mgを6錠)1日1回 空腹時経口投与 連日	
			副作用:	感染症、皮膚障害、骨髄抑制、過敏症、間質性肺疾患	
				肝機能障害、出血、下痢、悪心嘔吐	
				高カリウム血症、高トリグリセリド血症	
甲状腺癌(C73)	*AADC-0160*	*Sorafenib*			
			用法・用量	1回400mg 1日2回 経口投与 適宜増減	
			副作用:	手足症候群。剥脱性皮膚炎、発疹、脱毛、下痢、高血圧、疲労	
				食欲不振、そう痒感、体重減少、肝機能障害、出血	
				間質性肺炎、急性肺障害、高血圧クリーゼ、可逆性後白室脳症	
				皮膚粘膜眼症候群、消化管穿孔、心筋虚血・心筋梗塞	
甲状腺癌(C73)	*AADC-0222*	*Lenvatinib*	用法・用量	1回24mg 1日1回	
			副作用:	高血圧、下痢、食欲減退、体重減少、悪心、疲労	
				口内炎、蛋白尿、手掌・足底発赤知覚不全症候群、出	
				動脈血栓症、静脈血栓症、肝障害、腎障害、消化管穿孔	
				可逆性後白質脳症症候群、心障害、骨髄抑制、創傷治癒遅延	
				低カルシウム血症	
甲状腺癌(C73)	*AADC-0357*	*Encorafenib+Binimetinib*	Encorafenib	1回450mg 1日1回経口投与	
BRAF遺伝子変異陽性			Binimetinib	1回45mg 1日2回経口投与	
			副作用:	手足症候群、眼障害、心機能障害、肝障害、横紋筋融解症	
				高血圧、出血、腫瘍崩壊症候群	
甲状腺癌(C73)	*AADC-0384*	*Selpercatinib*	Selpercatinib	1回160mg 1日2回経口投与	
RET遺伝子変異陽性			副作用:	肝機能障害、QT間隔延長、過敏症、高血圧	
				間質性肺疾患、骨端離開および骨成長の異常、出血	
				口内乾燥、下痢、疲労、便秘、悪心、口内炎、腹痛	
				浮腫、発熱、食欲減退、頭痛、発疹	
				骨髄抑制、血中クレアチニン増加	
悪性リンパ腫(C77)	*AADC-0048*	*CHOP療法*			
非ホジキンリンパ腫			CPA	750mg/㎡	day1
			DXR	50mg/㎡	day1
			VCR	1.4mg/㎡	day1
			PSL	100mg/body	day1～5
			1クール:3週		
			副作用:	骨髄抑制、心毒性、末梢神経障害、肝障害、悪心・嘔吐、脱毛、出血性膀胱炎	
悪性リンパ腫(C77)	*AADC-0049*	*R-CHOP療法*	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ	375mg/㎡	(CHOP療法の前日)
非ホジキンリンパ腫			CPA	750mg/㎡	day1
			DXR	50mg/㎡	day1
			VCR	1.4mg/㎡	day1
			PSL	100mg/body	day1～5
			1クール:3週		
			副作用:	全身浮腫、呼吸障害、発熱、悪寒、頭痛、血圧上昇、発疹、骨髄抑制、悪心・嘔吐	
				出血性膀胱炎,心毒性、末梢神経障害、肝障害、脱毛、下肢深部反射減弱・消失、	
悪性リンパ腫(C77)	*AADC-0236*	*High dose MTX + High dose Ara-C*	MTX	200mg/㎡	day1

がんの部位（ICD-Oコード）	承認番号	レジメン名称	用法等			
非ホジキンリンパ腫			MTX	800mg/㎡	持続	day1
			ソル・メルコート	50mg/body		day1～3
			キロサイト	6000mg/㎡/日		day2～3
			1クール：3週			
			副作用：	骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、口内炎、下痢、腎機能障害、		
				肝機能障害、食欲不振、間質性肺炎、急性呼吸促迫症候群		
				中枢神経障害、代謝異常		
原発不明癌（C80）	*AADC-0015*	*GEM*	GEM	1000 mg/㎡を週1回 3回投与 1週休薬		
				1000 mg/㎡を2週間に1回		
			副作用：	骨髄抑制、食欲不振、悪心・嘔吐、肝機能障害、発熱、全身倦怠感		
原発不明癌（C80）	*AADC-0225*	*Nivolumab*	ニボルマブ	240mg/body	2週間隔	
			副作用：	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症		
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害		
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション		
原発不明癌（C80）	*AADC-0272*	*4週毎 Nivolumab*	ニボルマブ	480mg/body	4週間隔	
			副作用：	発熱、倦怠感、食欲減退、発疹、間質性肺炎、重症筋無力症		
				大腸炎、1型糖尿病、肝機能障害、甲状腺機能障害、神経障害		
				腎障害、脳炎、重度の皮膚障害、静脈血栓塞栓症、インフュージョンリアクション		
リンパ性白血病(C91)	*AADC-0319*	*Acalabrutinib*	用法・用量	1回100mg 1日2回 経口投与		
再発又は難治性の慢性リンパ性白血病			副作用：	下痢、悪心・嘔吐、頭痛		
				骨髄抑制、感染症、出血		
				不整脈、虚血性心疾患、間質性肺疾患		
				腫瘍崩壊症候群、二次性悪性腫瘍		
骨髄異形成症候群（D46）	*AADC-0301*	*Azacitidine 皮下注*	アザシチジン	75mg/㎡	day1-7	皮下注
				21日間休薬		
			副作用：	骨髄抑制、感染症、出血、腎尿細管アシドーシス、低血圧		
				食欲不振、便秘、悪心、口内炎、下痢		
				発疹、掻痒、倦怠感、発熱、注射部位反応、注射部位紅斑		
骨髄異形成症候群（D46）	*AADC-0302*	*Azacitidine 点滴静注*	アザシチジン	75mg/㎡	day1-7	10分かけて点滴静注
				21日間休薬		
			副作用：	骨髄抑制、感染症、出血、腎尿細管アシドーシス、低血圧		
				食欲不振、便秘、悪心、口内炎、下痢		
				発疹、掻痒、倦怠感、発熱		
固形癌（MSI-High）	*AADC-0235*	*Pembrolizumab*	ペムブロリズマブ	1回200mg	3週間隔	
			副作用：	骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症		
				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐		
				口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害		
				肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害		
				膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎		
固形癌（MSI-High）	*AADC-0268*	*Pembrolizumab(6週間)*	ペムブロリズマブ	1回400mg	6週間隔	
			副作用：	骨髄抑制、インフュージョンリアクション、甲状腺機能低下症		
				甲状腺機能亢進症、全身倦怠感、便秘、下痢、悪心・嘔吐		
				口内炎、肝機能障害、間質性肺炎、大腸炎、神経障害		
				肝機能障害、下垂体機能障害、1型糖尿病、腎機能障害		
				膵炎、横紋筋融解症、重症筋無力症、脳炎、髄膜炎		
固形癌（NTRK融合遺伝子陽性）	*AADC-0346*	*Larotrectinib*	ラロトレクチニブ	1回 100mg、1日2回、連日経口投与		
			副作用：	浮動性めまい、頭痛、末梢性感覚ニューロパチー		
				肝機能障害、骨髄抑制		

がんの部位(ICD-Oコード)	承認番号	レジメン名称	用法等	
				疲労、筋肉痛、関節痛
固形癌(RET融合遺伝子陽性)	*AADC-0384*	*Selpercatinib*	Selpercatinib	1回160mg 1日2回経口投与
			副作用:	肝機能障害、QT間隔延長、過敏症、高血圧
				間質性肺疾患、骨端離開および骨成長の異常、出血
				口内乾燥、下痢、疲労、便秘、悪心、口内炎、腹痛
				浮腫、発熱、食欲減退、頭痛、発疹
				骨髄抑制、血中クレアチニン増加
固形癌(標準治療終了)	*AADC-0264*	*Trastuzumab Deruxtecan*	Trastuzumab Deruxtec	5.4mg/kg day1
			3週ごと	
			副作用:	間質性肺疾患、心障害、過敏症、インフュージョンリアクション
				骨髄抑制、脱毛、疲労、悪心・嘔吐、下痢、便秘、口内炎
小細胞癌 (臓器横断的)	*AADC-0023*	*CBDCA+ETP療法(CE)*	VP-16 80mg/㎡	day1～3
			CBDCA 目標AUC=5/body day1	
			3～4週ごと	
			副作用:	骨髄抑制、脱毛、悪心・嘔吐、倦怠感、発熱、食欲不振
フォン・ヒッペル・リンドウ病関連腫瘍	*AADC-0376*	*Belzutifan*	ベルズチファン	1回 120mg、1日1回、連日経口投与
			副作用:	貧血、低酸素症
				出血、骨折